

2024 年广东省阳西县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库（全优）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于药品不良反应的是

- A: 合格药品过量服用导致的与用药目的无关的有害反应
- B: 合格药品使用方法不当导致的与用药目的无关的有害反应
- C: 合格药品在正常用法、用量下出现的与用药目的无关的有害反应
- D: 服用假药导致的与用药目的无关的有害反应

答案：C

2. 与黄连上清丸不宜联用的药物是

- A: 氨茶碱
- B: 乳酶生
- C: 氢氧化铝
- D: 苯巴比妥

答案：B

3. 一般情况下，以洗胃方式解救经口中毒的有效时间是

- A: 毒物经口进入体内 4~6 小时以内
- B: 中毒后 4~6 小时以内
- C: 中毒后 6~8 小时以内
- D: 中毒后 2~4 小时以内

答案：A

4. (2017 年真题) 处方外文缩写 OU 代表 ()

- A: 左眼
- B: 双眼
- C: 右耳
- D: 左耳

答案: B

5. 运输过程中应避免振荡，否则药物结构发生改变，可引起纯红细胞再生障碍性贫血的药物是

- A: 阿昔洛韦
- B: 脂肪乳
- C: 利巴韦林
- D: 人促红素

答案: D

6. 导致老年男性下尿路症状最常见的原因是

- A: 膀胱炎
- B: 前列腺炎
- C: 肾盂肾炎
- D: 良性前列腺增生症

答案: D

7. 正常人对铁剂的吸收率为

- A: 10%~20%
- B: 0.4
- C: 10%~30%
- D: 0.3

答案: A

8. 给予维生素 B/C 的依据是

- A: 肾脏功能发生衰竭时缺乏活性形式的维生素 D
- B: 腹膜透析容易丢失水溶性维生素
- C: 透析患者会出现骨和关节疼痛或头痛
- D: 有助于合成红细胞

答案：B

9. 最常见的急性肾盂肾炎致病菌是

- A: 葡萄球菌
- B: 大肠杆菌
- C: 粪肠球菌
- D: 变形杆菌

答案：B

10. 下列药品中，与血浆蛋白结合率高、分布容积随年龄增长而降低、容易造成老年人血药浓度升高而致中毒的是

- A: 碳酸钙
- B: 维生素 C
- C: 地西泮
- D: 巴比妥

答案：C

11. 下列处方中常见的外文缩写，其含义是"每晚用药"的是

- A: qs
- B: qh
- C: qn
- D: qd

答案：C

12. 下列药物中，适宜在餐前服用的是

- A: 莫沙必利片
- B: 伊马替尼片
- C: 双氯芬酸钠片
- D: 西咪替丁片

答案：A

13. 发热（发烧）指人体体温升高，超过正常范围，主要表现是体温升高、脉搏加快。按体温状况，发热分为低热、中等度热、高热、超高热。中等度热是指体温范围

- A: 37.0℃～38.3℃
- B: 39.1℃～41.0℃
- C: 38.1℃～39.0℃
- D: 37.4℃～38.0℃

答案：C

14. 甲基多巴

- A: 中性粒细胞减少
- B: 血红蛋白量增多
- C: 血小板减少
- D: 嗜酸性粒细胞减少

答案：D

15. 患者，女，55 岁，化验结果：TC4.0mmol/L（参考值参<5.2mmol/L），TG8.1mmol/L（参考值 0.56～1.70mmol/L），应首选的调脂药物为

- A: 依折麦布

- B: 苯扎贝特
- C: 氟伐他汀
- D: 烟酸

答案：B

16. 抗氧化，减少再灌注期氧自由基的产生

- A: 阿司匹林
- B: 丙磺舒
- C: 别嘌醇
- D: 秋水仙碱

答案：C

17. 流感患者应用抗病毒药+抗生素属于

- A: 非适应证用药
- B: 过度治疗用药
- C: 超剂量用药
- D: 超适应证用药

答案：A

18. 药师在指导患者合理用药时应同时关注药物、食物和膳食补充剂的相互影响。下列合用方式合理的是()

- A: 华法林与人参同服
- B: 硫酸亚铁与维生素 C 同服
- C: 异烟肼与牛奶同服
- D: 左甲状腺素与钙剂同服

答案：B

19. 关于尿路感染的用药注意事项，说法不正确的是

- A: 无症状菌尿仅推荐筛查和治疗孕妇以及接受可能导致尿道黏膜出血的侵入性操作的患者
- B: 服用磺胺类药物时应少喝水
- C: 尽量避免尿路器械的使用
- D: 经验性用药有头孢氨苄、阿莫西林等

答案：B

20.（抗癫痫药物的选择）癫痫全身强直阵挛性发作的一线用药是（）

- A: 加巴喷丁
- B: 乙琥胺
- C: 扑米酮
- D: 卡马西平

答案：D

21. 患者，男，73 岁，因腰痛无法起床 1 天就诊。患者已有多年的腰痛病史，经物理疗法后可有所好转。现于久坐之后起立困难，行走为小步慢行，昨夜睡眠正常，早晨自觉腰痛而无法起床。既往无抗癫痫药、抗甲状腺药及糖皮质激素长期服用史。经 X 线检查诊断为腰椎压缩性骨折。

- A: 长期服用糖皮质激素
- B: 老年性骨质疏松症
- C: 长期服用抗癫痫药
- D: 维生素 D 中毒

答案：B

22. 再感染

- A: 宜选用毒性小的抗菌药物

B: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药 6 周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同

C: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次（同一菌株），尿细菌数 $>10^5\text{cfu/ml}$

D: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在 6 周内再次出现菌尿，菌种与上次相同

答案：B

23. 对乙酰氨基酚的妊娠毒性分级是（）

A: A 级

B: X 级

C: B 级

D: C 级

答案：C

24. 护士用药咨询的内容是

A: 不宜选用氯化钠注射液溶解的药品

B: 栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法

C: 减肥、补钙、补充营养素

D: 抗菌药物的合理使用

答案：A

25. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A: 肾病患者服用呋喃妥因可引起周围神经炎

B: 服用阿司匹林出现哮喘、慢性荨麻疹等

C: 口服避孕药致阿米替林清除率下降

D: 氯霉素在新生儿体内蓄积呈现灰婴综合征

答案: C

26. 急性期

A: 1~3 个月

B: 2 周

C: 1~6 个月

D: 1 个月内

答案: D

27. 下列治疗良性前列腺增生症的药物中，可以引起性功能减退的是

A: 索利那新

B: 奥昔布宁

C: 非那雄胺

D: 托特罗定

答案: C

28. (2019 年真题) 患者，男，72 岁。诊断: 高血压，心力衰竭，肋软骨炎。

A: 应定期监测地高辛血药浓度

B: 应注意观察是否有黑便

C: 应定期监测血压、心率

D: 在患者症状好转后，应立即停用比索洛尔

答案: D

29. 以下患者中，最适宜口服给药的是

A: 慢性病或轻症患者

- B: 胃肠反应大的患者
- C: 吞咽困难的老人
- D: 病情危重的患者

答案：A

30. 有幻觉副作用，不宜与右美沙芬合用的药物是

- A: 铝碳酸镁
- B: 匹伐他汀
- C: 多奈哌齐
- D: 美金刚

答案：D

31. 服用两咪替丁等 H₂ 受体阻断剂、地西泮等苯二氮革类药物应该禁用的是

- A: 烟
- B: 浓茶
- C: 酒
- D: 食醋

答案：A

32. 给药 1 次后可提供长达 1 年的药物是

- A: 口服低剂量孕激素避孕药
- B: 探亲避孕药
- C: 甲地孕酮硅胶环
- D: 长效复方口服避孕药

答案：C

33. (2018 年真题) 患者, 男, 65 岁, 诊断为持续性心房纤颤, 医生处方胺碘酮和华法林治疗。患者既往有高血压、糖尿病、冠心病和高脂血症, 目前正在服用贝那普利、美托洛尔、二甲双胍、阿卡波糖、辛伐他汀等药物治疗。根据患者用药情况, 药师提出的合理化药物治疗建议, 不包括 ()

- A: 患者在复律成功后, 尽可能以最小的胺碘酮剂量维持治疗
- B: 胺碘酮可以显著抑制 CYP2D6, 减慢美托洛尔的代谢, 应该根据患者心率和血压调整美托洛尔剂量
- C: 因为胺碘酮和贝那普利存在临床意义的相互作用, 建议换成氨氯地平 CCB 降压药
- D: 胺碘酮能增加华法林的抗凝活性, 在逐渐降低胺碘酮剂量的时候, 注意随时根据 INR 值调整华法林的剂量

答案: C

34. 适宜于清晨服用的药物是

- A: 沙丁胺醇
- B: 舒林酸
- C: 氢化可的松
- D: 西咪替丁

答案: C

35. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件, 具有

- A: 法律性、技术性和经济性
- B: 技术性、经济性和合法性
- C: 技术性、有效性和经济性
- D: 经济性、法律性和合理性

答案: A

36. 下列药物中，属于弱阿片类药物的为

- A: 曲马多
- B: 哌替啶
- C: 美沙酮
- D: 吗啡

答案：A

37. 嗜碱性粒细胞正常值参考范围是

- A: 0.20~0.40
- B: 0.01~0.05
- C: 0~0.01
- D: 0.03~0.08

答案：C

38. 下列属于二级文献的是

- A: 《中国药学年鉴》
- B: 《化学名词》
- C: 《中国药学文摘》
- D: 《中国药学杂志》

答案：C

39. (2019 年真题) 患者，女，32 岁，一天前发热，体温 39.8℃，全身乏力，四肢疼痛，近日有流感患者接触史。查体见咽部轻度充血，血常规检查白细胞计数偏低，中性粒细胞比例低，该者最适宜选用的药物是

- A: 利巴韦林片
- B: 金刚烷胺片
- C: 阿昔洛韦片

D: 奥司他韦胶囊

答案: D

40. 血脂调节药的合理应用有效降低 LDL-C 和 TG 水平，升高 HDL-C 水平的是（）

A: 依折麦布

B: 伊曲康唑

C: 他汀类与贝特类联用

D: 普罗布考

答案: C

41. 妇女在月经期间不宜服用的药品是

A: 山莨菪碱

B: 氢氯噻嗪

C: 颠茄浸膏

D: 氨酚待因

答案: B

42. 可加重老年人慢性便秘的药物是

A: 氯丙嗪

B: 异丙嗪

C: 麻黄碱

D: H

答案: B

43. 主要用于降低三酰甘油的药物是

A: 贝丁酸类

B: 普罗布考

C: 考来烯胺

D: 他汀类

答案: A

44. 一日一次用药的外文规范缩写是

A: q. h

B: q. n

C: q. d

D: q. o. d

答案: C

45. 有机磷中毒的特效解毒剂是

A: 氯磷定

B: 维生素 K1

C: 乙酰胺

D: 烯丙吗啡

答案: A

46. 患者，女，62 岁，医师处方如下：

A: 氨氯地平

B: 氯吡格雷

C: 二甲双胍

D: 阿卡波糖

答案: B

47. 服后不宜立刻饮水，以免冲淡药物

A: 粉剂

B: 糖浆剂

C: 包衣片

D: 胶囊剂

答案: B

48. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 (39.1℃)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查，T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ (参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$)，粪便镜检可见红、白细胞。

A: 动力性腹泻

B: 感染性腹泻

C: 消化不良性腹泻

D: 分泌性腹泻

答案: B

49. 心衰导致药物经肾排泄减少

A: 肾小球滤过减少

B: 肾小管分泌减少

C: 肾小管重吸收增加

D: 肾血流量减少

答案: D

50. 慢性荨麻疹的治疗首选药物是

A: 第一代抗组胺药

B: 1: 1000 肾上腺素注射液

C: 肾上腺糖皮质激素

D: 第二代非镇静抗组胺药

答案：D

51. (2019 年真题) 缺血性脑卒中的二级预防用药中，不包括

A: 阿托伐他汀

B: 阿司匹林

C: 缬沙坦

D: 依达拉奉

答案：D

52. 拉米夫定的适应证是

A: 足癣

B: 乙型病毒性肝炎

C: 带状疱疹

D: 流感

答案：B

53. 患者，女，27 岁，2 年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血 T₃、T₄ 及 TSH 检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

A: 海带

B: 虾皮

C: 不含碘的食用盐

D: 紫菜

答案：C

54. 新生儿的相对总体液量比成人高，体液占体重

A: 72%~80%

B: 75%~80%

C: 70%~80%

D: 75%~85%

答案：B

55. 弥漫性青铜色色素沉着的是

A: 氟尿嘧啶

B: 博来霉素

C: 白消安

D: 柔红霉素

答案：C

56. 患者到药店购买鱼肝油, 药师应给予()

A: 维生素 A

B: 鱼油

C: 维生素 AD

D: 维生素

答案：C

57. 原发性失眠首选

A: 阿戈美拉汀

B: 氯氮

C: 米氮平

D: 唑吡坦

答案：D

58. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第 1 跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 $500 \mu\text{mol/L}$ ；足部 x 线示非特征性软组织肿胀。

- A: 阿司匹林
- B: 尼美舒利
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 布洛芬

答案：C

59. 患者，男，70 岁，2 周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院，目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是

- A: 氯吡格雷
- B: 阿司匹林
- C: 利伐沙班
- D: 肝素

答案：B

60. 可促进肾小管对钠的重吸收，从而造成水钠潴留，易引起药源性高血压的药物是

- A: 地塞米松
- B: 重组人促红细胞生成素
- C: 阿司匹林
- D: 麻黄碱

答案：A

61. 在与患者进行沟通的过程中，切忌的事项是

- A: 可提供一些宣传资料

B: 尽量避免使用专业术语

C: 尽量提供更多的信息

D: 认真聆听

答案：C

62. 肺炎用药注意事项不符的是

A: 观察疗效抗菌药物治疗后 48~72h 应对病情进行评价。

B: 肺炎的抗菌药物治疗应尽早进行，一旦怀疑为肺炎即马上给予首剂抗菌药物。

C: 肺炎的药物治疗应避免使用抗生素，其他药物无效时再考虑使用抗生素。

D: 体温正常 48~72h，无肺炎任何一项临床不稳定征象可停用抗菌药物。

答案：C

63. 属于癌痛治疗第三阶梯的止痛药物为

A: 羟考酮

B: 曲马多

C: 对乙酰氨基酚

D: 可待因

答案：A

64. (2016 年真题) 患者，女，55 岁，因“反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸，胃灼热，间断积食”而就诊。食管测压提示食管下括约肌 (LES) 压力 $< 6\text{mmHg}$ ，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病，医师处方：奥美拉唑肠溶片 20mgbid 强化抑酸治疗。

A: 戒烟酒

B: 餐中多饮水

C: 控制体重

D: 避免高脂饮食

答案：B

65. 早餐前半小时服用的药物是（）

A: 雷贝拉唑

B: 瑞巴派特

C: 吉法酯

D: 枸橼酸铋钾

答案：A

66. I 期临床试验阶段，试验样本数为多少例

A: 1000～3000 例

B: 200～300 例

C: <10 例

D: 20～30 例

答案：D

67. 常年性过敏性鼻炎的主要吸入性变应原不包括

A: 鱼虾

B: 尘埃

C: 真菌

D: 动物皮毛

答案：A

68. （2017 年真题）下列关于烫伤救治措施的说送正确的是（）

A: 可用清洁塑料薄膜覆盖创面,以防创面感染

B: 创面及时外涂甲紫溶液预防感染

C: I 度烫伤可冷敷后外涂烧伤膏

D: 烫伤患者的镇痛镇静药物首选氯丙嗪

答案: C

69. 患者,男,58 岁,体重 68kg,高血压病史 5 年。5 天前出现咳嗽、咳痰,伴发热,入院查体 BP: 120/80mmHg, T38.9℃。化验结果:白细胞计数 $14.6 \times 10^9/L$,中性粒细胞百分比 86%。胸片示:右下肺纹理增粗,诊断为社区获得性肺炎,青霉素皮试阳性。

A: 莫西沙星

B: 阿莫西林

C: 头孢吡肟

D: 氨苄西林

答案: A

70. 急性缺血性脑卒中抗血小板药物治疗的时机为

A: 溶栓后 1h?

B: 溶栓后 3h?

C: 溶栓后 24h?

D: 溶栓后 12h?

答案: C

71. 患者,女,25 岁,临床诊断为癫痫,给予丙戊酸钠 200mg tid 治疗。关于患者用药教育的说法错误的是 ()

A: 不要随意增减剂量

B: 必要时监测血药浓度

C: 发作次数增多时应及时复诊

D: 应于每日三餐前服用药物

答案: D

72. 应用多黏菌素、磺胺类、顺铂可能引起

- A: 尿沉渣结晶
- B: 尿沉渣白细胞
- C: 尿沉渣管型
- D: 尿沉渣尿酸盐

答案：C

73. 患者，男，70 岁，2 周以来出现尿频、夜尿次数明显增多，且尿流变细、间断，排尿踌躇、费力等排尿困难现象，排尿后滴沥、尿不尽，近几天又出现睡眠障碍。

- A: 急迫性尿失禁
- B: 膀胱炎
- C: 急性肾盂肾炎
- D: 压力性尿失禁

答案：C

74. （2018 年真题）射击运动员使用后，可减慢心率，减少心肌耗氧量，消除比赛前紧张心理，因此被列入兴奋剂管理的药物是（）

- A: 呋塞米
- B: 硝苯地平
- C: 普萘洛尔
- D: 缬沙坦

答案：C

75. 避免与辛伐他汀合用的药物是（）

- A: 克拉霉素
- B: 万古霉素

C: 美罗培南

D: 头孢哌酮

答案: A

76. 对一般药品而言，安全贮存的环境可以是

A: 室温(10~30℃)

B: 室温 20℃

C: 室温(20~30℃)

D: 室温 25℃

答案: A

77. 抑制前列腺内双氢睾酮水平，达到降低雄激素水平，提高最高尿流率的是（）

A: 哌唑嗪

B: 特拉唑嗪

C: 度他雄胺

D: 索利那新

答案: C

78. 重症抑郁症的首选治疗方法是

A: 光线疗法

B: 电休克疗法

C: 食物疗法

D: 重复经颅磁刺激疗法

答案: B

79. 单核细胞正常值参考范围是

A: 0.03~0.08

B: 0.01~0.05

C: 0~0.01

D: 0.20~0.40

答案：A

80. 患者，男，65 岁，患有骨质疏松症。根据患者饮食习惯，每日需补充元素钙 600mg。药师为其推荐碳酸钙(0.5g / 片)，该患者适宜的用法用量是

A: 6 片 qd

B: 1 片 tid

C: 4 片 qd

D: 2 片 tid

答案：B

81. 欲调配 10%葡萄糖注射液 1000ml，应该分取 5%葡萄糖注射液与 50%葡萄糖注射液的用量是（可用十字交叉法计算）

A: 888ml, 112ml

B: 885ml, 115ml

C: 890ml, 110ml

D: 895ml, 105ml

答案：C

82. （2017 年真题）过敏性皮炎常表现为（）

A: 红细胞增多

B: 嗜酸性粒细胞增多

C: 中性粒细胞增多

D: 血红蛋白减少

答案：B

83. 可能导致血清总胆固醇升高的药物是

- A: 苯妥英钠
- B: 阿司匹林
- C: 氯氮平
- D: 胰岛素

答案：C

84. 以下所列药物中，一般不会导致蛋白尿的是

- A: 青霉素
- B: 多粘菌素
- C: 甲氨蝶呤
- D: 庆大霉素

答案：A

85. 药物警戒信号通过评价后，将事前检出的信号归类，提示并不存在风险，目前不需采取措施的信号属于

- A: 驳倒的信号
- B: 尚不确定的信号
- C: 确认的信号
- D: 部分确认的信号

答案：A

86. 可用于有机磷农药重度中毒，缓慢静脉注射 1~1.2g, 30 分钟后如不显效，可重复给药，好转后逐渐停药的药物是

- A: 碘解磷定
- B: 乙酰胺

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

C: 维生素 K1

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/157132143052010024>