

高级卫生专业资格(正高副高)儿科护理专业资格(正高副高)

模拟题 2021 年(70)

(总分 96.XX02,考试时间 120 分钟)

A1/A2 题型

1. 正常小儿母乳喂养方法错误的一项是 ()
 - A. 生后尽早开始哺乳
 - B. 坚持按需喂母乳
 - C. 每次哺乳时间约 15~20 分钟
 - D. 哺乳毕婴儿取左侧卧位数分钟, 以利于乳汁进入十二指肠
 - E. 哺乳后抱起婴儿轻拍其背
2. 下列哪项不是小儿肥胖症常见的发病原因 ()
 - A. 遗传因素
 - B. 家庭溺爱
 - C. 活动过少
 - D. 摄入营养过多
 - E. 维生素摄入过多
3. 新生儿窒息的首要护理措施 ()
 - A. 复温
 - B. 观察皮肤颜色
 - C. 建立呼吸
 - D. 维持体温恒定
 - E. 处理感染灶
4. 新生儿脓疱疮的病因是 ()
 - A. 表皮受真菌感染
 - B. 表皮受霉菌感染
 - C. 表皮受病毒感染
 - D. 表皮受化脓性细菌感染
 - E. 表皮受蚊虫叮咬引起
5. 预防早产儿感染的护理措施中最重要是 ()
 - A. 强化洗手意识
 - B. 工作人员衣着清洁
 - C. 诊疗用具严格消毒工作人员衣着清洁
 - D. 早产儿室空气净化
 - E. 减少病室进出人员
6. 引起病理性黄疸的常见疾病应除外 ()

- A. 新生儿肝炎
 - B. 新生儿吸入性肺炎
 - C. 先天性胆道闭锁
 - D. 新生儿溶血症
 - E. 新生儿败血症
7. 新生儿颅内出血的早期症状是 ()
- A. 烦躁不安
 - B. 眼震颤
 - C. 面颊青紫
 - D. 瞳孔不对称
 - E. 神经反射消失
8. 防治重症哮喘患儿痰栓阻塞小支气管的最主要措施是 ()
- A. 气管切开
 - B. 应用糖皮质激素
 - C. 吸痰管吸痰
 - D. 口服祛痰药
 - E. 多饮水
9. 护理急性呼吸衰竭的患儿，下列错误的操作是 ()
- A. 立即将患儿送入监护室
 - B. 患儿取半卧位或抬高床头
 - C. 立即给氧
 - D. 保持呼吸道通畅
 - E. 立即行气管切开术
10. 关于小儿气管、支气管、肺、胸廓，下列正确的描述是 ()
- A. 管腔狭窄，软骨柔软，弹力组织发育好
 - B. 粘膜血管少，纤毛运动差
 - C. 肺间质发育好，肺泡数量较少
 - D. 粘膜血管丰富，纤毛运动好
 - E. 纵隔相对较大，胸廓呈扁平状
11. 毛细支气管炎的病原体是 ()
- A. 金黄色葡萄球菌
 - B. 鼻病毒
 - C. 呼吸道合胞病毒
 - D. 腺病毒
 - E. 支原体
12. 等渗性脱水的血清钠浓度是 ()
- A. 70~100mmol/L
 - B. 100~130mmol/L
 - C. 130~150mmol/L
 - D. 150~180mmol/L
 - E. 180~210mmol/L
13. 护理急性呼吸衰竭患儿，下列正确的是 ()
- A. 立即将患儿转入普通病房
 - B. 立即行气管切开术

- C. 给患儿鼻饲
 - D. 痰液粘稠者给予超声雾化吸入
 - E. 禁止吸痰
14. 对于 6 个月的婴儿，胸外心脏按压的合适频率为 （ ）
- A. 110～130 次/分
 - B. 140～160 次/分
 - C. 90～110 次/分
 - D. 70～90 次/分
 - E. 60～70 次/分
15. 麻疹并发肺炎时应隔离至 （ ）
- A. 出疹后 5 天
 - B. 出疹后 7 天
 - C. 出疹后 10 天
 - D. 出疹后 14 天
 - E. 出疹后 21 天
16. 对脊髓灰质炎密切接触者应严密观察 （ ）
- A. 10 天
 - B. 20 天
 - C. 30 天
 - D. 40 天
 - E. 50 天
17. 急性传染病患儿的常见护理问题有 （ ）
- A. 体温过低
 - B. 皮肤感染
 - C. 潜在并发症，有继发感染的危险
 - D. 以上都对
 - E. 以上都不是
18. 对能量的需要，基础代谢所占比例最高的时期是 （ ）
- A. 青春期
 - B. 学龄期
 - C. 学龄前期
 - D. 幼儿期
 - E. 婴儿期
19. 乳量不足的表现应除外 （ ）
- A. 哺乳前乳房不胀
 - B. 哺乳时间过短
 - C. 哺乳后睡眠时间短而不安
 - D. 每次哺乳时间约为 30 分钟
 - E. 每月增长体重 0.5～0.7 kg
20. 肥胖症患儿在饮食管理上应限制的食物为 （ ）
- A. 蔬菜和水果
 - B. 低脂肪
 - C. 高蛋白，低糖类
 - D. 淀粉类，甜食，油脂

E. 以上都不是

21. 新生儿重度缺氧缺血性脑病最常见的后遗症是 ()

A. 脑脓肿

B. 脑瘫

C. 脑积水

D. 耳聋

E. 失明

22. 新生儿肺炎常见的护理问题不包括 ()

A. 气体交换受损：与肺部炎症有关

B. 清理呼吸道无效：与呼吸道分泌物增多有关

C. 有窒息的危险：与呛咳，乳汁吸入有关

D. 潜在并发症，心力衰竭：与严重缺氧有关

E. 有发生核黄疸的危险

23. 针对早产儿呼吸暂停处理错误的是 ()

A. 弹足底

B. 托背

C. 身下放置气囊床垫

D. 吸痰

E. 吸氧

24. 新生儿败血症的临床表现错误的是 ()

A. 精神不振、拒食、面色青紫

B. 少哭

C. 皮肤黄染、肝脾肿大

D. 体温恒定

E. 脐部红肿

25. 新生儿颅内出血的临床特征是 ()

A. 呼吸困难、面色青紫

B. 嗜睡、拒食

C. 体温不升，精神持续萎靡

D. 心率慢，呼吸暂停，易激惹

E. 中枢兴奋或抑制症状交替及呼吸障碍

26. 小儿肺炎全身各系统病理生理变化的关键因素是 ()

A. 机体抵抗力低下

B. 病原体侵入

C. 毒素作用

D. 缺氧和二氧化碳潴留

E. 器官发育不成熟

27. 恢复期肺炎患儿的护理措施错误的内容是 ()

A. 逐渐恢复活动，避免过劳

B. 适当增加高营养、高维生素食物以恢复体力

C. 坚持治疗及护理达到痊愈

D. 积极防治合并的贫血、佝偻病等

E. 加大锻炼强度，增强体质

28. 小儿金黄色葡萄球菌肺炎最具特点的是 ()

- A. 弛张热
 - B. 白细胞总数高，有核左移
 - C. 肺部有多发小脓肿
 - D. 可出现猩红热样皮疹
 - E. 起病急，病情严重
29. 坏死性小肠炎的治疗中错误的指 ()
- A. 扩容性休克
 - B. 应用胰蛋白酶
 - C. 肠穿孔者急诊手术
 - D. 继续进易消化食物
 - E. 用抗生素控制感染
30. 口服补液盐溶液(ORS)的配方是 ()
- A. 氯化钠 0.35g，碳酸氢钠 0.25g，氯化钾 0.15g，葡萄糖 2g，温开水 100ml
 - B. 氯化钠 0.25g，碳酸氢钠 0.35g，氯化钾 0.15g，葡萄糖 2g，温开水 100ml
 - C. 氯化钠 0.15g，碳酸氢钠 0.25g，氯化钾 0.35g，葡萄糖 2g，温开水 100ml
 - D. 氯化钠 0.35g，碳酸氢钠 0.15g，氯化钾 0.25g，葡萄糖 2g，温开水 100ml
 - E. 氯化钠 0.35g，碳酸氢钠 0.25g，氯化钾 0.25g，葡萄糖 2g，温开水 10ml
31. 给呼吸衰竭患儿气管插管后护理应特别强调 ()
- A. 体位引流
 - B. 观察患儿呼吸频率
 - C. 协助排痰
 - D. 严格执行无菌操作
 - E. 保证营养和液体供给
32. 小儿惊厥持续状态时，下列正确的处理是 ()
- A. 立即肌肉注射地西泮，每次 0.25~0.5mg/kg
 - B. 立即皮下注射地西泮，每次 0.25~0.5mg/kg
 - C. 立即肌肉注射氯硝西泮，每次 0.05~0.2mg/kg
 - D. 立即口服丙戊酸，每次 20mg/kg
 - E. 立即用水合氯醛，每次 0.5ml/kg，一次大剂量不超过 10ml，保留灌肠
33. 接触麻疹易感儿的检疫期是 ()
- A. 1 天
 - B. 3 天
 - C. 5 天
 - D. 7 天
 - E. 21 天
34. 中毒性菌痢的主要发病机制是 ()
- A. 体质异常
 - B. 胃酸浓度降低
 - C. 痢疾杆菌外毒素中毒
 - D. 特殊菌型的痢疾杆菌，外毒素中毒
 - E. 痢疾杆菌内毒素中毒
35. 蛔虫病的主要感染途径是 ()
- A. 皮肤接触
 - B. 经口吞入虫卵

- C. 经呼吸道
 - D. 经中间宿主传播
 - E. 以上都不是
36. 目前流行性腮腺炎的主要治疗是 ()
- A. 免疫治疗
 - B. 对因治疗
 - C. 对症治疗
 - D. 激素治疗
 - E. 抗生素治疗
37. 婴儿时期每天总能量的需求是 ()
- A. 376kJ(90kcal)/kg
 - B. 396kJ(95kcal)/kg
 - C. 418kJ(100kcal)/kg
 - D. 439kJ(105kcal)/kg
 - E. 460kJ(110kcal)/kg
38. 营养不良的患儿皮下脂肪消减的顺序是 ()
- A. 躯干-臀部-四肢-腹部-面颊部
 - B. 腹部-躯干-臀部-四肢-面颊部
 - C. 四肢-躯干-臀部-腹部-面颊部
 - D. 臀部-躯干-四肢-腹部-面颊部
 - E. 躯干-腹部-四肢-臀部-面颊部
39. 小儿单纯性肥胖症的诊断依据中哪项是错误的 ()
- A. 全身皮脂分布均匀
 - B. 常有多食少动史
 - C. 多有肥胖家族史
 - D. 明显肥胖者可有疲乏感
 - E. 性发育迟缓
40. 在护理呼吸窘迫综合征的患儿时, 维持婴儿体温在 36~37 摄氏度间可 ()
- A. 减少酸中毒
 - B. 减少碱中毒
 - C. 诱导产生肺泡表面活性物质
 - D. 减少氧耗量
 - E. 减慢呼吸
41. 新生儿娩出后双眼各滴入 0.25%氯霉素眼药水的目的是 ()
- A. 使新生儿睁眼
 - B. 防止眼睛干燥
 - C. 预防角膜炎
 - D. 预防化脓性结膜炎
 - E. 以上都不是
42. 预防新生儿感染的护理措施错误的是 ()
- A. 脐带脱落前, 脐部的纱布绝对不要打开
 - B. 室内应湿式清洁, 定时净化空气
 - C. 护理人员在接触新生儿前后应勤洗手或涂抹消毒液
 - D. 脐带脱落后, 每天用 75%乙醇涂抹脐部, 保持干燥

- E. 每次大便后用温水清洗臀部，以防红臀
43. 早产儿出院的标准应除外 ()
- A. 体重增至 2000g 以上
- B. 在不吸氧的情况下无呼吸暂停
- C. 在 20℃环境中能保持体温恒定
- D. 乳汁喂养量达到每天 60ml
- E. 能自己吸吮乳汁
44. 给新生儿肺透明膜病患儿使用表面活性物质时正确的体位是 ()
- A. 平卧—左侧卧—右侧卧
- B. 平卧—左侧卧—右侧卧—再平卧
- C. 平卧—左侧卧—平卧—右侧卧
- D. 平卧—右侧卧—再平卧
- E. 右侧卧—左侧卧—再平卧
45. 肺炎易出现的并发症是 ()
- A. 呼吸衰竭
- B. 心力衰竭
- C. 中毒性脑病
- D. 中毒性肠麻痹
- E. 脓气胸
46. 小儿肺炎合并心力衰竭常以哪种衰竭为主 ()
- A. 左心衰竭
- B. 右心衰竭
- C. 全心衰竭
- D. 末梢循环衰竭
- E. 脑循环衰竭
47. 引起小儿疱疹性咽峡炎的病原体是 ()
- A. 合胞病毒
- B. 柯萨奇病毒
- C. 流感病毒
- D. 腺病毒
- E. 疱疹病毒
48. 下列哪一项是重度脱水的表现 ()
- A. 皮肤弹性下降
- B. 眼窝凹陷极明显
- C. 烦躁或萎靡
- D. 尿量减少
- E. 精神无明显改变
49. 急性心力衰竭的表现不正确的是 ()
- A. 幼儿呼吸 ≥ 40 次/分
- B. 幼儿心率 120 次/分
- C. 心音低钝.心脏扩大
- D. 肝脏在短期内增大
- E. 出现奔马律
50. 正确的护理急性护理心力衰竭患儿的措施是 ()

- A. 让患儿休克体位
B. 经常给患儿吸痰
C. 供应充足的水量
D. 用洋地黄之前要先测心率
E. 用洋地黄期间要少摄入含钾食物，多摄入含钙食物
51. 颅内感染引起惊厥不常见的病因是 ()
A. 细菌性脑膜炎
B. 寄生虫
C. 原虫
D. 衣原体
E. 病毒
52. 无并发症的麻疹患儿，从出疹日计算，应隔离的天数是 ()
A. 1 天 B. 2 天
C. 3 天 D. 5 天
E. 7 天
53. 流行性乙型脑炎的主要传染源是 ()
A. 候鸟
B. 马、牛、驴
C. 猪
D. 蝙蝠
E. 鸡、鸭、鹅
54. 小儿时期患结核病最常见的类型是 ()
A. 干酪性结核
B. 结合性胸膜炎
C. 粟粒性结核
D. 支气管内膜结核
E. 原发性结核
55. 婴儿沐浴时室内温度应调节在 ()
A. 24℃
B. 26℃
C. 28℃
D. 30℃
E. 32℃
56. 饮食中蛋白质、脂肪和糖类化合物所供给的能量应占总能量的百分比为 ()
A. 12~15% 50~60% 30~35%
B. 12~15% 30~35% 50~60%
C. 30~35% 50~60% 12~15%
D. 50~60% 12~15% 30~35%
E. 50~60% 30~35% 12~15%
57. 为中，重度营养不良患儿补液时，下列哪项不正确 ()
A. 补液速度稍慢
B. 注意补充热量和蛋白质
C. 注意补钙，补镁
D. 补液总量应适当减少

E. 不应补钾

58. 肥胖心肺综合征临床表现不包括 ()

A. 低氧血症

B. 呼吸深长

C. 充血性心力衰竭

D. 肺通气不足

E. 继发性红细胞增多症

59. 新生儿颅内压增高重要的体征是 ()

A. 瞳孔不等大

B. 巴宾斯基征阳性

C. 呼吸不规则

D. 脑膜刺激征阳性

E. 前囟隆起

60. 可以停止光疗的胆红素浓度是 ()

A. $280\mu\text{mol/L}$

B. $256.5\mu\text{mol/L}$

C. $205.2\mu\text{mol/L}$

D. $171\mu\text{mol/L}$

E. $85\mu\text{mol/L}$

61. 正常新生儿消化系统的特點是 ()

A. 消化面积相对较大，不利于营养的吸收

B. 胰液淀粉酶活力较高

C. 胎粪呈黑色，一般出生后 12 小时内开始排泄

D. 肝葡萄糖醛酸转换酶活力较高

E. 胃呈水平位，贲门括约肌发育较幽门括约肌差

62. 新生儿脑相对较大，占体重 ()

A. 40~50%

B. 30~40%

C. 20~30%

D. 10~20%

E. 5~10%

63. 2 个月的婴儿，因先天性心脏病合并肺炎入院，现出现心力衰竭征象，并有咳嗽及痰鸣音，为该患儿清理呼吸道宜选用 ()

A. 给患儿多饮水

B. 超声雾化吸入

C. 给患儿翻身，叩击其胸部

D. 体位引流

E. 负压吸引

64. 引起支气管肺炎最常见的细菌是 ()

A. 肺炎链球菌

B. 革兰阴性杆菌

C. 流感嗜血杆菌

D. 大肠杆菌

E. 厌氧菌

65. 急性感染性喉炎患儿的病室湿度应保持在 ()
- A. 45~50%
 - B. 50~55%
 - C. 55~60%
 - D. 50~60%
 - E. 60%以上
66. 婴幼儿急性上呼吸道感染早期重点预防的并发症是 ()
- A. 结膜炎
 - B. 中耳炎
 - C. 咽后壁脓肿
 - D. 支气管炎
 - E. 高热惊厥
67. 婴儿腹泻中度脱水, 失水占体重的百分比为 ()
- A. 1~2%
 - B. 1~5%
 - C. 2~5%
 - D. 5~10%
 - E. 10~15%
68. 对使用甘露醇脱水治疗的患儿的护理措施不包括 ()
- A. 静脉输入速度要慢
 - B. 一般 6~8 小时一次
 - C. 精确记录尿量
 - D. 每次剂量每公斤体重 0.5~1.0g
 - E. 以上都不是
69. 抗休克首批补液方法为 ()
- A. 5~10ml/kg, 于 1 小时内输完
 - B. 10~20ml/kg, 于 6 小时内输完
 - C. 10~20ml/kg, 于 1 小时内输完
 - D. 5~10ml/kg, 于 6 小时内输完
 - E. 20~50ml/kg, 于 6 小时内输完
70. 重症患儿, 肺炎, 8 个月, 现病情加重, 出现抽泣样呼吸, 面色发绀, 意识模糊, 吸氧后未见好转, 已送入监护室, 你认为首选的护理措施是 ()
- A. 选择气管插管
 - B. 吸痰
 - C. 做健康指导
 - D. 测生命体征
 - E. 休息
71. 引起流行性脑脊髓膜炎的原因是 ()
- A. 麻疹或风疹病毒
 - B. 肺炎球菌
 - C. 脑膜炎双球菌
 - D. 乙型脑炎病毒
 - E. 大肠杆菌感染
72. 小儿预防麻疹最重要的措施是 ()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/158076050010006036>