

2024 年河北省滦南县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题真题（名师系列）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，男，34 岁，有吸毒史。因过量使用阿片类药物昏迷入急诊抢救，表现为针尖样瞳孔、呼吸抑制，可选用的解救药物是（）

- A: 纳洛酮
- B: 维生素 K
- C: 亚甲蓝
- D: 二巯丙醇

答案：A

2. 抑制细菌核酸合成的药物是

- A: 头孢米诺
- B: 利福喷汀
- C: 磺胺嘧啶
- D: 头孢哌酮

答案：B

3. 药物不良反应报告的描述项目

- A: 药品不良反应动态变化的相关症状体征、检查及干预措施结果
- B: 患者疾病发病时间
- C: 患者用药记录
- D: 采取措施干预不良反应的时间

答案：A

4. 老年女性，心功能衰竭，服用呋塞米及螺内酯片，正确的使用方法是()

- A: 用温水调服
- B: 应同时碱化尿液
- C: 清晨服用
- D: 舌下含服

答案：C

5. 痉挛性便秘

- A: 开塞露
- B: 乳果糖
- C: 羧甲基纤维素钠
- D: 比沙可啶

答案：C

6. 合并闭角型青光眼的前列腺增生症患者不宜选用的药物是

- A: 多沙唑嗪
- B: 坦索罗辛
- C: 非那雄胺
- D: 托特罗定

答案：D

7. 冠状动脉粥样硬化心脏病患者，如没有用药禁忌证，欲服用阿司匹林作为一级预防，最佳剂量范围是：

- A: 150-300mg/d
- B: 25-70mg/d
- C: 75-150mg/d
- D: 25-77mg/d

答案：C

8. 患者，男性，58 岁，患有膀胱肿瘤，经常出现不能控制的尿频、尿急、夜尿增多。确诊为急迫性尿失禁，给予托特罗定治疗。药师应告知患者药物的主要不良反应是

- A: 鼻咽炎和尿路感染
- B: 卧位和坐位时高血压
- C: 直立性低血压
- D: 口干、便秘、尿潴留

答案：D

9. 告知"培高利特致心脏瓣膜病风险已经撤市"属于

- A: 禁忌证
- B: 药品不良反应
- C: 合理用药信息
- D: 药物相互作用

答案：B

10. 医院获得性肺炎无感染高危因素患者的最常见病原体为

- A: 肺炎链球菌
- B: 金黄色葡萄球菌
- C: 流感嗜血杆菌
- D: 大肠杆菌

答案：A

11. 静脉滴注给予万古霉素，滴注时间应该控制的时间是

- A: 4 小时以上
- B: 1 小时以上

C: 6 小时以上

D: 2 小时以上

答案：D

12. “药师参与临床药物治疗，提供药学服务的重要方式和途径”的工作是

A: 静脉药物配置

B: 治疗药物监测

C: 处方调剂

D: 参与临床药物治疗

答案：B

13. 收录 5500 余种药物专论、4 万多篇参考文献的是

A: 《美国药典药物信息》

B: 《马丁代尔药物大典》

C: 《中国国家处方集》

D: 《药物事实与比较》

答案：B

14. 药品不良反应的诱因主要是药物因素与患者因素。预防不良反应须采取多项措施

A: 注意 ADR 症状，尤其是迟发反应

B: 注意特殊人群用药

C: 了解患者及其家族的过敏史

D: 注意定期监测器官功能

答案：A

15. (解救常见毒物中毒的催吐措施)，可用口服吐根糖浆 15ml、饮水 500ml 催吐解救的中毒是

- A: 三唑仑中毒
- B: 磷化锌中毒
- C: 丙米嗪中毒
- D: 丙戊酸钠中毒

答案：C

16. 最容易受光线影响而变质的药品是

- A: 胰岛素制剂
- B: 抗生素胶囊剂
- C: 氨基酸注射剂
- D: 注射用抗生素

答案：C

17. 适用于年轻、震颤明显患者的是

- A: 恩托卡朋
- B: 司来吉兰
- C: 苯海索
- D: 左旋多巴

答案：C

18. 患者，男，67 岁，因带状疱疹前来就诊，实验室检查肌酐清除率 100ml/min，医生处方阿昔洛韦片治疗，对于该患者，适宜的用法用量是()

- A: 0.4g，每日 4 次
- B: 0.4g，每日 2 次
- C: 0.8g，每日 3 次

D: 0.4g, 每日 5 次

答案: D

19. 部分药品的中文药名容易混淆，药师在审核处方时应格外小心，防止处方出现用药错误。下列处方中符合适应证的是

A: 为疱疹病毒患者开具阿糖胞苷

B: 为闭塞性脑血管病、中心性视网膜炎患者开具曲克芦丁

C: 为肿瘤患者开具氟胞嘧啶

D: 为社区获得性肺炎患者开具柔红霉素

答案: B

20. 心力衰竭的风湿性心脏病禁用

A: RAAS 抑制剂

B: 利尿剂

C: 强心苷

D: β 受体阻断剂

答案: C

21. (2019 年真题) 患者，女，56 岁，身高 156cm，体重 61kg。空腹血糖 7.8mmol/L，餐后血糖 11.2mmol/L，糖化血红蛋白 6.7%。

A: 阿卡波糖片

B: 二甲双胍片

C: 瑞格列奈片

D: 格列美脲片

答案: D

22. 结核杆菌生命力顽强，且易产生耐药性，临床采用标准化学治疗方案

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 3HRZE / 9HR

B: 2HRZE / 4HR

C: 2HRZE / 4HR

D: 2HRE / 7HR

答案：D

23. 提供的信息是否涉及某个厂家或某个品牌的药品，是衡量互联网信息的

A: 权威性

B: 新颖性

C: 合理性

D: 归因性

答案：C

24. S-兰索拉唑在体内代谢的主要肝药酶是

A: CYP1A2

B: CYP2C19

C: CYP2C8

D: CYP2C9

答案：B

25. 心力衰竭抗高血压药物的禁忌证

A: 氢氯噻嗪

B: 维拉帕米

C: 美托洛尔

D: 依那普利

答案：B

26. 射击运动员使用后,可减慢心率,减少心肌耗氧量,消除比赛前紧张心理,因此被列入兴奋剂管理的药物是()

- A: 硝苯地平
- B: 呋塞米
- C: 普萘洛尔
- D: 缬沙坦

答案: C

27. 关木通事件, 关木通会导致严重的肾毒性, 是因为

- A: 其含有刺五加
- B: 其含有甲氨蝶呤
- C: 其含有二甘醇
- D: 其含有马兜铃酸

答案: D

28. 低 HDL-C 血症, 宜选用的药物是

- A: 他汀类
- B: 贝特类
- C: 烟酸
- D: ω -3 脂肪酸

答案: C

29. 重症、急救治疗时, 要求药物迅速起效, 最不宜选用的给药途径是

- A: 吸入给药
- B: 静脉滴注
- C: 腔道给药
- D: 喷雾给药

答案：C

30. 患者，女，33 岁，患有高铁血红蛋白血症，可选用的治疗药物是

- A: 纳洛酮
- B: N-乙酰半胱氨酸
- C: 亚甲蓝
- D: 青霉胺

答案：C

31. 无治疗指征补钙

- A: 盲目联合用药
- B: 非适应证用药
- C: 过度治疗用药
- D: 超适应证用药

答案：C

32. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及暖气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

A: 四环素 500mg tid+甲硝唑 400mg tid+艾司奥美拉唑 20mg bid+枸橼酸铋钾 220mg bid。疗程 2 周

B: 阿莫西林 1000mg bid+克拉霉素 500mg bid+艾司奥美拉唑 20mg bid+枸橼酸铋钾 220mg bid；疗程 2 周

C: 克拉霉素 500mg bid+左氧氟沙星 200mg bid+甲硝唑 400mg qid+艾司奥美拉唑 20mg bid，疗程 2 周

D: 左氧氟沙星 500mg qd+呋喃唑酮 100mg bid+四环素 500mg qid+枸橼酸铋钾 220mg bid，疗程 2 周

答案：A

33. 痛风缓解期在关节炎症控制 1~2 周开始使用

A: 阿司匹林

B: 别嘌醇

C: 秋水仙碱

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 丙磺舒

答案：B

34. 下列药品中，与血浆蛋白结合率高、分布容积随年龄增长而降低、容易造成老年人血药浓度升高而致中毒的是

A: 维生素 C

B: 碳酸钙

C: 地西泮

D: 巴比妥

答案：C

35. 硫脲类最严重的不良反应是

- A: 粒细胞缺乏
- B: 中枢抑制
- C: 甲状腺功能亢进
- D: 甲状腺功能低下

答案：A

36. 患者,男,64 岁,因右足肿痛就诊。查体:右脚第一趾关节红肿,触痛明显。化验结果:血尿酸 581 μ mol/L。诊断为急性痛风性关节炎。患者合并高血压、高胆固醇血症、冠心病,目前正服用氢氯噻嗪片 25mgqd、美托洛尔缓释 47.5mgqd、赖诺普利片 20mgqd、辛伐他汀片 10mgqd、阿司匹林肠溶片 100mgqd。

- A: 阿司匹林片 (300mg)
- B: 贝诺酯片
- C: 别嘌醇片
- D: 双氯芬酸钠片

答案：D

37. 有磺胺类过敏史者禁用的药物是

- A: 磺胺醋酸钠滴眼液
- B: 可的松滴眼液
- C: 硫酸锌滴眼液
- D: 酞丁安滴眼液

答案：A

38. (2015 年真题) 过量服用维生素 D 所发生中毒的典型临床表现是 ()。

- A: 横纹肌溶解或肌痛
- B: 间质性肾炎或肾结石

C: 骨质疏松症或骨折

D: 骨骼发育不良或骨软化

答案: B

39. 患者，男，35 岁。于午饭后即开始出现胃部疼痛，胀满食少，后感觉脐周硬结、闷痛、拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因蛋白质进食过多而导致的继发性消化不良。

A: 助消化药与吸附剂合用须间隔 2~3h

B: 胰酶口服时应嚼碎服用

C: 多潘立酮可能引起心脏相关风险

D: 复方消化酶制剂送服时不宜用热水

答案: B

40. 属于选择性 5-HT₄ 受体激动剂，促进乙酰胆碱释放的促胃肠动力药是

A: 甲氧氯普胺

B: 昂丹司琼

C: 莫沙必利

D: 多潘立酮

答案: C

41. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。

日前体检：身高 160cm，体重 70kg；白细胞 $8.0 \times 10^9/L$

A: 低血糖

B: 肌痛

C: 心力衰竭

D: 乳酸酸中毒

答案: D

42. 饭后半小时服用的药物是（）

- A: 瑞巴派特
- B: 枸橼酸铋钾
- C: 雷贝拉唑
- D: 吉法酯

答案：D

43. 治疗窗窄以及代谢存在较大个体差异的药物是（）

- A: 顺铂
- B: 茶碱
- C: 地高辛
- D: 苯妥英钠

答案：B

44. 为了避免夜间排便，泻药硫酸镁应该

- A: 清晨服用
- B: 睡前服用
- C: 餐前服用
- D: 餐后服用

答案：A

45. 美金刚的主要不良反应是

- A: 血脂升高
- B: 幻觉
- C: 呼吸抑制
- D: 心律不齐

答案：B

46. 药物信息按照其最初来源通常分为三级，即以期刊发表的原创性论著为主的一级信息源、引文和摘要服务为主的二级信息源以及参考书和数据库为主的三级信息源。

- A: 提供的信息丰富、详实
- B: 能看到研究细节如试验设计、数据处理等
- C: 内容全面、细致
- D: 内容广泛、使用方便

答案：D

47. 处方用药须与临床诊断密切相符，医师开具的处方在病情与诊断栏中应明确记录对患者的临床诊断。药师应审查处方用药与临床诊断的相符性，以加强合理用药监控。

- A: 联合用药不适宜
- B: 有禁忌证用药
- C: 过度治疗用药
- D: 无适应证用药

答案：D

48. II 期临床试验很难发现"低于 1%发生频率"的不良反应，缘于

- A: 观察时间短
- B: 病例数目少
- C: 考察不全面
- D: 管理漏洞

答案：B

49. 黄体酮用于输尿管结石

- A: 超适应证用药

- B: 盲目联合用药
- C: 无适应证用药
- D: 过度治疗用药

答案：A

50. 可治疗原发性痛经的药物是

- A: 前列腺素类似物
- B: 非甾体抗炎药
- C: 肾上腺糖皮质激素
- D: 钙通道阻滞剂

答案：B

51. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速做出准确判断，及时果断地采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

- A: 催吐、洗胃
- B: 导泻与洗肠
- C: 静脉补液
- D: 吸氧

答案：A

52. 抗抑郁药物的合理使用既无兴奋、镇静作用，又无抗胆碱、抗组胺作用的药物是

- A: 阿米替林
- B: 氟伏沙明
- C: 丙米嗪
- D: 帕罗西汀

答案：B

53. (2019 年真题) 患者，女，56 岁，身高 156cm，体重 61kg。空腹血糖 7.8mmol/L，餐后血糖 11.2mmol/L，糖化血红蛋白 6.7%。

- A: 增加一种口服降糖药
- B: 换用其他作用机制的口服降糖药
- C: 增加现用降糖药的剂量
- D: 换用胰岛素治疗

答案：D

54. 以下有关肝功能不全病人用药的叙述中，不正确的是

- A: 静脉给药可不调整剂量
- B: 定期检查肝功能，及时调整治疗方案
- C: 避免或减少使用或合用对肝脏毒性大的药物
- D: 明确诊断，合理选药

答案：A

55. 1 级高血压标准是

- A: 收缩压 160~179mmHg 和(或)舒张压 100~109mmHg
- B: 收缩压 ≥ 180 mmHg 和(或)舒张压 ≥ 110 mmHg
- C: 收缩压 120~139mmHg 和(或)舒张压 80~89mmHg
- D: 收缩压 140~159mmHg 和(或)舒张压 90~99mmHg

答案：D

56. 药师沟通技能不包含

- A: 应用医学术语
- B: 认真倾听
- C: 介绍自己

D: 观察评估

答案：A

57. 引起急性细菌性扁桃体炎最常见的致病菌是

A: 大肠埃希菌

B: A 组 β 溶血性链球菌（化脓性链球菌）

C: 金黄色葡萄球菌

D: 肺炎链球菌

答案：B

58. 患者男,9 岁入院诊断为急性淋巴细胞白血病,临床计划鞘内注射药物预防中枢白血病,宜选用的药物是 ()

A: 亚叶酸钙

B: 维生素 B6

C: 甲氨蝶呤

D: 长春新碱

答案：C

59. 指本次不良反应经采取相应的医疗措施后的结果；如不良反应已经好转，后患者又死于原患疾病或与此不良反应无关的并发症，此栏应填“好转”

A: 不良反应 / 事件的结果

B: 用药原因

C: 用药起止时间

D: ADR / ADE 过程描述

答案：A

60. 用量化的方法表达治疗目的，不以货币为单位。该药物经济学评价方法是

- A: 成本-效用分析
- B: 最小成本分析
- C: 成本-效果分析
- D: 成本-效益分析

答案：C

61. 根据药物对胎儿的危害，美国 FDA 将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别属于妊娠毒性 X 级的药物是查看材料

- A: 阿莫西林
- B: 葡萄糖
- C: 沙利度胺
- D: 万古霉素

答案：C

62. 6 个月～2 岁儿童的白细胞计数的正常范围值

- A: $(10.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$
- B: $(15.0 \sim 20.0) \times 10^9/L$
- C: $(3.5 \sim 10.0) \times 10^9/L$
- D: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9/L$

答案：D

63. 妊娠期妇女治疗眼疾不宜应用的药品是

- A: 醋酸可的松滴眼剂
- B: 利福平滴眼剂
- C: 酞丁安滴眼剂
- D: 硫酸锌滴眼剂

答案：C

64. 下列白细胞计数中，属于不正常的是

- A: 成人 $4.3 \times 10^9 / L$
- B: 新生儿 $15.0 \times 10^9 / L$
- C: 成人 $3.5 \times 10^9 / L$
- D: 成人 $5.0 \times 10^9 / L$

答案：C

65. 肾移植术后发生排斥反应时，会使淋巴细胞

- A: 不稳定
- B: 减少
- C: 增多
- D: 前期减少后期增多

答案：C

66. 心律失常患者用药治疗期间应该禁用的是

- A: 烟
- B: 酒
- C: 咖啡
- D: 浓茶

答案：D

67. (2016 年真题) 以延长患者生命时间为指标开展的药物经济学评价方法属于 ()。

- A: 成本-效益分析
- B: 成本-效用分析
- C: 成本-效果分析

D: 最小成本分析

答案: C

68. (2019 年真题) 患者，女，56 岁，既往有高血压、高脂血症病史，长期服用依那普利片、阿托伐他汀钙片。现因上腹痛 2 周，伴黑便数日就诊。患者自诉 3 周前因膝关节痛，服用布洛芬，疼痛未缓解，自行加用萘普生。胃镜检查显示:胃窦小弯侧有一约 7mm 溃疡，幽门螺杆菌 (Hp) 阳性。肾功能未见异常。

- A: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) + 枸橼酸铋钾 + 阿莫西林 + 克拉霉素
- B: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) + 枸橼酸铋钾 + 克拉霉素 + 左氧氟沙星
- C: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) + 阿莫西林 + 克拉霉素
- D: 埃索美拉唑 (艾司奥美拉唑) + 枸橼酸铋钾 + 阿莫西林 + 甲硝唑

答案: D

69. 某女性，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发发生喘憋。体检:端坐体位，BP190/110mmHg，R30 次/分，Bp108 次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 多索茶碱
- B: 硝普钠
- C: 西地兰
- D: 硝苯地平

答案: C

70. 服药时进食高脂肪食物可促进药物吸收的是

- A: 维生素 A
- B: 格列本脲
- C: 硫酸亚铁

D: 西咪替丁

答案: A

71. 主要不良反应为锥体外系反应的是

A: 甲氧氯普胺

B: 莫沙必利

C: 多潘立酮

D: 西沙必利

答案: A

72. 下列药物中，驾驶员服用后可能出现定向力障碍的是

A: 金刚烷胺

B: 氟桂利嗪

C: 哌替啶

D: 双氯芬酸

答案: C

73. 可引起嗜酸性粒细胞减少的药物不包括

A: 坎地沙坦

B: 氢化可的松

C: 甲基多巴

D: 头孢氨苄

答案: D

74. (2019 年真题) 患者，男，28 岁，外出进餐后出现腹泻，一日 6 次，水样便，无发热和腹痛症状。宜选用的药物是

A: 蒙脱石散

B: 奥美拉唑肠溶胶囊

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 干酵母片

D: 复方阿嗟米特肠溶片

答案: A

75. 与胆酸螯合剂合用，应至少提前 2h 服用的药物是

A: 伊曲康唑

B: 螺内酯

C: 依折麦布

D: 他汀类与烟酸类联用

答案: C

76. 能监测用药过程错误的真实发生率的是

A: 计算机检测方法

B: 直接观察

C: 病历审查

D: 岗位工作问责

答案: B

77. 以下药物中，可引起粒细胞减少症的是()。

A: 环磷酰胺

B: 吲哚美辛

C: 巯嘌呤

D: 甲氨蝶呤

答案: B

78. 临床试验观测的指标只限于实验设计内容，其他临床指标容易被忽视，属于

A: 病例数目少

- B: 管理漏洞
- C: 考察不全面
- D: 观察时间短

答案: C

79. (2016 年真题) 患者，男，40 岁，因肺结核使用抗结核药后，四肢出现针刺感，导致这种症状的药物是 ()。

- A: 异烟肼
- B: 吡嗪酰胺
- C: 利福平
- D: 乙胺丁醇

答案: A

80. 某溶液的浓度为 1: 100，其含义为

- A: 100ml 溶液中含有 1ml 溶质
- B: 100g 溶液中含有 1g 溶质
- C: 100ml 溶液中含有 1g 溶质
- D: 1L 溶液中含有的溶质为 0.1mol

答案: C

81. 张先生，30 岁，来药店咨询湿疹治疗药物。经询问后得知：他有多年的湿疹病史，经常购买氢化可的松软膏治疗湿疹。这次湿疹加重，足踝、小腿部、双手都有皮损分布，手部皮肤破裂并有渗出。药师应给予的正确建议是

- A: 建议使用炉甘石洗剂
- B: 建议口服氢化泼尼松
- C: 建议患者就医
- D: 建议改用强效外用糖皮质激素哈西奈德

答案：C

82. 维生素 A 用于

- A: 防治坏血病
- B: 习惯性流产的辅助治疗
- C: 防治佝偻病
- D: 防治夜盲症

答案：D

83. 峰值一般在清晨 7~8 时，谷值则在午夜 0 时，是指

- A: 肝脏合成胆固醇的规律
- B: 糖皮质激素的分泌规律
- C: 胃酸的分泌规律
- D: 胰岛 B 细胞的分泌规律

答案：B

84. 躯干部出现鞭打状色素沉着

- A: 博来霉素
- B: 氟尿嘧啶
- C: 柔红霉素
- D: 白消安

答案：A

85. 下列药物中，解救硫喷妥钠中毒的特效药是

- A: 硫酸铜
- B: 硫酸镁
- C: 丙烯吗啡

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 碳酸氢钠

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/158125011044007022>