

乳腺外科试题及答案

71

表现不光滑的乳房单发硬块应首先考虑

- A. 乳腺纤维腺瘤
- B. 乳腺癌
- C. 急性乳腺炎
- D. 乳腺囊性增生病
- E. 以上都不对

正确答案：B

72

乳腺囊性增生病的典型临床特征为

- A. 肿块有压痛
- B. 乳房胀痛与月经周期有关
- C. 肿块界限不清
- D. 肿块有结节
- E. 以上都不对

正确答案：B

73

女，25岁，初产妇哺乳期，右乳房疼痛2天，体温39℃，局部有明显压痛，诊为急性乳腺炎，在诊断依据辨析中，下列哪项是错误的

- A. 哺乳期局部疼痛
- B. 局部有明显压痛
- C. 体温高
- D. 好发于初产妇
- E. 因病人局部皮肤不红，表皮温度较对侧升高不明显，诊断不能肯定

正确答案：E

74

患者，女性，27岁，发现右乳单发肿块1年，边界清，表面光滑，肿块可推动，1年来肿块无明显增大，最可能的诊断是

- A. 浆细胞性乳腺炎
- B. 乳腺囊性增生
- C. 乳腺纤维腺瘤
- D. 乳腺癌
- E. 乳腺脂肪坏死

正确答案：C

75

乳腺癌出现“酒窝征”的原因是

- A. 癌肿压迫乳管
- B. 合并感染
- C. 周围组织粘连
- D. 淋巴管癌栓阻塞
- E. 癌肿侵犯 Cooper 韧带

正确答案：E

76

下列有关乳腺癌的描述，哪项是错误的

- A. 乳房外上象限发生率最高，接近 50%
- B. 骨转移的主要部位是肋骨
- C. “橘皮征”是皮内和皮下淋巴管被癌细胞堵塞所致
- D. Paget 病的原发灶在乳头区的大乳管内
- E. 治疗方针应是尽早手术，辅以放、化疗等综合疗法

正确答案：B

77

乳腺癌的治疗首选是

- A. 手术治疗
- B. 切开引流
- C. 化疗
- D. 放疗
- E. 内分泌治疗

F. 生物治疗

正确答案：A

78

急性乳腺炎早期治疗

A. 手术治疗

B. 切开引流

C. 化疗

D. 放疗

E. 内分泌治疗

F. 生物治疗

正确答案：B

79

一哺乳患者，右乳内发现 4cm 大硬块，疼痛已 2 天，多为

A. 乳腺癌

B. 炎性乳癌

C. 急性乳腺炎

D. 肉瘤

E. 乳腺囊性增生病

正确答案：C

80

某病人 55 岁，女性，发现右侧乳腺肿块一周，查右乳外上象限肿物 1.5cm×1.0cm，

质硬，活动度校如想确定肿物性质最可靠的方法是

A. 针刺细胞学

B. 钼靶 X 线

C. B 超

D. 同位素扫描

E. 活组织冰冻切片

正确答案：E

81

某 26 岁初产妇，右乳外上象限红肿，压痛，有波动，该处抽出脓液。下列处置哪项是错误的：

- A. 不要分离脓肿隔膜以防扩散
- B. 切口应按轮辐方向
- C. 切口应达到引流通畅
- D. 必要时做对口引流
- E. 手术治疗

正确答案：A

82

乳腺癌直径 4cm，腋下扪及 3 个淋巴结，其治疗原则是

- A. 乳腺单纯切除
- B. 单纯切除+放疗
- C. 仅用化疗
- D. 单纯切除+化疗
- E. 乳腺癌根治术

正确答案：E

83

女性，26 岁，左乳房外上象限内 3cm 圆形光滑肿块已 8 个月，质韧，活动佳。

可能为：

- A. 早期乳腺癌
- B. 纤维腺瘤
- C. 柏哲乳头病
- D. 乳房囊性增生病
- E. 结核

正确答案：B

84

某 60 岁女性，考虑乳腺癌，行乳腺根治术后，病理检查提示：乳腺浸润性导管癌，腋窝淋巴结查见转移癌（6 / 20），ER（+）、PR（+）。辅助治疗应选

- A. 放射治疗

- B. 放射治疗或化疗
- C. 化疗+放射治疗+内分泌治疗
- D. 放射治疗或化疗+双侧卵巢切除
- E. 抗癌药物治疗

正确答案：C

85

浆细胞性乳腺炎是：

- A. 金黄色葡萄球菌引起的急性化脓性炎症
- B. 结核杆菌引起的慢性炎症
- C. 属于慢性淋巴管炎
- D. 乳腺组织的无菌性炎症
- E. 急性蜂窝组织炎

正确答案：A

86

下列乳腺癌病理类型中预后不好的是：

- A. 乳腺导管内癌
- B. 乳腺早期浸润性导管癌
- C. 乳头湿疹样乳腺癌
- D. 乳腺高分化腺癌
- E. 炎性乳癌

正确答案：E

87

乳腺恶性肿瘤中最常见的是：

- A. 乳腺癌
- B. 乳腺纤维腺瘤
- C. 乳管内乳头状瘤
- D. 乳房肉瘤
- E. 乳腺纤维肉瘤

正确答案：A

88

乳腺良性肿瘤中最常见的是：

- A. 乳腺癌
- B. 乳腺纤维腺瘤
- C. 乳管内乳头状瘤
- D. 乳房肉瘤
- E. 乳腺纤维肉瘤

正确答案：B

89

我国乳腺癌患者好发年龄为：

- A. 20-30 岁
- B. 25-35 岁
- C. 45-55 岁
- D. 60-70 岁
- E. 以上都不对

正确答案：C

90

下列说法正确的是：

- A. 乳腺癌是局部病变，手术切除范围越大效果越好
- B. 乳腺癌早期可通过血运和淋巴转移至多个器官，只切除乳腺肿瘤就行了
- C. 乳腺癌是全身疾病，手术切除范围大小约对预后影响没影响
- D. 乳腺癌是全身疾病，需要采取手术、化疗、放疗、内分泌治疗等综合措施
- E. 以上都不对

正确答案：D

91

乳管内乳头状瘤的描述正确的是：

- A. 很容易摸到，挤压后有白色液体流出
- B. 局部疼痛明显，理疗后可缓解
- C. 大部分病例均会发生恶变，应早期切除

- D. 如未扪及肿块，可考虑用药物促其排出
 - E. 多为良性，有癌变可能，乳头通常有血性溢液，但肿块不易摸到
- 正确答案：E

92

乳腺囊性增生症目前最有效的治疗是：

- A. 饮食调节
- B. 休息
- C. 手术切除
- D. 控制情绪
- E. 以上都不是

正确答案：E

93

乳腺囊性增生症突出的表现是：

- A. 乳房胀痛和乳房肿块
- B. 乳头溢液
- C. 乳房不对称肿大
- D. 乳头溃烂
- E. 乳房无痛性肿块

正确答案：A

94

乳腺管内乳头状瘤好发生于乳腺的哪个部位？

- A. 主乳管内
- B. 乳腺内上象限
- C. 乳腺外上象限
- D. 乳腺尾叶
- E. 乳腺分支及边缘乳管

正确答案：A

95

下列哪些乳腺癌病人不需要行放射治疗：

- A. 乳腺癌并全身多处转移
- B. 乳腺癌并锁骨上淋巴结转移
- C. 乳腺癌腋窝淋巴结转移
- D. 无腋窝淋巴结转移的早期乳腺癌
- E. 以上都需要

正确答案：D

96

乳腺癌淋巴转移最初多见于：

- A. 锁骨上
- B. 胸廓内
- C. 胸骨旁
- D. 肺
- E. 腋窝

正确答案：E

97

乳腺囊性增生症引起的乳腺疼痛与哪种因素关系密切：

- A. 饮食
- B. 休息
- C. 月经周期
- D. 情绪过于兴奋
- E. 以上都不是

正确答案：C

98

乳腺纤维腺瘤首眩灸治疗方法是：

- A. 手术切除
- B. 放疗
- C. 化疗
- D. 中药治疗
- E. 药物外敷或理疗

正确答案：A

99

乳腺癌通过血液发生远处转移，最常见的转移顺序依次为：

- A. 肺、皮肤、肝
- B. 心、肾、肺
- C. 心、肝、胰腺
- D. 肺、骨、肝
- E. 心、脑、肺

正确答案：D

100

目前认为乳腺纤维腺瘤和那种因素有关：

- A. 暴饮暴食
- B. 生育过早
- C. 月经过迟
- D. 雌激素作用活跃
- E. 外伤

正确答案：D

101

乳腺癌内分泌治疗时需服用三苯氧胺，其用药时间通常为：

- A. 半年
- B. 1 年
- C. 5 年
- D. 8 年
- E. 10 年

正确答案：C

102

对于绝经后乳腺癌患者，内分泌治疗首选药物为：

- A. 芳香化酶抑制剂
- B. 雌激素

- C. 三苯氧胺+氟尿嘧啶
- D. 赫赛汀
- E. 紫杉醇

正确答案：A

103

乳头溢血最佳的检查方法为：

- A. 乳腺B超
- B. 乳腺钼靶摄片
- C. 乳腺CT
- D. 乳腺红外线扫描
- E. 乳管内窥镜检查

正确答案：E

104

乳腺癌病理类型中最常见的类型是：

- A. 乳腺浸润性导管癌
- B. 乳腺鳞状细胞癌
- C. 乳腺低分化腺癌
- D. 乳腺原位癌
- E. 乳腺肌纤维母细胞瘤

正确答案：A

105

女性，56岁，左乳外上象限一肿块二年，近一个月增大明显而来诊。体格检查：左乳外上象限扪及一4cm×3cm大较实肿物，固定，似与胸壁粘连，左侧腋下肿大淋巴结成块状，移动度差，左锁骨上淋巴结肿大，约2cm×1cm大小，经其他各项检查，该患者被确诊为乳癌，应属于哪一期：

- A. 0期
- B. I期
- C. II期
- D. III期

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/165103114140011102>