

1、哮喘持续状态是指严重哮喘持续多长时间

- A、6小時
- B、10小時
- C、24小時
- D、48小時
- E、12小時

答案：C

2、下列哪项不符合胃溃疡癌变的特点

- A、上腹痛的规律性消失
- B、食欲减退
- C、进行性贫血，消瘦
- D、大便潜血持续阳性
- E、返酸烧心加重

答案：E

3、消化性溃疡病人在何种条件下疼痛节律会变化或消失

- A、疲劳時
- B、饮酒時
- C、受凉時
- D、焦急時
- E、癌变時

答案：E

4、患者大咯血，首选予以的止血药为

1、哮喘持续状态是指严重哮喘持续多长时间

- A、6小時
- B、10小時
- C、24小時
- D、48小時
- E、12小時

答案：C

2、下列哪项不符合胃溃疡癌变的特点

- A、上腹痛的规律性消失
- B、食欲减退
- C、进行性贫血，消瘦
- D、大便潜血持续阳性
- E、返酸烧心加重

答案：E

3、消化性溃疡病人在何种条件下疼痛节律会变化或消失

- A、疲劳時
- B、饮酒時
- C、受涼時
- D、焦急時
- E、癌变時

答案：E

4、患者大咯血，首选予以的止血药为

1、哮喘持续状态是指严重哮喘持续多长时间

- A、6小時
- B、10小時
- C、24小時
- D、48小時
- E、12小時

答案：C

2、下列哪项不符合胃溃疡癌变的特点

- A、上腹痛的规律性消失
- B、食欲减退
- C、进行性贫血，消瘦
- D、大便潜血持续阳性
- E、返酸烧心加重

答案：E

3、消化性溃疡病人在何种条件下疼痛节律会变化或消失

- A、疲劳時
- B、饮酒時
- C、受涼時
- D、焦急時
- E、癌变時

答案：E

4、患者大咯血，首选予以的止血药为

- A、止血敏
- B、垂体後叶素
- C、安咯血
- D、维生素 K
- E、抗血纤溶芳酸

答案：B

5、下列与溶血性链球菌感染有关的疾病是

- A、心肌病
- B、心包炎
- C、風湿热
- D、支气管哮喘
- E、类風湿性关节炎

答案：C

6、心绞痛发作的經典部位在

- A、心尖部
- B、心前区
- C、劍突附近
- D、胸骨体中上段之後
- E、胸骨体中下段之後

答案：D

7、原发性高血压最常見的死亡原因是

- A、心律失常

- B、尿毒症
- C、心力衰竭
- D、脑血管意外
- E、高血压危象

答案：D

8、原发性高血压分期原则的根据是什么

- A、病程长短
- B、症状轻重
- C、血脂增高程度
- D、器官损害状况
- E、降压治疗效果

答案：D

9、下列最能提醒急性出血坏死性胰腺炎的化验成果是

- A、低血磷
- B、低血糖
- C、低血钙
- D、血清淀粉酶显著增高
- E、白细胞计数明显增高

答案：D

10、肝硬化大量放腹水时，易于诱发

- A、晕厥
- B、肝昏迷

C、上消化道出血

D、休克

E、呼吸衰竭

答案：B

11、肝硬化最危重的并发症是

A、肝性脑病

B、原发性肝癌

C、肝肾综合症

D、自发性腹膜炎

E、上消化道大出血

答案：A

12、十二指肠溃疡疼痛的特点是

A、餐後即痛，持续2小時後缓和

B、餐後1小時開始，持续2小時後缓和

C、餐後2小時開始，持续2小時後缓和

D、餐後3-4小時開始，進餐後缓和

E、無規律性

答案：D

13、紅细胞输注前，应用哪种溶液稀释

A、葡萄糖

B、生理盐水

C、复方氯化钠溶液

D、葡萄糖生理盐水

E、右旋糖酐

答案：B

14、班氏尿糖定性成果：出現黄绿色反应，应判断為

A、+

B、++

C、+++

D、++++

E、-

答案：B

15、一氧化碳中毒的重要诊断根据是

A、血液中氧分压下降

B、血液中胆碱脂酶活性減少

C、碳氧血紅蛋白化验阳性

D、血液中還原血紅蛋白超過50g/L

E、血液中血紅蛋白量不不小于70g/L

答案：C

16、脑血栓形成患者发病時間常在

A、感覺風寒時

B、劇烈运动時

C、情緒激動時

D、睡眠或安靜時

E、血压劇烈上升時

答案：D

17、原发性肝癌普查常先用

A、CT

B、AFP

C、MRI

D、AKP

E、B超

答案：B

18、使用胰岛素治疗过程中应告之病人警惕

A、低血糖发生

B、过敏反应

C、酮症反应

D、肾功能损害

E、胃肠道反应

答案：A

19、用于手术人员浸泡手和臂的0.1%新洁尔灭应何时更换

A、使用40人次后来

B、每周更换一次

C、液体混浊后更换

D、每月更换一次

E、使用50人次后来

答案：A

20、截瘫病人足部用支架的目的是

A、防止畸形

B、防止肌萎缩

C、防止关节僵直

D、病人舒适

E、防止下肢水肿

答案：A

21、下列哪项對高钾血症病人禁用

- A、等渗盐水
- B、10%葡萄糖液
- C、右旋糖酐
- D、林格液
- E、碳酸氢钠

答案：D

22、心脏复苏药最佳的給药途径是

- A、心内注射
- B、皮下注射
- C、静脉注射
- D、气管内給药
- E、肌肉注射

答案：C

23、开放性损伤後防止破伤風的有效措施是

- A、清创并注射青霉素
- B、清创并注射破伤風抗毒素
- C、注射破伤風类毒素
- D、清创并注射破伤風类毒素
- E、注射人体破伤風球蛋白

答案：B

24、墨菲氏征阳性見于

- A、急性阑尾炎
- B、急性胆管炎
- C、急性胆囊炎
- D、急性胰腺炎
- E、胃拾二指肠溃疡急性穿孔

答案：C

25、两人协同对心跳骤停的患者進行心肺复苏時人工呼吸与心脏接摩的比例应為

- A、2：5
- B、2：15
- C、1：5
- D、1：3
- E、1：15

答案：C

26、中年人便血及排便习惯变化应首先進行的检查是

- A、纤维结肠镜检
- B、钡灌肠
- C、直肠镜检
- D、直肠指检
- E、大便常规

答案：D

27、排便時及排便後肛門劇烈疼痛，糞便表面有少許鮮血，應考慮為

- A、一期内痔
- B、二期内痔
- C、肛裂
- D、直腸息肉
- E、血栓性外痔

答案：C

28、急性腹膜炎最重要體症是

- A、腹脹
- B、腸鳴音減弱
- C、腹膜刺激症
- D、肝濁音界縮小
- E、移動性濁音

答案：C

29、不符合腦震盪體現的是

- A、逆行性健忘
- B、顱內壓增高
- C、意識障礙不超過30分鐘
- D、神經系統檢查無異常
- E、腦脊液檢查無異常

答案：B

30、下肢靜脈曲張術後初期活動是為了防止

- A、患肢腫脹
- B、患肢僵直
- C、血管痙攣
- D、術後復發
- E、深靜脈血栓形成

答案：E

31、急性膽管炎的 Charcot 三联症是

- A、黃疸，休克，昏迷
- B、黃疸，嘔吐，休克
- C、腹痛，寒戰高熱，黃疸
- D、腹痛，寒戰高熱，嘔吐
- E、寒戰高熱，黃疸昏迷

答案：C

32、判斷顱底骨折，最有價值的臨床體現是

- A、眼瞼淤血
- B、球結膜下出血
- C、鼻孔流血
- D、腦脊液漏
- E、嚴重頭痛

答案：D

33、乳癌根治術後，為防止皮下積液及皮瓣壞死的重要措施是

- A、半臥位

- B、引流管持续负压吸引
- C、加压包扎伤口
- D、抬高同侧上肢
- E、局部砂袋压迫

答案：B

34、甲亢病人术前准备最重要的是

- A、测定基础代谢率
- B、心理护理
- C、喉镜检查
- D、抗甲状腺药物和碘剂的应用
- E、钡餐和心电图检查

答案：D

35、观测休克病人每小时尿量，如下哪项表达组织灌流合适的最低程度

- A、20ml
- B、30ml
- C、40ml
- D、10ml
- E、50ml

答案：B

36、以迅速扩充血容量为目的时，下列液体中应选用

- A、低分子右旋糖酐
- B、中分子右旋糖酐
- C、5%葡萄糖等渗盐水
- D、10%葡萄糖液
- E、5%碳酸氢钠

答案：B

37、能防止局麻药中毒的术前用药是

- A、氯丙嗪
- B、异丙嗪
- C、阿托品
- D、哌替啶
- E、苯巴比妥钠

答案：E

38、广泛子宫切除和盆腔淋巴结清除术后留置尿管

- A、1-2天
- B、3-4天
- C、5-6天
- D、7-8天
- E、10-14天

答案：E

39、异位妊娠常发生的部位是

- A、卵巢
- B、宫颈
- C、腹腔

D、输卵管

E、子宫直肠陷凹

答案：D

40、羊水过多是指妊娠期羊水量超过

A、1000ml

B、ml

C、3000ml

D、4000ml

E、5000ml

答案：B

41、下列哪项不是新生儿 Apgar 评分原则

A、体温

B、心率

C、呼吸

D、肌强力

E、

皮肤颜色

答案：A

42、葡萄胎术后规定随访的时间是

- A、1年
- B、2年
- C、3年
- D、4年
- E、5年

答案：B

43、引起婴幼儿缺铁性贫血的原因是

- A、体内贮铁局限性
- B、铁的摄入局限性
- C、生长发育快需铁量增长
- D、某些疾病的影响
- E、铁丢失过多

答案：B

44、肺炎患儿出现严重腹胀，肠鸣音消失是由于

- A、消化功能紊乱
- B、低钠血症
- C、中毒性肠麻痹
- D、低钾血症
- E、中毒性脑病

答案：C

45、新生儿败血症最常见的病原菌是

- A、厌氧菌
- B、葡萄球菌
- C、大肠埃希菌
- D、溶血性链球菌
- E、肺炎球菌

答案：B

46、有关生理性黄疸描述错误的是

- A、生后2-3天开始出现黄疸
- B、体现为食欲下降，哭声低弱
- C、一般7-14天自然消退
- D、早产儿可延迟三周消退
- E、血清胆红素浓度

初级护师基础知识练习题（一）

一、如下每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一种最佳答案，并在答题卡上将对应

題号的對应字母所属的方框涂黑。

1. 新生儿可從母体获得，但3~5個月後逐渐消失的抗体是

A. 免疫细胞

B. 补体

C. IgG

D. IgM

E. IgA

本題對的答案： C

2. 為增長血浆渗透压，应选用

A. 5%葡萄糖液

B. 0.9%氯化钠溶液

C. 低分子右糖酐

D. 10%葡萄糖溶液

E. 5%碳酸氢钠

本題對的答案： C

3. 引起小儿秋季腹泻常見的病原体是

A. 空肠弯曲菌

B. 大肠杆菌

C. 链球菌

D. 轮状病毒

E. 流感嗜血杆菌

本題對的答案： D

4. 乳癌病变发展過程中最易感染的是

A. 肺

B. 肝

C. 腋窩淋巴結

D. 鎖骨下淋巴結

E. 胸骨旁淋巴結

本題對的答案：C

5. 嬰兒每晝夜排尿量為

A. 200~300ml

B. 400~500ml

C. 600~700ml

D. 800~900ml

E. 1000~1100ml

本題對的答案：B

6. 氣胸病人患側肺部叩診音為

A. 清音

B. 濁音

C. 鼓音

D. 實音

E. 過清音

本題對的答案：C

7. 新生兒生理性黃疸出現於生後

A. 1天

B. 2~3天

C. 4~6天

D. 7~8天

E. 9~10天

本題對的答案：B

8. 皮肤异常干燥見于

A. 虚脱

B. 休克

C. 甲亢

D. 風湿热

E. 脱水

本題對的答案：E

9. 男性，58岁，拟行左結腸癌根治术，术前需几日開始服用肠道消炎药

A. 1日

B. 2日

C. 3日

D. 4日

E. 5日

本題對的答案：C

10. 高血压发病机理中占主导地位的是

A. 血容量過多

B. 内分泌原因

C. 肾功能异常

D. 高级神經中枢功能失调

E. 血管内皮功能异常

本題對的答案：D

11. 应首先急救的伤员是

A. 脑挫伤

B. 肠胃炎

C. 小腿挫裂伤

D. 张力性气胸

E. 上肢开放性骨折

本題對的答案：D

12. 正常人每日無形失水量為

A. 200ml

B. 850ml

C. 400ml

D. 1000ml

E. 1200ml

本題對的答案：B

13. 舟状腹常見于

A. 肝硬化

B. 低血糖

C. 惡液质

D. 腹膜炎

E. 胃扩张

本題對的答案：C

14. 某病人食用帶皮的水果半小時後出現惡心、嘔吐、腹痛等中毒症狀。下列何種農藥引起中毒的也許性最小

- A. 敵敵畏
- B. 內吸磷
- C. 對硫磷
- D. 樂果
- E. 甲拌磷

本題對的答案：D

15. 腰麻後頭痛的重要原因是

- A. 術中血壓下降
- B. 腦脊液外漏
- C. 顱內壓增高
- D. 迷走神經亢進
- E. 精神原因

本題對的答案：B

16. 顱腦手術後健側臥位，是為了

- A. 防止嘔吐
- B. 防止腦疝
- C. 防止傷口感染
- D. 緩和疼痛
- E. 便于觀測

本題對的答案：B

17. 护士巡视发现某咯血病人出現表情恐怖，张口瞪目，两手乱抓等窒息現象，首先应当

- A. 准备急救用品
- B. 行人工呼吸
- C. 使用呼吸中枢兴奋剂
- D. 使用镇咳药
- E. 立即置病人頭低足高位

本題對的答案：E

18. 治疗休克最基本的措施是

- A. 应用血管活性药物
- B. 扩充血容量
- C. 应用抗生素
- D. 应用强心药
- E. 纠正酸中毒

本題對的答案：B

19. 反常呼吸运动見于

- A. 開放性气胸
- B. 闭合性气胸
- C. 张力性气胸
- D. 相邻多根多处肋骨骨折
- E. 损伤性血胸

本題對的答案：D

20. 等渗性脱水病人输液，首先输入的溶液是

- A. 5%葡萄糖液
- B. 5%葡萄糖氯化钠
- C. 平衡盐溶液
- D. 低分子右旋糖苷
- E. 5%碳酸氢钠

本題對的答案：C

21. 先天性心脏病仅出現下半身发绀、杵状指時，首先考虑是

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 動脉导管未闭
- D. 艾森曼格综合征
- E. 肺動脉狭窄

本題對的答案：C

22. 最能反应贫血的试验室检查指標是

- A. 紅细胞计数
- B. 紅细胞沉降率
- C. 网织紅细胞计数
- D. 血清蛋白總量
- E. 血紅蛋白定量

本題對的答案：E

23. 羊水测定卵磷脂/鞘磷脂（1dS）比值，下列哪项数值提醒胎儿肺成熟

A. \leq

2

B. ≤ 1

C. ≥ 0.5

D. ≥ 1

E. ≥ 2

本題對的答案：E

24. 有关放疗区域皮肤的护理，不對的的是

A. 保持清洁干燥

B. 每日用肥皂水清洗

C. 防止摩擦

D. 防止日光照射

E. 不可热敷

本題對的答案：B

25. 肾盂肾炎的重要感染途径是

A. 血行感染

B. 淋巴道感染

C. 上行感染

D. 直接感染

E. 以上均不是

本題對的答案：C

26. 5岁男孩，頭面颈烧伤，其面积為

A. 9%

B. 16%

C. 12%

D. 13.5%

E. 15%

本題對的答案：B

27. 小兒生後前六個月體重平均每月增長

A. 0.2~0.3kg

B. 0.4~0.5kg

C. 0.6~0.8kg

D. 0.9~1.0kg

E. 1.0~2.0kg

本題對的答案：C

28. 男性，42歲，因“急性化膿性梗阻性膽管炎”急診入院，寒戰，體溫驟升至41℃，脈搏112次/分，血壓85/65mmHg，其休克類型為 [醫學教育網 搜集 整頓]

A. 感染性休克

B. 低血容量性休克

C. 心源性休克

D. 神經性休克

E. 過敏性休克

本題對的答案：A

29. 男性，30歲，雙下肢及胸腹部燒傷6小時，血壓70/50mmHg，中心靜脈壓3cmH₂O，尿量15ml/L，表明該病人存在

A. 血容量嚴重局限性

B. 心功能不全

C. 血容量過多

D. 毛細血管過度收縮

E. 腎功能不全

本題對的答案：A

30. 診斷子宮內膜異位症的最佳措施是

A. 診斷刮宮

B. B超

C. 腹腔鏡檢查

D. 婦科檢查

E. 子宮輸卵管碘油造影

本題對的答案：C

31. 良性卵巢腫瘤最常見的併發症

A. 蒂扭轉

B. 內出血

C. 破裂

D. 感染

E. 惡變

本題對的答案：A

32. 佝僂病發病的重要原因是

A. 缺乏維生素A

B. 甲狀腺素缺乏

C. 食物中缺钙

D. 缺乏维生素D

E. 食物中钙磷比例不妥

本題對的答案：D

33. 女性，28岁，2個月前因葡萄胎行刮宫术2次，术后2周尿绒毛膜促性腺激素（HCG）弱阳性，术后5周月經复潮，目前一般状况好，葡萄胎排出後，尿HCG转阴时间最迟不超過

A. 4周

B. 6周

C. 8周

D. 10周

E. 12周

本題對的答案：C

34. 防止肠粘连的重要护理措施是

A. 保持腹腔引流畅通

B. 遵醫囑使用抗生素

C. 及時拔除腹腔引流管

D. 鼓励病人初期活動

E. 保持有效的胃肠減压

本題對的答案：D

35. 浅表肉芽感染伤口，有较多壞死组织，湿敷溶液选用

A. 0.02%呋喃西林

B. 攸琐溶液

C. 0.1%洗必泰

D. 0.1%新洁尔灭

E. 0.02%高锰酸钾

本題對的答案：B

36. 防止滴虫性阴道炎，哪项不妥

A. 消灭传染源

B. 及時发现和治疗带虫者

C. 切断传染途径

D. 注意消毒隔离

E. 做好保护性隔离

本題對的答案：E

37. 痰液粘稠不易咳出者的增進排痰措施為

A. 指导有效咳嗽

B. 拍背与胸壁震荡

C. 湿化呼吸道

D. 体位引流

E. 机械吸痰

本題對的答案：C

38. 腹膜炎最重要的体征是

A. 腹式呼吸減弱

B. 腹膜刺激征

C. 移動性浊音阳性

D. 肠鸣音消失

E. 腹部可見腸型

本題對的答案：B

39. 支气管呼吸音只見于

A. 肺炎

B. 肺气肿

C. 胸腔积液

D. 肺結核

E. 支气管哮喘

本題對的答案：A

40. 新生儿颅内出血經典症状是

A. 呼吸困难不能吸吮

B. 先体现兴奋後出現克制

C. 全身硬肿

D. 体温不升

E. 拒乳

本題對的答案：B

41. 婴幼儿生理性哭闹最常見原因是

A. 断乳

B. 尿布潮湿

C. 要挾家長

D. 口渴和饥饿

E. 昆虫叮咬

本題對的答案：D

42. 生命体征不包括

A. 体温

B. 脉搏

C. 呼吸

D. 神志

E. 血压

本題對的答案：D

43. 胎盘由下列哪些组织构成

A. 平滑绒毛膜、包蜕膜、羊膜

B. 平滑绒毛膜、底蜕膜、真蜕膜

C. 叶状绒毛膜、包蜕膜、真蜕膜

D. 叶状绒毛膜、底蜕膜、羊膜

E. 叶状绒毛膜、底蜕膜、真蜕膜

本題對的答案：D

44. 门静脉高压症病人吃干硬。粗糙的食物，易引起

A. 脾肿大

B. 脾功能亢进

C. 呕血、黑便

D. 顽固性腹水

E. 肝性脑病

本題對的答案：C

45. 细胞外液中最重要阳离子是

A. Ca^{2+}

B. K^{+}

C. Na^{+}

D. Mg^{2+}

E. Fe^{2+}

本題對的答案：C

46. 成人基础代谢率+45%，阐明

A. 轻度甲亢

B. 中度甲亢

C. 正常范围

D. 重度甲亢/P>

E. 甲状腺危象

本題對的答案：B

47. 有关肛门坐浴护理，错误的是

A. 准备清洁坐浴盆

B. 用1：5000高锰酸钾溶液

C. 坐浴15~20分钟

D. 水温保持60度

E. 年老体弱者防止倒跌

本題對的答案：D

48. 口服铁剂的最佳时间是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/165122133010012003>