

2024年四川省南充精神卫生中心招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、哪项不是奥美拉唑的不良反应？（ ）

- A. 头晕、失眠
- B. 口干、恶心
- C. 胃黏膜出血
- D. 外周神经炎
- E. 男性乳房女性化

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2、佝偻病颅骨软化多发生于（ ）。

- A. 6~9个月
- B. 3~6个月
- C. 1~3个月
- D. 6~12个月
- E. 12个月以上

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

3、易患强直性脊柱炎的患者通常具有（ ）。

- A. HLA-DR2
- B. HLA-DR3
- C. HLA-DR4
- D. HLA-DR5
- E. HLA-B27

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

4、溶栓治疗最严重的并发症是（ ）。

- A. 胃肠道出血
- B. 颅内出血
- C. 腹膜后出血
- D. 变态反应
- E. 皮肤出血点、瘀斑

【正确答案】

B

『答案解析』

溶栓治疗的并发症最主要的是出血，可出现：①轻度出血：皮肤、黏膜有出血点；②重度出血：大量咯血或消化道大出血、腹膜后出血；③危及生命部位的出血：颅内、蛛网膜下腔、纵隔内或心包出血。其中最严重出血的是颅内出血。

5、室间隔缺损的血流动力学改变，首先引起（ ）。

- A. 左心室增大
- B. 右心室增大
- C. 左心房扩大
- D. 主动脉扩张
- E. 肺动脉扩张

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

6、低钾血症患者补钾速度一般不宜超过（ ）。

- A. 12mmol/h
- B. 20mmol/h
- C. 30mmol/h
- D. 40mmol/h
- E. 50mmol/h

『正确答案』

B

『答案解析』

外科病人一般不能经口补钾，静脉补钾有浓度和速度的限制，每升输液中含钾量不宜超过40mmol（相当于氯化钾3克），输入钾量应控制在20mmol/h以下。当病人存在休克时，应等待尿量超过40mL/h后，再静脉补钾。

7、引起尖锐湿疣的病原体是（ ）。

- A. EBV
- B. HPV
- C. HBV
- D. VZV
- E. CMV

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

8、一位女医生对病人说话声调柔和，目光亲切，讲话时常面带微笑，说明她在下列哪一方面做得好（ ）。

- A. 语言沟通和非语言沟通技巧
- B. 语言沟通技巧
- C. 非语言沟通技巧
- D. 目光沟通
- E. 以上都不是

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

9、急性乳房炎形成脓肿后的切开引流，下列哪项是错误的？（ ）

- A. 切口应按放射方向

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/165133232340011112>