2024甘肃省岷县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题完整版【考点梳理】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.在应用碘解磷定时的注意事项中哪一项是错误的

A：对有机磷农药急、慢性中毒均有效

B：用量过大、注射过快或未经稀释直接注射均可引起中毒

C：在碱性溶液中易水解为氰化物，故忌与碱性药物配伍

D：对毒蕈碱样作用和防止呼吸中枢抑制的作用较差

答案：A

2.“-巴坦”的药名词干缩写是

A：#NAME?

B：eef-

C：#NAME?

D：#NAME?

答案：D

3.患毒,27岁,妊娠20周,出现发热体温最高达38.5℃,体格检查:肾区叩痛,经相关实验室检查诊断为急性肾盂肾炎,宜选用的药物是()

A：头孢噻肟钠

B：阿奇霉素

C：甲硝唑

D：阿米卡星

答案：A

4.为避免重复用药，书写处方时，药品名称应采用

A: 化学名

B: 通用名

C: 专利名

D: 商品名

答案：B

5.下列与用药有关的内容中，属于患者用药咨询的主要内容是

A: 自我保健

B: 药品适应证

C: 治疗药物监测

D: 新药信息

答案：B

6.严重烧伤患者尿常规检查可发现

A: 尿葡萄糖阳性

B: 尿血红蛋白阳性

C: 尿淀粉酶增高

D: 尿胆红素阳性

答案：B

7.患者，男，65岁，2型糖尿病病史20年，现服用二甲双胍0.5g，一日3次，阿卡波糖0.1g.一日3次。罗格列酮4mg，一日一次。既往高血压病史5年，冠心病病史5年，心功能Ⅰ级，轻度肾功能不全，长期服用贝那普利、阿司匹林。

A: 贝那普利

B: 二甲双胍

C: 阿司匹林

D: 阿卡波糖

答案：B

8.进行药学信息的收集、保管、整理、评价、传递、提供和利用，是

A: 参与健康教育

B: 处方点评

C: 药物信息服务

D: 处方审核

答案：C

9.发挥局部作用的栓剂是

A: 阿司匹林栓

B: 甘油栓

C: 盐酸克伦特罗栓

D: 吲哚美辛栓

答案：B

10.患者,男,65岁,因腹胀,呕吐就诊,医生处方,甲氧氯普胺片20mgtidpo该处方属于()

A: 用法、用量不适宜

B: 有配伍禁忌

C: 无适应证用药

D: 有禁忌证用药

答案：A

11.每四小时用药一次的外文规范缩写是

A: q4h

B: tid

C: qn

D: qod

答案：A

12.适用于伴有前列腺体积增大的良性前列腺增生症的是（）

A: 奥昔布宁

B: 特拉唑嗪

C: 非那雄胺

D: 米多君

答案：C

13.服用维生素B1、维生素B2、烟酸等应该禁用的饮食是

A: 酒

B: 脂肪

C: 食盐

D: 食醋

答案：A

14.不宜与食醋合用的药物是

A: 硫酸亚铁

B: 左旋多巴

C: 磺胺类药物

D: 辛伐他汀

答案：C

15.铅严重中毒患者出现的最难救治的临床症状是（）

A: 铅毒性脑病

B: 中毒性肾炎

C: 中毒性肝炎

D: 贫血

答案：A

16.患者,男,80岁,因发热、咳嗽、咳痰2天就诊诊断为社区获得性肺炎,给予左氧氟沙星、甘草合剂、氨溴索、对乙酰氨基酚、维生素C等治疗。患者用药3天后出现失眠、烦躁不安等症状最可能引起该症状的药物是()

A: 氨溴索

B: 对乙酰氨基酚

C: 左氧氟沙星

D: 甘草合剂

答案：C

17.用药后30分钟内不宜进食或者饮水的剂型是

A: 泡腾片

B: 舌下片

C: 咀嚼片

D: 阴道栓

答案：B

18.适宜进餐时给药，可以减少脂肪吸收率的药物是

A: 奥利司他

B: 甲氧氯普胺

C: 氢氧化铝

D: 多潘立酮

答案：A

19.怕热的药品

A: 用棕色或黑色纸包裹的玻璃器包装

B: 可用玻璃瓶软木塞塞紧、蜡封、外加螺旋盖盖紧

C: 可贮存于严密的药箱内

D: 根据不同性质要求，分别存放在阴凉处、凉暗处或冷处

答案：D

20.胶体果胶铋药物不良反应

A: 男性乳房女性化

B: 性功能障碍

C: 睡眠障碍

D: 黑便

答案：D

21.急性肾盂肾炎常见

A: 白细胞管型

B: 细胞管型

C: 蜡样管型

D: 颗粒管型、透明管型

答案：A

22.为使铁剂更好的被人体吸收，宜同时应用

A: 叶酸+维生素B12

B: 维生素C

C: 硫酸亚铁

D: 亚叶酸钙

答案：B

23.患者，男，80岁，患有高血压、2型糖尿病、前列腺增生，近日出现暂时性尿失禁症状，怀疑与其服用的药物有关。复核其使用的药物，可能造成其尿失禁的药物是()

A: 非那雄胺

B: 珍菊降压片(含氢氯噻嗪)

C: 依那普利

D: 二甲双胍

答案：B

24.（2016年真题）患者，女，35岁，临床诊断为高甘油三酯血症，临床上给予非诺贝特进行治疗，该药正确的用量为（）。

A: 0.5g，qd

B: 0.5g，tid

C: 0.1g，tid

D: 0.2g，qd

答案：C

25.人体贮存能量的形式为

A: 糖化血红蛋白

B: 高密度脂蛋白胆固醇

C: 胆固醇

D: 三酰甘油

答案：D

26.处方中"餐后给药"的外文缩写是

A: pc

B: po

C: qn

D: ac

答案：A

27.患者，女，40岁，既往有风湿性心脏病病史，近2年来出现劳累性呼吸困难，1天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

A: 心动过缓

B: 快速性房性心律失常伴传导阻滞

C: 直立性低血压

D: 高钾血症

答案：B

28.ADR报表内容填写不齐全、等待补充，或因果关系难以定论，缺乏文献资料佐证；可评价为

A: 很可能

B: 可能无关

C: 待评价

D: 可能

答案：C

29.(血常规检查异常的病症)骨髓增生病

A: 白细胞增多

B: 红细胞沉降率减慢

C: 淋巴细胞增多

D: 血小板增多

答案：D

30.用药咨询是药师应用所掌握的药学知识和药品信息，承接公众对药物治疗和合理用药的咨询服务，对临床合理用药有关键性作用。根据药物咨询对象的不同，可以将其分为患者、医师、护士和公众的用药咨询。

A：首次剂量、维持剂量以及用药间隔

B：服药后预计起效时间及维持时间

C：注射剂配制溶媒、浓度

D：合理用药信息

答案：D

31.（2018年真题）某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮3mg和炔雌醇0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

A：不再继续服用此周期药物,经过一个7天的停药期,再开始继续服用下一周期的药物

B：尽快补服一片,然后在常规时间继续服药

C：到21日20:00再同时服用两片药,然后在常规时间继续服药

D：尽快同时服用两片药，然后在常规时间继续服药,在以后的7天内要加用屏障避孕法

答案：B

32.抗真菌药

A：血小板减少

B：中性粒细胞减少

C：血红蛋白量增多

D：嗜酸性粒细胞减少

答案：B

33.随着社会的发展，生活的节奏越来越快，科技给我们带来便利的同时，也给我们的生活和工作增添了不少压力，焦虑、抑郁、失眠等病症的发生率随之上升。

A：度洛西汀

B：曲唑酮

C：帕罗西汀

D：劳拉西泮

答案：B

34.高效选择性5-HT4受体激动剂，心律失常的副作用罕见的是

A：甲氧氯普胺

B：西沙必利

C：多潘立酮

D：莫沙必利

答案：D

35.属于5-羟色胺及去甲肾上腺素再摄取抑制剂的药品是

A：雷尼替丁

B：吗氯贝胺

C：奥美拉唑

D：度洛西汀

答案：D

36.患者，女，42岁。临床诊断“小三阳”，其临床意义是

A：HBsAg阳性

B：HBeAg阳性

C：HBsAg、HBeAb和HBcAb同为阳性

D：HBsAg、HBeAg和HBcAb同为阳性

答案：C

37.（2019年真题）正常剂量氯化钾的妊娠毒性分级是

A：B级

B：X级

C：C级

D：A级

答案：D

38.对严重药品滥用和用药失误的处方，处置的方式是

A：经改正并签字确认后，方可调配

B：准予调配

C：应拒绝调配，并按有关规定报告

D：拒绝调配

答案：C

39.对于铁剂的使用，正确的为

A：口服铁剂宜选用3价铁

B：碳酸氢钠抑制铁剂吸收

C：待血红蛋白恢复正常后，即可停止服用

D：为迅速纠正患者贫血症状，初始治疗用大剂量

答案：B

40.写明稀释比例和使用时间，是指

A：实现个体化治疗

B：医嘱清楚准确

C：修订医嘱及时沟通

D：医嘱完整不漏项

答案：D

41.酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之对中枢神经出现抑制，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加发生不良反应的几率。

A: 过敏反应

B: 血压升高

C: 低血糖反应

D: 血糖不降

答案：C

42.对缺铁性贫血者应选用

A: 维生素K

B: 叶酸+维生素B

C: 富马酸亚铁

D: 甲磺酸去铁胺

答案：C

43.用药期间粪便呈橘红至红色的药物是

A: 水杨酸钠

B: 氢氧化铝制剂

C: 硫酸钡

D: 利福平

答案：D

44.脂肪乳用于脂质肾病患者，属于

A: 超适应症给药

B：有禁忌症用药

C：盲目联合用药

D：撒网式给药

答案：B

45.（2015年真题）用药后有可能出现球后视神经炎的抗结核药是（）。

A：利福平

B：吡嗪酰胺

C：链霉素

D：乙胺丁醇

答案：D

46.可加重帕金森的是

A：地西泮

B：异丙嗪

C：H

D：氯苯那敏

答案：B

47.误服药物、服药过量以及滥用药物均可引起药物中毒。常见的致中毒药物包括西药、中药和农药。随着化学制药工业的不断发展，如果管理和解救措施跟不上，药物中毒的危害即将越来越严重。

A：2～4h

B：1～2h

C：1.0h

D：0.5h

答案：D

48.选择性5-羟色胺再摄取抑制剂

A: 氟伏沙明

B: 氯米帕明

C: 米氮平

D: 吗氯贝胺

答案：A

49.Hb量>90g/L与低于正常参考的下限可诊断为

A: 中度贫血

B: 重度贫血

C: 基本正常

D: 轻度贫血

答案：D

50.关于嗜酸性粒细胞叙述正确的是

A: 嗜酸性粒细胞无吞噬功能

B: 支气管哮喘患者的嗜酸性粒细胞减少

C: 嗜酸性粒细胞可释放组胺酶

D: 嗜酸性粒细胞不能吞噬抗原-抗体复合物

答案：C

51.胃食管反流的患者应避免使用的药物是：

A: 美托洛尔

B: 阿仑膦酸钠

C: 阿司匹林

D: 他拉唑嗪

答案：B

52.对于效果不易察觉或起效慢的药物，应特别提示、告知坚持服药

A：针对患者生理及心理特点选药

B：使患者了解药物的重要性

C：使用分时药盒和用药记录

D：简化治疗方案

答案：B

53.中枢性降压药是

A：拉贝洛尔

B：肼苯哒嗪

C：利血平

D：可乐定

答案：D

54.患者，男，53岁，因纳差、食欲减退来药店购药，药师应推荐的药品是

A：干酵母片

B：多潘立酮片

C：乳酶生片

D：甲氧氯普胺片

答案：A

55.po.表示

A：双眼

B：每日

C：口服

D：饭后

答案：C

56.针对儿童，最方便、最安全、最经济的给药途径

A: 口服给药

B: 局部给药

C: 静脉给药

D: 皮下注射

答案：A

57.Ⅱ期临床试验需要多中心试验，即进行试验的医院的数目必须是

A: 在2个及2个以上

B: 在3个及3个以上

C: 在1个及1个以上

D: 在4个及4个以上

答案：B

58.恢复期

A: 1～6个月

B: 1～3个月

C: 1个月内

D: 2周

答案：A

59.患者，男，65岁，慢性咳嗽、喘息10余年，活动后症状明显，近7天症状加重入院，伴便秘，每周2次排便。既往有高血压病史12年；长期口服硝苯地平控释片30mgqd，血压控制良好。体格检查：体温36．6℃，P82次／分，R22次／分，端坐位，喘息，桶状胸，双肺叩诊呈过清音，可闻及散在干鸣音，双下肺少许湿啰音，杵状指。辅助检查：血常规WBC11．2×109／L，肺功能FEV1／FVC60％，FEV155％。治疗方案如下：氨溴索注射液30mgtidivgtt，莫西沙星氯化钠注射液0.4gbidivgtt，异丙托溴铵溶液0.5mgbid雾化吸入，布地奈德混悬液1mgbid雾化吸入

A: 氨溴索注射液

B: 异丙托溴铵注射液

C: 硝苯地平控释片

D: 布地奈德混悬液

答案：B

60.雷尼替丁

A: 可使驾驶员出现眩晕和幻觉

B: 可使驾驶员出现定向力障碍

C: 可导致驾驶员多尿或多汗

D: 可使驾驶员视物模糊或辨色困难

答案：B

61.起效快，可迅速缓解急性哮喘发作和支气管平滑肌痉挛的药品是

A: 沙丁胺醇

B: 扎鲁司特

C: 布地奈德

D: 羧甲司坦

答案：A

62.儿童便秘并发生粪便嵌塞可选用的泻药是

A：硫酸镁

B：聚乙二醇4000

C：双歧杆菌

D: 比沙可啶

答案：B

63.用药后有可能出现球后视神经炎的抗结核药是

A: 链霉素

B: 利福平

C: 乙胺丁醇

D: 吡嗪酰胺

答案：C

64.食入何种物质对抗高血压药有影响

A: 脂肪

B: 食醋

C: 食盐

D: 蛋白质

答案：C

65.适用于年轻、震颤明显患者的是

A: 左旋多巴

B: 恩托卡朋

C: 司来吉兰

D: 苯海索

答案：D

66.依据规定，医师必须单独开具处方的药物是

A: 化学药品

B: 中药饮片

C: 生物制剂

D: 中成药

答案：B

67.（2019年真题）配制下列化疗药时，只能选择葡萄糖注射液做溶媒的是

A: 博来霉素

B: 环磷酰胺

C: 依托泊苷

D: 奥沙利铂

答案：D

68.可分泌到乳汁中引起新生儿黄疸的药物是()

A: 诺氟沙星

B: 头孢克洛

C: 阿莫西林

D: 复方磺胺甲噁唑

答案：D

69.以下有关肌酸激酶检查值升高的临床意义中，最正确的是

A: 诊断急慢性白血病

B: 诊断心肌梗死

C: 诊断痛风

D: 诊断恶性贫血

答案：B

70.处方中外文缩写p

A: 微克

B: 临睡时

C：代表（）

D：必要时

答案：B

71.胃食管反流病患者应避免服用的药物是

A：阿仑膦酸钠

B：阿司匹林

C：关托洛尔

D：特拉唑嗪

答案：A

72.（2019年真题）能减轻眼部平滑肌及血管痉挛，改善局部微循环，缓解视疲劳的药物是

A：硫酸锌滴眼液

B：山莨菪碱滴眼液

C：聚乙烯醇滴眼液

D：可的松滴眼液

答案：B

73.患者，女，65岁，因稳定型心绞痛服用阿替洛尔治疗，药师应告知患者每天应自测心率，静息心率控制在

A：55～60次/分

B：35～40次/分

C：65～70次/分

D：40～45次/分

答案：A

74.分为儿童卷、化学药品与生物制品卷的是

A：《国家基本药物处方集（2012年版）》

B：《英国国家处方集》

C：《医师案头参考》

D：《中国国家处方集（2010年版）》

答案：D

75.（2016年真题）患者，女，55岁，诊断为类风湿性关节炎，既往有十二指肠溃疡病史。医生给予甲氨蝶呤+柳氮磺吡啶治疗。甲氨蝶呤用法用量正确的是（）。

A：7.5mgtid

B：7.5mgqod

C：75mgqd

D：7.5mgqw

答案：D

76.血液净化疗法可使重症毒物中毒者的预后大为改观，血液净化的方法不包括

A：血液滤过

B：腹膜透析

C：血液置换

D：血液透析

答案：C

77.肝病患者慎用的药品不包括

A：多粘菌素

B：氯丙嗪

C：甲氨蝶呤

D：对乙酰氨基酚

答案：A

78.患者，女，64岁，既往高血压病病史15年，活动后心悸、气短3年，2小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190／110mmHg，R307欠／分，Bp108次／分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿哕音。

A: 多索茶碱

B: 硝苯地平

C: 西地兰

D: 硝普钠

答案：C

79.在治疗口腔溃疡的药品中，可能致使儿童和青年偶发口腔无痛性浅表脱屑损害的是

A: 西地碘含片

B: 左旋咪唑

C: 氯己定含漱剂

D: 甲硝唑粘贴片

答案：C

80.某患者，女，45岁，身高160cm，体重75kg，临床诊断为2型糖尿病。实验室检查：空腹血糖8.7mmol/L，餐后2小时血糖13.1mmol/L，糖化血红蛋白7.1%。经饮食控制、规律锻炼，血糖控制仍未达到理想水平。

A: 胰岛素+二甲双胍

B: 格列齐特

C: 胰岛素

D: 二甲双胍

答案：D

81.药品不良反应按照程度分为轻度、中度、重度三级。

A: 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无需治疗

B: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

C: 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害

D: 没有临床症状，无需治疗

答案：A

82.以下不属于胃黏膜保护剂的是（）

A: 胶体果胶铋

B: 米索前列醇

C: 硫糖铝

D: 克拉霉素

答案：D

83.患者，女，66岁，身高156cm，体重61kg。空腹血糖7.8mmol／L，餐后血糖11.2mmol／L，糖化血红蛋白8.7%。

A: 口服磺酰脲类降糖药

B: 口服Gt一葡萄糖苷酶抑制剂

C: 口服二甲双胍

D: 饮食干预及运动治疗

答案：C

84.氨茶碱注射剂和片剂所表现的是()。

A: 同一药物，剂型不同，其副作用、毒性不同

B: 同一药物，制成同一剂型，由于制备工艺不同而表现不同

C: 同一药物，剂型不同，其起效的快慢、作用强度和持续时间不同

D: 同一药物，制成同一剂型，由于处方组成不同而表现不同

答案：C

85.（2018年真题）甲状腺功能亢进合并哮喘的患者慎用的药物是（）

A: 奥马珠单抗（抗lgE抗体）

B: 沙美特罗

C: 异丙托溴铵

D: 茶碱

答案：D

86.（2015年真题）患者因扁桃体炎给予头孢拉定治疗，服用4个小时后，面部出现皮疹，无其他不适。停药后皮疹消失，排除其他疾病可能。该病例用药与不良反应因果关系评价结果是（）。

A: 肯定

B: 可能

C: 很可能

D: 可能无关

答案：C

87.医师书写处方时经常使用外文缩写，医师在指导用药时需要准确掌握和解释。OS.是()

A: 右眼

B: 立即

C: 适量

D: 左眼

答案：D

88.肾功能不全患者宜选用的药物是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/165142211114012033