

2023 年执业药师之西药学综合知识与技能 通关考试题库带答案解析

单选题（共 50 题）

1、致癌、致畸作用常发生于用药数月或数年后，因此必须

- A.注意特殊人群用药
- B.了解患者及家族的过敏史
- C.注意定期监测器官功能
- D.注意 ADR 症状，尤其是迟发反应
- E.用药品种合理，避免不必要的重复或联合用药

【答案】 D

2、患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：氨氯地

平片 10mgpoqd 美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd 贝那普利片

20mgpoqd 阿司匹林肠溶片 100mgpoqd 辛伐他汀片 40mgpoqd

- A.氨氯地平片可于早上服用
- B.阿司匹林肠溶片必须于晚上在餐后服用
- C.若需减量，美托洛尔缓释片可掰开服用
- D.阿司匹林肠溶片应整片服用，不能嚼碎
- E.长期使用美托洛尔缓释片不能自行突然停药，须在医师、药师的指导下逐渐减少剂量

【答案】 C

3、患者，男，54岁，以“咳嗽、不适、呼吸困难和喘息、咳痰逾日”就诊，患者无基础疾病，近1周内未服用药物，诊断为支气管炎。

对该患者的经验治疗应选择

A.复方甲氧那明胶囊

B.头孢克洛颗粒剂

C.美托洛尔片

D.阿奇霉素分散片

E.布洛芬混悬剂

【答案】 A

4、二甲双胍片的适宜服药时间是

A.清晨

B.餐前

C.餐中

D.餐后

E.睡前

【答案】 C

5、（2016年真题）患者，女，55岁，因“反复发作胸骨后疼痛2年，伴反酸，胃灼热，间断积食”而就诊。食管测压提示食管下括约肌

（LES）压力 $<6\text{mmHg}$ 结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病，医师处方：奥美拉唑肠溶片 20mg bid 强化抑酸治疗。

A.适宜餐前30分钟服用

- B.应整片吞服
- C.用药后可能出现口干，便秘等不良反应
- D.长期用药后可能会出现维生素 K 缺乏
- E.长期用药后可能会出现骨质疏松

【答案】 D

6、对多数药品而言，贮藏环境与药品保管的关系是

- A.在 0℃ 以下时，温度越低，对保管越有利
- B.在 2℃ 以上时，温度越低，对保管越有利
- C.在 8℃ 以上时，温度越低，对保管越有利
- D.在 10℃ 以上时，温度越低，对保管越有利
- E.在 20℃ 以上时，温度越低，对保管越有利

【答案】 B

7、“制定疾病的防治指南、国家基本药物目录、非处方药目录、医疗保险目录等以及药品淘汰时都需要参考循证医学的研究结果”表明循证医学实践能够

- A.有助于个体化给药
- B.有利于诊断特殊疾患
- C.改变降脂治疗观念
- D.列为医药卫生行政决策的依据
- E.证明一些常规治疗方法是盲目

【答案】 D

8、兴奋交感神经，引起高血压的药物是

- A. 咖啡因
- B. 伪麻黄碱
- C. 糖皮质激素
- D. 重组人促红细胞生成素
- E. 氯化钠注射液

【答案】 A

9、应用华法林抗凝过程中，出现严重出血时，可应用急救的药物是

- A. 维生素 K1
- B. 维生素 K3
- C. 维生素 K4
- D. 维生素 B1
- E. 维生素 B12

【答案】 A

10、由于心外副作用发生率较高，且不良反应较大，不宜作为治疗心房颤动一线用药的是()

- A. 福辛普利
- B. 地高辛
- C. 美托洛尔
- D. 胺碘酮
- E. 华法林

【答案】 D

11、急性痛风性关节炎期首选药物是

- A. 苯溴马隆
- B. 秋水仙碱
- C. 碳酸氢钠
- D. 别嘌醇
- E. 糖皮质激素

【答案】 B

12、某男性患者，57岁，既往高血压病史10年，与儿子吵架后突然起病，言语不清，左侧肢体无力，意识不清。查体：BP220/120mmHg 中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激(+)，左侧肢体不活动，左侧巴彬斯基征阳性。

- A. 缺血性脑卒中
- B. 脑出血
- C. 短暂性脑缺血发作
- D. 脑血栓形成
- E. 腔隙性脑梗死

【答案】 B

13、可造成儿童呼吸抑制，故5岁以下的儿童不宜应用的是

- A. 右美沙芬
- B. 喷托维林

- C. 苯丙哌林
- D. 可待因
- E. 右美沙芬复方制剂

【答案】 B

14、(2018年真题) 患者,女,53岁,冠心病史2年,目前服用硝酸异山梨酯、阿托伐他汀钙。近三个月因胃痛心境低落、有自杀倾向就诊,临床诊断为消化性溃疡、抑郁症。给予奥美拉唑肠溶片 40mg qd po 文拉法辛缓释片 150 mg qd po, 谷维素片 10 mg tid po 治疗,患者用药后出现血压升高可能导致该患者血压升高的药物是 ()

- A. 文拉法辛缓释片
- B. 硝酸异山梨酯片
- C. 阿托伐他汀钙片
- D. 奥美拉唑肠溶片
- E. 谷维素片

【答案】 A

15、(2015年真题) 患儿,女,4岁半,身高110cm,体重15kg,一天前开始发热(39.1℃),咽稍痛,无咳嗽,无吐泻,家长在家选用退烧药对症治疗。发热20h左右出现腹泻,约2~3h一次大便,量少,黄色粘液便,呕吐1次。体格检查,T38.8℃,P118次/分,R28次/分,咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清,腹平软,肝脾未触及,肠鸣音活跃。实验室检查:WBC $18.5 \times 10^9/L$ (参考值

4.0×10⁹~10.0×10⁹), 粪便镜检可见红、白细胞。

- A. 每次腹泻后均要少量多次喂水, 直至腹泻停止
- B. 若患儿腹泻加重, 可口服自制补液盐进行补液
- C. 若症状不能改善, 可及时加用诺氟沙星
- D. 应给予少量、多次、清淡饮食
- E. 若患儿出现粪便带血等症状, 必须及时就医

【答案】 C

16、(2018年真题) 患者, 女, 35岁, 因感冒所致流涕、咳嗽发热等症到药店购药, 药师应推荐的药品是 ()

- A. 酚麻美敏片
- B. 萘甲唑啉滴鼻液
- C. 氯苯那敏片
- D. 对乙酰氨基酚片
- E. 奥司他韦胶囊

【答案】 A

17、药源性疾病是由药物诱发的疾病, 是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素和药物因素。

- A. 慢乙酰化者服用异烟肼后, 其半衰期延长至2~4.5h
- B. 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停

- C.肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病
- D.月经期服用常规剂量的避孕药和地西洋，其药理效应增强
- E.羟化酶缺乏者服用一半剂量的苯妥英钠可能引起明显的神经毒性

【答案】 C

18、评估房颤患者血栓栓塞风险的方法是

- A.CHA₂DS₂-VASc评分
- B.HAS-BLED评分
- C.CTP分级
- D.FEV1占预计值%
- E.CAT评分

【答案】 A

19、美金刚的作用机制为

- A.抑制 N-甲基天冬氨酸受体
- B.抑制胆碱酯酶
- C.脑循环改善剂
- D.钙离子拮抗剂
- E.他汀类

【答案】 C

20、对由甲氨蝶呤所引发的贫血者，宜应用的药物是

- A.叶酸+维生素 B12
- B.富马酸亚铁

C. 维生素 B12

D. 烟酸

E. 亚叶酸钙

【答案】 A

21、对由于胃肠、肝胆疾病引起的消化酶不足者可选用

A. 胰酶片

B. 雷尼替丁

C. 莫沙必利

D. 甲氧氯普胺

E. 胃蛋白酶合剂

【答案】 A

22、属于癌痛治疗第二阶梯的止痛药物为

A. 对乙酰氨基酚

B. 二氢可待因

C. 羟考酮

D. 哌替啶

E. 美沙酮

【答案】 B

23、高三酰甘油血症，首选的治疗药物是

A. 他汀类

B. 贝特类

D. ω -3 脂肪酸

E. 胆酸螯合剂

【答案】 B

24、(2019 年真题) 患者，男，68 岁，既往体健，因受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天入院。查体：体温 39.1℃，血压 138/80mmHg 心率 102 次/分，呼吸 32 次/分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数 $11.2 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 X 线左肺下叶浸润性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

A. 哌拉西林他唑巴坦

B. 头孢哌酮舒巴坦

C. 阿奇霉素

D. 莫西沙星

E. 复方磺胺甲噁唑

【答案】 D

25、在考虑患者意愿、偏好和生命质量的基础上，比较不同治疗方案的经济合理性，应选用的药物经济学研究方法是

A. 成本-效益分析

B. 成本-效果分析

C. 成本-效用分析

D. 最小成本分析

【答案】 C

26、适用于有完整子宫、绝经后期不希望有月经样出血的妇女()

- A.单纯孕激素补充治疗
- B.单纯雌激素补充治疗
- C.雌孕激素序贯用药
- D.雌孕激素连续联合用药
- E.雄激素对抗治疗

【答案】 D

27、可引起血清尿素氮降低的是

- A.胃溃疡
- B.肾衰竭
- C.严重肝病
- D.急性胰腺炎
- E.急性心肌梗死

【答案】 C

28、严重疼痛者可选用的镇痛药是

- A.罗通定
- B.塞来昔布
- C.氨酚待因片
- D.双氯芬酸钠缓释片

【答案】 C

29、处方前记项下包括的项目 ()

- A.临床诊断、费别
- B.主要实验室数据
- C.医师签名、药品金额
- D.对药物治疗的建设性意见与结果评价
- E.药品名称、剂型、规格、数量、用法用量

【答案】 A

30、中毒时可采用催吐处理方法的患者

- A.昏迷状态病人
- B.患有严重心脏病的患者
- C.中毒引起抽搐，惊厥被控制之后的清醒病人
- D.孕妇患者
- E.患有食管静脉曲张的患者

【答案】 C

31、以下药物中，用于治疗细菌感染性腹泻应首选的是

- A.维生素
- B.谷维素
- C.抗生素
- D.黄连素

【答案】 D

32、(2018年真题) 患者,女,53岁,冠心病史2年,目前服用硝酸异山梨酯、阿托伐他汀钙。近三个月因胃痛心境低落、有自杀倾向就诊,临床诊断为消化性溃疡、抑郁症。给予奥美拉唑肠溶片 40mg qd po 文拉法辛缓释片 150 mg qd po, 谷维素片 10 mg tid po 治疗,患者用药后出现血压升高可能导致该患者血压升高的药物是 ()

- A.文拉法辛缓释片
- B.硝酸异山梨酯片
- C.阿托伐他汀钙片
- D.奥美拉唑肠溶片
- E.谷维素片

【答案】 A

33、(2015年真题) 下列关于甲状腺功能减退患者激素替代治疗的说法,错误的是 ()。

- A.需要终身服药
- B.服用过量可能出现甲状腺功能亢进症状
- C.左甲状腺素应于早餐前半小时空腹服用
- D.妊娠期父母必须联合使用丙硫氧嘧啶
- E.治疗目标是将 TSH和甲状腺激素水平恢复到正常范围

【答案】 D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/166000153233011001>