

2024 江西省袁州区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题完整题库（必刷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2021 年真题）患者，男，69 岁，BMI27.8kg/mr，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 肾损害
- B: 共济失调
- C: 便秘
- D: 口干

答案：A

2. 左旋多巴的禁用范围是

- A: 1 岁以下婴儿
- B: 12 岁以下儿童
- C: 3 岁以下幼儿
- D: 8 岁以下儿童

答案：C

3. 关于烫伤患者的用药指导和患者教育，错误的是

- A: 烫伤后迅速用冷水或冰水湿敷患处
- B: 有脑外伤的患者可使用地西洋镇静
- C: 可使用红汞或甲紫药水涂抹患处
- D: 切忌用塑料布密封患处

答案：C

4. 患者，男，64 岁，因右足肿痛就诊。查体：右脚第一趾关节红肿，触痛明显。化验结果：血尿酸 581 μ mol/L。诊断为急性痛风性关节炎。患者合并高血压、高胆固醇血症、冠心病，目前正服用氢氯噻嗪片 25mgqd、美托洛尔缓释 47.5mgqd、赖诺普利片 20mgqd、辛伐他汀片 10mgqd、阿司匹林肠溶片 100mgqd。

- A: 贝诺酯片
- B: 别嘌醇片
- C: 双氯芬酸钠片
- D: 阿司匹林片（300mg）

答案：C

5. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件。处方按其性质分为法定处方和医师处方。《处方管理办法》还将处方分为麻醉药品处方、急诊处方、儿科处方、普通处方等。印刷用纸根据实际需要颜色区分，并在处方右上角以文字注明。

- A: 药品出库单
- B: 病区用药医嘱单
- C: 临床诊断书
- D: 病区领药单

答案：B

6. 患者，男，48 岁，近日自感头晕、头痛、眼花、耳鸣、心悸、失眠、乏力等症状，就诊后测定血压 160 / 100mmHg。

- A: β 受体阻断药
- B: ACEI
- C: 钙通道阻滞药

D: AR

答案: B

7. 应用 α -葡萄糖苷酶抑制药时注意事项错误的是

A: 餐后服用可减少胃肠道刺激

B: 与胰岛素或磺脲类药联合应用，可增加发生低血糖的危险

C: 非磺酰脲类胰岛素促泌剂与 α -葡萄糖苷酶抑制药合用易出现低血糖现象

D: 服用后常致胀气，可缓慢增加剂量和控制饮食减轻

答案: A

8. (新药 4 期临床评价的局限性)上市前临床试验观测的指标限于试验设计内容，其他临床指标容易被忽视，属于

A: 管理漏洞

B: 病例数量少

C: 观察时间短

D: 考察不全面

答案: D

9. 重症、急救治疗时，要求药物迅速起效，最不适宜选用的给药途径是

A: 吸入给药

B: 静脉滴注

C: 喷雾给药

D: 腔道给药

答案: D

10. 用于治疗骨质疏松症的是

- A: 炔雌醇
- B: 甲状腺素
- C: 糖皮质激素
- D: 胰岛素

答案：A

11. 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg。1 天前开始发热，体温 39.1℃，咽部稍痛，无咳嗽、无吐泻。家长在家选用退热药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，每间隔 2~3 小时排 1 次大便，量少，黄色黏液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次 / 分，咽部微充血，出现轻微脱水症状；双肺呼吸音清，腹平软，肝、脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9 / L$ ，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 分泌性腹泻
- B: 动力性腹泻
- C: 感染性腹泻
- D: 消化不良性腹泻

答案：C

12. 用于治疗铅中毒的特殊解毒剂是（ ）

- A: 二巯丁二钠
- B: 氟马西尼
- C: 纳洛酮
- D: 乙酰胺

答案：A

13. 餐前 1h 服用的药物是

- A: 奥美拉唑
- B: 阿托伐他汀

C: 复方氢氧化铝

D: 伊托必利

答案: C

14. 用于解救苯二氮草类药物中毒的特殊解毒剂是

A: 纳洛酮

B: 亚甲蓝

C: 氟马西尼

D: 乙酰半胱氨酸

答案: C

15. 解救经口急性铅中毒的洗胃液是

A: 1%氯化钠

B: 3%过氧化氢

C: 1%硫酸铜

D: 1%硫酸镁

答案: D

16. 重度贫血，Hb 为 ()

A: 60~90g/L

B: 60~120g/L

C: 90~120g/L

D: 小于 60g/L

答案: D

17. 应用铁剂的影响因素正常人对铁剂的吸收率为

A: 10%~30%

B: 0.3

C: 0.4

D: 10%~20%

答案: D

18. 苯丙胺中毒

A: 5%碳酸氢钠溶液

B: 药用炭混悬液

C: 1%氯化钠溶液

D: 1%硫酸镁溶液

答案: B

19. 患者，女，27岁，2年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血 T₃、T₄ 及 TSH 检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

A: 皮疹

B: 头痛

C: 肝功能损害

D: 粒细胞减少

答案: D

20. 纳洛酮作解毒剂用于

A: 巴比妥类中毒

B: 阿片中毒

C: 有机氟中毒

D: 阿米替林中毒

答案: B

21. (2015 年真题) 患者，女。62 岁，医师处方如下：

- A: 二甲双胍
- B: 阿卡波糖
- C: 氯吡格雷
- D: 氨氯地平

答案：C

22. 能监测用药过程中错误的真实发生率的方法是

- A: 病历审查
- B: 直接观察
- C: 计算机检测方法
- D: 岗位工作问责

答案：B

23. 依据咳嗽的发病时间，夜间咳嗽者宜首选()。

- A: 右美沙芬
- B: 可待因
- C: 苯丙哌林
- D: 吗啡

答案：A

24. 排钾利尿药使心脏对强心苷感受性增强的机制是

- A: 拮抗作用
- B: 敏感化作用
- C: 减少不良反应
- D: 协同作用

答案：B

25. 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂

- A: 丁螺环酮
- B: 阿米替林
- C: 舍曲林
- D: 艾司唑仑

答案：C

26. 下述“关于肺结核的治疗原则”中，不正确的是

- A: 防止耐药菌产生
- B: 整个治疗方案分为强化期和巩固期两个阶段
- C: 整个治疗方案分为 3 个阶段
- D: 减少结核菌的传播

答案：C

27. 通常开封启用 4 周后，不宜再继续使用的剂型是（）

- A: 含漱剂
- B: 直肠栓剂
- C: 软膏剂
- D: 滴眼剂

答案：D

28. 呋塞米

- A: 宜餐后服用
- B: 宜餐前服用
- C: 宜睡前服用
- D: 宜清晨服用

答案：D

29. 用于估算透析清除率的是（）

- A: CoChrAnE 分级
- B: CoCkroft-GAut 公式
- C: CLHD 公式
- D: NCEMERP 标准

答案：C

30. 医师用药咨询的内容是

- A: 一种药品有多种适应证或用药剂量范围较大
- B: 栓剂、滴眼剂和气雾剂等外用剂型的正确使用方法
- C: 减肥、补钙、补充营养素
- D: 抗菌药物的合理使用

答案：D

31. 单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的 2 型糖尿病患者宜选用

- A: 大剂量碘剂
- B: 胰岛素
- C: 二甲双胍
- D: 格列本脲

答案：C

32. 属于延长动作电位时程给药（第Ⅲ类）的抗心律失常药是

- A: 拉贝洛尔
- B: 胺碘酮
- C: 美西律
- D: 维拉帕米

答案：B

33. 在有关与药物使用的内容中，属于医师用药咨询的主要内容是

- A: 用药后预计起效时间、维持时间及疗效
- B: 合理用药信息
- C: 注射剂配制溶媒、浓度
- D: 首次剂量、维持剂量以及每日用药次数、间隔与疗效

答案：B

34. 关于癌症疼痛患者止痛药使用原则的说法，错误的是（）

- A: 应个体化用药
- B: 疼痛时用药，不痛时无需用药
- C: 按阶梯给药
- D: 提倡无创给药方式，尽量口服

答案：B

35. 除胰岛功能低下外，主要引起血糖超过正常参考区间高限的疾患是

- A: 激素分泌功能减退
- B: 激素分泌功能亢进
- C: 肾功能衰竭
- D: 肝癌、重症肝炎

答案：B

36. 痉挛性便秘

- A: 开塞露
- B: 羧甲基纤维素钠
- C: 比沙可啶
- D: 乳果糖

答案：B

37. 男性，72 岁。高血压病 3 年，血压 165/95mmHg，伴 2 型糖尿病。
首选降压药物是

- A: ACEI 类
- B: β -受体阻滞剂
- C: 心痛定
- D: 利尿剂

答案：A

38. 患者，女，20 岁，长期服用对乙酰氨基酚缓解痛经，为降低药物的肝毒性，可联合使用

- A: 亚甲蓝
- B: 纳洛酮
- C: N-乙酰半胱氨酸
- D: 青霉胺

答案：C

39. 稳定型心绞痛缓解期的治疗选用

- A: 硝酸甘油
- B: 阿司匹林
- C: 氯贝丁酯
- D: 低分子肝素

答案：B

40. 作用于 DNA 化学结构的药物是

- A: 顺铂
- B: 依托泊苷
- C: 放线菌
- D: 培美曲塞

答案：A

41. 体位性低血压

A: α 受体阻断剂

B: 氢氯噻嗪

C: 卡托普利

D: 普萘洛尔

答案：A

42. 急性痛风性关节炎期首选药物是

A: 别嘌醇

B: 秋水仙碱

C: 碳酸氢钠

D: 苯溴马隆

答案：B

43. 已知对乙酰氨基酚的成人剂量为一次 400mg。一个体重为 10kg 的 11 个月大的婴儿感冒发热，按体表面积计算该患儿的处方剂量应为

A: 75mg

B: 90mg

C: 100mg

D: 50mg

答案：C

44. 开具新药或增加药物前需考虑患者总体情况和药物相互作用，是指

A: 医嘱清楚准确

B: 修订医嘱及时沟通

C: 医嘱完整不漏项

D: 实现个体化治疗

答案：D

45. 从事药学服务的药师应具备沟通能力。此项要求的重要性不是

A: 可杜绝投诉事件

B: 是药师实施药学服务的基础

C: 可提高公众对药师的认知度

D: 可使患者获得有关用药指导

答案：A

46. 患者，女，38 岁，主诉：咳嗽、咳痰、高热、乏力 2 日；查体：神清、气稍促，心律 95bpm，律齐，体温 39.1℃，血压 110 / 70mmHg；心肺听诊：两肺呼吸音粗，未及明显啰音；发病以来胃纳差、精神欠佳、二便可、夜眠可。诊断：急性上呼吸道感染。

A: 100mg

B: 80mg

C: 60mg

D: 120mg

答案：A

47. 使用前应用青霉素进行皮试的药物是

A: 注射用头孢曲松钠

B: 左氧氟沙星片

C: 阿莫西林胶囊

D: 阿奇霉素片

答案：C

48. 欧洲药物管理局 (EMA) 提议“限制临床使用多潘立酮”的主要原因是

- A: 可能引起心脏相关风险
- B: 消化不良患者常擅自服用
- C: 可能引起腹胀、胃灼热
- D: 易发生严重的口腔溃疡

答案：A

49. 可用于对乙酰氨基酚过量所致中毒的药物是

- A: 纳洛酮
- B: 亚硝酸钠
- C: 乙酰半胱氨酸
- D: 乙酰胺

答案：C

50. 患者男, 70 岁, 典型的“面具脸”“慌张步态”表现, 临床诊断为帕金森病患者同时患有前列腺增生不宜选用的药物是()

- A: 卡比多巴
- B: 甲基多巴
- C: 普拉克索
- D: 苯海索

答案：D

51. 用于对洋地黄治疗无效的顽固性充血性心力衰竭, 长期使用可增加死亡率的磷酸二酯酶 III 抑制剂是

- A: 维拉帕米
- B: 米力农
- C: 多巴胺

D: 去乙酰毛花苷

答案：B

52. 应在清晨服用，可迅速在肠道发挥作用的盐类泻药是

A: 沙丁醇胺

B: 维生素 B1

C: 硫酸镁

D: 噻氯匹定

答案：C

53. 提示首次取硝酸甘油片的患者"要随身携带、在心绞痛发作时含于舌下"，是针对

A: 交代药品贮存条件与方法

B: 交代药物的用量

C: 交代用药途径及用药方法

D: 交代用药注意事项

答案：C

54. 为使铁剂更好的被人体吸收，宜同时应用

A: 叶酸+维生素 B12

B: 维生素 C

C: 硫酸亚铁

D: 亚叶酸钙

答案：B

55. 患者，女，19 岁，面部出现多个丘疹和脓疱有脱皮表现，临床诊断为痤疮。外用制剂改善不佳，换用异维 A 酸片。使用异维 A 酸片的用药注意事项和用药指导，不包括()

- A: 监测精神症状
- B: 用药前排除妊娠
- C: 治疗期间或治疗后 1 个月内避免献血
- D: 每 1—3 个月监测血尿酸水平

答案：D

56. 具有变形运动和吞噬功能，可吞噬抗原抗体复合物或细菌的细胞为

- A: 淋巴细胞
- B: 嗜酸性粒细胞
- C: 中性粒细胞
- D: 嗜碱性粒细胞

答案：B

57. 处方审核是处方调配中的重要环节，药师应确定处方内容正确无误后，方可进行药品调配。处方审核结果分为合理处方和不合理处方。不合理处方包括不规范处方、用药不适宜处方及超常处方。

- A: 重复用药
- B: 无正当理由开具高价药
- C: 无适应证用药
- D: 联合应用 3 种药物

答案：A

58. 肾上腺皮质激素可能引起

- A: 尿液隐血
- B: 尿葡萄糖
- C: 尿胆红素
- D: 尿蛋白

答案：B

59. 过敏性结膜炎和春季卡他性结膜炎可选用()

- A: 七叶洋地黄双苷滴眼液
- B: 氧氟沙星滴眼液
- C: 玻璃酸钠滴眼液
- D: 色甘酸钠滴眼液

答案: D

60. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。

日前体检：身高 160cm，体重 70kg；白细胞 $8.0 \times 10^9/L$

- A: 格列齐特
- B: 辛伐他汀
- C: 二甲双胍
- D: 非诺贝特

答案: C

61. 患者，男，45 岁，患有抑郁症，服用帕罗西汀 40mgqd6 月余。近期感染社区获得性肺炎，该患者不宜使用的抗感染药是

- A: 左氧氟沙星
- B: 阿莫西林-克拉维酸
- C: 头孢哌酮-舒巴坦
- D: 利奈唑胺

答案: D

62. 从事药学服务的药师应具备沟通能力，此项要求的重要性不包括

- A: 可使患者获得有关的用药指导
- B: 可提高患者用药的依从性和满意度
- C: 是药师实施药学服务的基本技能

D: 可杜绝投诉事件

答案: D

63. 最有可能确认患者用药伤害事件的方法是

A: 病历审查

B: 计算机检测方法

C: 直接观察

D: 岗位工作问责

答案: A

64. 下列哪个不是慢性咽炎的临床表现

A: 常伴有发热

B: 有刺激性咳嗽

C: 清晨起床后常会吐出微量的稀痰，伴有声嘶

D: 咽喉部不适、干燥、发痒、疼痛或有异物感

答案: A

65. 后记

A: 药品名称、剂型、规格、数量、用法用量

B: 主要实验室数据

C: 临床诊断、费别

D: 医师签名、药品金额

答案: D

66. 以下抗生素中，最适宜小儿使用的是

A: 米诺环素

B: 链霉素

C: 青霉素

D: 氯霉素

答案: C

67. 药物治疗的效果不以货币为单位表示，而是用其他量化的方法表达治疗目的的药物经济学评价方法是

A: 成本-效果分析

B: 最大成本法

C: 最小成本法

D: 成本-效益分析

答案: A

68. 患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

A: 心房颤动

B: 心室颤动

C: 阵发性室上性心动过速

D: 室性期前收缩

答案: A

69. 血液净化疗法可使重症毒物中毒者愈后大为改观，血液净化的方法不包括

A: 血液置换

B: 血液滤过

C: 腹膜透析

D: 血液透析

答案: A

70. 患者，女，49 岁，近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊，临床诊断为下呼吸道细菌性感染，处方如下：

- A: 阿司匹林泡腾片给药剂量不合理
- B: 左氧氟沙星片给药间隔不合理
- C: 维生素 C 片用法用量不合理
- D: 氨溴索片给药剂量不合理

答案：B

71. 淋巴细胞正常值参考范围是

- A: 0.01~0.05
- B: 0.03~0.08
- C: 0~0.01
- D: 0.20~0.40

答案：D

72. II 期临床试验需要多中心试验，即进行试验的医院的数目必须是

- A: 在 3 个及 3 个以上
- B: 在 1 个及 1 个以上
- C: 在 4 个及 4 个以上
- D: 在 2 个及 2 个以上

答案：A

73. 有关"书写处方药品剂量与数量"的叙述中，最正确的是

- A: 以阿拉伯数字书写
- B: 不能超过药品说明书中的用量
- C: 按照药品说明书
- D: 以罗马数字书写药品用量

答案：A

74. 下列治疗痤疮的药物中，患者在治疗期间及治疗结束后一个月内应避免献血的是

- A: 红霉素
- B: 过氧化苯甲酰
- C: 异维 A 酸
- D: 克林霉素

答案：C

75. 患者，女，68 岁，既往有高血压，双侧肾动脉狭窄，因水肿复诊，体检和实验室检查：血压 172 / 96mmHg，尿蛋白>29 / 24h(正常值<150mg / 24h)，血尿酸 416 $\mu\text{mol} / \text{L}$ (正常值 180~440 $\mu\text{mol} / \text{L}$)，血钾 6.1 mmol / L (正常值 3.5~5.5 mmol / L)。在已经服用氨氯地平的基础上，应考虑联合应用的抗血压药品是

- A: 螺内酯
- B: 依那普利
- C: 呋塞米
- D: 卡托普利

答案：C

76. 告知"人促红素可引起纯红细胞再生障碍性贫血"属于

- A: 药物相互作用
- B: 禁忌证
- C: 药品不良反应
- D: 新药信息

答案：C

77. 用于房颤时控制心室率的药物是

- A: 胺碘酮
- B: 维拉帕米
- C: 卡托普利
- D: 缬沙坦

答案：B

78. 适用于年轻、震颤突出的患者

- A: 苯海索
- B: 恩托卡朋
- C: 左旋多巴
- D: 司来吉兰

答案：A

79. 女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体检面色较苍白。血红蛋白 80g/L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 $7 \times 10^9 / L$ ，血小板 $120 \times 10^9 / L$ ，血清铁 $300 \mu g / L$ 。

- A: 正常人维持体内铁平衡需要每日从食物中摄取铁 2~2.5mg
- B: 钙剂可促进铁剂吸收
- C: 碳酸氢钠抑制铁剂吸收
- D: 尽量空腹服用亚铁盐，以促进其吸收

答案：C

80. 发现处方存在或潜在的问题、制定并实施干预和改进措施，是

- A: 处方审核
- B: 处方点评
- C: 药物信息服务
- D: 参与健康教育

答案：B

81. 患者，男，65 岁，良性前列腺增生病史 3 年，高血压病史 2 年，咳嗽，咳痰 10 余年，伴哮喘，尤以活动后明显，因近半月咳嗽加重入院，主诉便秘，每周 2 次排便，长期口服硝苯地平控释片 30mg/qd，血压控制良好。体格检查：体温 36.6℃，P82 次/分，R22 次/分，端坐位，喘息貌，桶状胸，双肺叩诊过清音，散在干啰音，双肺下少许湿罗音，辅助检查：血常规 WBC $11.2 \times 10^9/L$

- A: 氨溴索注射液
- B: 异丙托溴铵溶液
- C: 布地奈德混悬液
- D: 硝苯地平控释片

答案：B

82. 曲唑酮的作用机制为（）

- A: 抑制 5-HT 和 NE 的再摄取
- B: 抑制单胺氧化酶
- C: 抑制 NE 再摄取
- D: 抑制 5-HT 受体拮抗和再摄取

答案：D

83. 抗癫痫药应从小剂量起始给药，滴定增量，长期规律用药。成年癫痫患者药物治疗时

- A: 丙戊酸钠
- B: 卡马西平
- C: 苯妥英钠
- D: 拉莫三嗪

答案：A

84. 下列药品中，妊娠期妇女禁用的是

- A: 葡萄糖酸钙
- B: 拉贝洛尔
- C: 环丙沙星
- D: 维生素 A

答案：C

85. 巴比妥类重度中毒时出现的中枢神经系统症状为

- A: 昏迷、血压降低、呼吸抑制、心动缓慢和晕厥
- B: 呼吸减慢、变浅不规则，或呈潮式呼吸
- C: 可见心律失常、心搏骤停
- D: 可引起狂躁发作

答案：D

86. 对防范用药错误的策略而言，个人观认为发生用药错误的原因主要是

- A: 人员短缺
- B: 人的行为失常
- C: 环境缺陷
- D: 工作流程不规范

答案：B

87. 影响核酸转录的药物

- A: 放线菌
- B: 培美曲塞
- C: 依托泊苷
- D: 顺铂

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/166224205054011030>