

2023-24 年广东省源城区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题完整题库【夺分金卷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2018 年真题）患者，男，65 岁，因腹胀，呕吐就诊，医生处方，甲氧氯普胺片 20mg tid po 该处方属于（）

- A: 用法、用量不适宜
- B: 无适应证用药
- C: 有配伍禁忌
- D: 有禁忌证用药

答案：A

2. 能够给予当即解答的就当即解答

- A: 解释的技巧
- B: 特别关注特殊人群
- C: 及时回答不拖延
- D: 保护患者的隐私

答案：C

3. 尤其适用于胸膜炎伴胸痛的干咳患者的药品是

- A: 羧甲司坦
- B: 右美沙芬
- C: 苯丙哌林
- D: 可待因

答案：D

4. 使用消化性溃疡治疗药物的注意事项,因长期应用可导致腹泻或便秘的药物是

- A: 铝碳酸镁
- B: 硫糖铝
- C: 丙谷胺
- D: 铋剂

答案: A

5. 患者,女,67 岁,有高血压病史,右手抖动行走缓慢 4 年,诊断为帕金森病。服用复方左旋多巴治疗,症状一度好转后又反复加重,随后采用加大复方左旋多巴剂量,并加用苯海索。患者同时服用氨氯地平、缬沙坦等药物控制血压近日出现运动症状波动,伴有异动症。导致该不良反应的药物是()

- A: 氨氯地平
- B: 左旋多巴
- C: 苧丝肼
- D: 苯海索

答案: B

6. 将 0.5g 氨茶碱注射液加入到 5%葡萄糖注射液 250ml 中。临床要求给药速度是 60mg / h, 输注速度应是

- A: 20ml / h
- B: 30ml / h
- C: 10ml / h
- D: 60ml / h

答案: B

7. 肾功能不全患者宜选用的药物是

- A: 肾毒性小、经肝代谢的药物
- B: 经肝肾双途径消除的药物
- C: 经肝肠循环消除的药物
- D: 肝毒性小、经肾代谢的药物

答案：A

8. 氟胞嘧啶属于

- A: 抗肿瘤药
- B: 抗病毒药
- C: 抗过敏药
- D: 抗真菌药

答案：D

9. 滥用抗菌药物、糖皮质激素、人血白蛋白、二磷酸果糖及肿瘤辅助治疗药物

- A: 过度治疗用药
- B: 超适应证用药
- C: 有禁忌证用药
- D: 无适应证用药

答案：A

10. 巩固期隔日用药、初治短程化疗方案是

- A: 2S(E)HR2/4H3R3
- B: 2S(E)HR2/4HR
- C: 2HSP(E)/10HP(E)
- D: 1HS/11H2S2

答案：A

11. 机体钙吸收减少的机制是

- A: 组织吸收有自限性
- B: 经肾排泄的药物消除减慢
- C: 血浆蛋白含量下降，酸性代谢产物蓄积
- D: 药物生物转化障碍

答案：D

12. 早期 AD 患者选用

- A: 加兰他敏
- B: 金刚烷胺
- C: 司来吉兰
- D: 普拉克索

答案：A

13. 因胰腺功能不全引起的消化不良性腹泻适宜选用

- A: 双八面体蒙脱石
- B: 碳酸氢钠
- C: 胃蛋白酶
- D: 胰酶

答案：D

14. 用药后有可能出现球后视神经炎的抗结核药物是

- A: 乙胺丁醇
- B: 利福平
- C: 链霉素
- D: 吡嗪酰胺

答案：A

15. 脂溶性中等，作用持续 3~6h 的是

- A: 苯巴比妥
- B: 戊巴比妥
- C: 硫喷妥
- D: 巴比妥

答案：B

16. 患者因扁桃体炎给予头孢拉定治疗，服用 4 小时后，面部出现皮疹，无其他不适，停药后皮疹消失，排除其他疾病的可能。该病例用药与不良反应的因果关系评价结果是

- A: 很可能
- B: 肯定
- C: 可能
- D: 可能无关

答案：A

17. (透析患者常用药物)可消除便秘，避免腹腔感染和腹膜透析液引流不畅的药物是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 铁剂
- C: 阿法骨化醇
- D: 乳果糖

答案：D

18. 患者，女，69 岁，体型偏胖，BMI30.1kg / m²，患者诉平卧时常有反酸、烧心、胸痛，偶感背痛半年，近 1 周出现夜间咳嗽、咽部有异物感。自用止咳糖浆无效。查体：咽红，声音嘶哑；双肺听诊未闻及干、湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史：高血压病史 12 年，服用氨氯地平片 5mgqd，平素血压可控制在 140 / 85mmHg 左右；高脂血症病史 10 年，服用阿托伐他汀钙片 20mgqd。

- A: 胃食管反流病
- B: 心绞痛
- C: 支气管哮喘
- D: 胃溃疡

答案：A

19. 含右美沙芬制剂的禁用人群是

- A: 银屑病患者
- B: 青光眼患者
- C: 呼吸衰竭患者
- D: 孕妇

答案：D

20. 另有草药专辑、营养品专辑、眼药专辑、非处方药和食品补充剂专辑的是

- A: 《国家基本药物处方集（2012 年版）》
- B: 《医师案头参考》
- C: 《中国国家处方集（2010 年版）》
- D: 《英国国家处方集》

答案：B

21. 脑梗死的分期，急性期

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

A: 1~6 个月

B: 15 天

C: 2~3 个月

D: 1 个月内

答案：D

22. 在夏季，用前宜其置入冰水或冰箱中 10~20 分钟；给药后 1~2 小时内尽量不排尿

A: 阴道栓剂

B: 气雾剂

C: 膜剂

D: 泡腾片

答案：A

23. 二级信息源的优点叙述，最正确的是

A: 可提供丰富的信息

B: 对一个具体问题提供的信息全面、详实

C: 有的还能提供疾病与药物治疗的基本知识

D: 读者能自己评价信息，免受他人观点影响

答案：A

24. 以下治疗沙眼的药物中，对急性结膜炎者忌用的是()。

A: 硫酸锌滴眼剂

B: 红霉素眼药膏

C: 利福平滴眼剂

D: 酞丁安滴眼剂

答案：A

25. 能刺激骨骼、肌肉和组织的生长发育的是

A: 肽激素类

B: 麻醉药品

C: 蛋白同化制剂

D: 利尿剂

答案：A

26. 医嘱：万古霉素 0.5g 溶解至 100ml 生理盐水中，滴注时间不得少于 75 分钟。已知所用输液器的滴系数为 15，试问每分钟滴数最多为

A: 23 滴

B: 26 滴

C: 15 滴

D: 20 滴

答案：D

27. 在检查尿沉渣的项目中，最能提示是肾实质性病变的证据是

A: 尿沉渣白细胞

B: 尿沉渣磷酸盐

C: 尿沉渣管型

D: 尿沉渣结晶

答案：C

28. 对衣物或毛发具有氧化漂白作用，应尽量避免接触的痤疮治疗药是

A: 米诺环素

B: 维 A 酸

C: 过氧化苯甲酰

D: 口服短效避孕药

答案：C

29. 患者于 1 周前无诱因出现咳嗽，咳嗽为阵发性，痰少，呈白色黏液性，不易咳出，同时出现发热，体温多在夜间升高，38℃左右，无畏冷、寒战、胸痛、咳血等，于卫生院治疗后，未见好转，并有气喘、气促，活动后呼吸困难等症状。入院治疗诊断为：肺炎。

- A: 医疗机构从业人员
- B: 慢性病患者及体弱多病者
- C: 3 岁以上儿童
- D: 60 岁上的老人

答案：C

30. 大剂量或连续使用顺铂导致

- A: 阻塞肾小管、肾小球
- B: 前列腺素合成障碍
- C: 肾小管坏死
- D: 肾间质纤维化

答案：C

31. 以下所列药物中，推荐用于治疗三叉神经痛者的首选处方药是

- A: 舒马曲坦
- B: 卡马西平
- C: 地西泮
- D: 苯噻啶

答案：B

32. 患者，女，42 岁，因成骨肉瘤使用环磷酰胺甲氨蝶呤联合化疗，用药过程中，者出现出血性膀胱炎。适宜的处理措施是()

- A: 停药，给予糖皮质激素
- B: 停药，给予亚叶酸钙治疗

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

C: 给予糖皮质激素冲击治疗

D: 停药，水化，给予美司钠治疗

答案：D

33. 患者手术后，给予肠外营养液 10%GS500ml，50%GS250ml，20%脂肪乳 250ml，8.5%复方氨基酸 750ml，水溶性维生素 10ml，脂溶性维生素 10ml，微量元素 10ml，10%氯化钠注射液 40ml，10%氯化钾注射液 30ml。营养液中脂肪如提供的能量是()

- A: 200kcal
- B: 700kcal
- C: 1150kcal
- D: 450kcal

答案：D

34. 服用后可引起多尿驾驶员应慎用的药物是()

- A: 吲达帕胺
- B: 胰酶
- C: 氯苯那敏
- D: 阿司匹林

答案：A

35. (2015 年真题) 老年人使用可导致甲状腺功能异常，肺毒性或 Q-T 间期延长，不宜作为心房颤动一线用药的是 ()。

- A: 福辛普利
- B: 地高辛
- C: 胺碘酮
- D: 美托洛尔

答案：C

36. 药物治疗结核病的原则及早用药以利于杀灭结核菌株

- A: 早期
- B: 规律
- C: 联合
- D: 适量

答案：A

37. 下列药品中，不属于不宜选用葡萄糖注射液溶解的药品是

- A: 青霉素
- B: 红霉素
- C: 苯妥英钠
- D: 阿昔洛韦

答案：B

38. 服药后应保持上身直立的药物是

- A: 去氨加压素
- B: 阿莫西林
- C: 硫酸亚铁
- D: 阿仑膦酸钠

答案：D

39. 关于血清天冬氨酸氨基转移酶的叙述正确的是

- A: 在慢性肝炎尤其是肝硬化时，AST 升高的幅度不如 ALT
- B: 天冬氨酸氨基转移酶主要存在于心肌、肝、肾、骨骼肌、胰腺等组织细胞中，同时也存在于正常人的血浆、胆汁、脑脊液及唾液中
- C: 天冬氨酸氨基转移酶 (AST) 与丙氨酸氨基转移酶 (GPT) 是同一概念
- D: 天冬氨酸氨基转移酶的测定值只反映肝脏的功能

答案：B

40. 药师接待医师咨询问题时，常见的咨询内容不包括

- A: 新药临床评价
- B: 药品的适应证、用法与用量
- C: 国内外新药动态
- D: 药物的药效学与药动学有关问题

答案：B

41. (治疗消化性溃疡的胃黏膜保护剂)可促进胃黏膜-黏液分泌与内源性前列腺素生成的药物是 ()

- A: 碳酸镁
- B: 硫糖铝
- C: 米索前列醇
- D: 雷贝拉唑

答案：C

42. 代表乙型肝炎病毒 e 抗原的是

- A: HBsAb
- B: HBcAb
- C: HBeAg
- D: HBeAb

答案：C

43. 提示首次取硝酸甘油片的患者"要随身携带、在心绞痛发作时含于舌下"，是针对

- A: 交代用药注意事项
- B: 交代药品贮存条件与方法
- C: 交代药物的用量
- D: 交代用药途径及用药方法

答案：D

44. 由服用利尿药所引起的尿失禁属于

- A: 压力性尿失禁
- B: 急迫性尿失禁
- C: 真性尿失禁
- D: 急性、可逆性/暂时性尿失禁

答案：D

45. 患者，女，46 岁，高血压病史 3 年，2 年前出现关节晨僵、手关节及膝关节疼痛，诊断为类风湿关节炎。半年前症状加重，采用了联合用药方案：患者用药如下：

- A: 双氯芬酸钠缓释片
- B: 羟氯喹片
- C: 甲氨蝶呤片
- D: 氨氯地平片

答案：B

46. 速效胰岛素的作用峰时为（）。

- A: 0.6～1.5 小时
- B: 1.5～4 小时
- C: 0.25～0.5 小时
- D: 6～12 小时

答案：A

47. 治疗肺炎的抗菌药物的疗程一般为

- A: 5 天
- B: 7～10 天

C: 15 天

D: 3 天

答案：B

48. 以下药物中，肝病患者应该慎用的是

A: 泛酸钙

B: 谷氨酸

C: 甘草酸二铵

D: 氯丙嗪

答案：D

49. 辛伐他汀

A: 宜清晨服用

B: 宜餐前服用

C: 宜睡前服用

D: 宜餐后服用

答案：C

50. 酮康唑、氟康唑、伊曲康唑可导致

A: 药源性血损害

B: 药源性肝损害

C: 药源性肾损害

D: 药源性神经损害

答案：B

51. 10 岁以上的儿童 2 型糖尿病患者适宜选择的降糖药是

A: 格列美脲

B: 二甲双胍

C: 瑞格列奈

D: 胰岛素

答案：B

52. 易受光线影响而变质的药品是

A: 阿卡波糖片

B: 头孢曲松钠

C: 硝酸甘油

D: 复方甘草合剂

答案：C

53. 患者男 78 岁，因心房颤动服用华法林治疗 2 年余。后因真菌感染使用氟康唑，用药后 INR 升高并出现咳血症状。出现该症状的主要原因是（）

A: 氟康唑可增加华法林的吸收，导致华法林血药浓度升高

B: 氟康唑可抑制 CYP2C9，导致华法林血药浓度升高

C: 氟康唑具有较强的血浆蛋白结合力，导致血中游离的华法林浓度升高

D: 氟康唑抑制华法林的肾脏排泄，导致华法林血药浓度升高

答案：B

54. 用药时须与食物同服的增强认知功能药物为（）

A: 卡巴拉汀

B: 加兰他敏

C: 苯海索

D: 多奈哌齐

答案：A

55. 可诊断男性高尿酸血症的是

- A: 血尿酸为 $380\ \mu\text{mol/L}$
- B: 血尿酸为 $200\ \mu\text{mol/L}$
- C: 血尿酸为 $420\ \mu\text{mol/L}$
- D: 血尿酸为 $270\ \mu\text{mol/L}$

答案：C

56. 抑制近端肾小管对尿酸盐的重吸收，使尿酸排出增加，减少尿酸沉积

- A: 丙磺舒
- B: 秋水仙碱
- C: 阿司匹林
- D: 别嘌醇

答案：A

57. (2015 年真题) 饮茶可减少其吸收的药物是 ()。

- A: 去氮加压素
- B: 硫酸亚铁
- C: 阿莫西林
- D: 阿仑膦酸钠

答案：B

58. 属于超长效的胰岛素制剂是

- A: 赖脯胰岛素
- B: 精蛋白锌胰岛素
- C: 低精蛋白锌胰岛素
- D: 甘精胰岛素

答案：D

59. (2019 年真题) 关于口腔溃疡药物治疗的说法，错误的是

- A: 复方甘菊利多卡因凝胶局部涂敷，一日 3 次，稍加按摩
- B: 西地碘含片，一次 6mg，一日 4 次，含服
- C: 补充复合维生素 B 和维生素 C 有利于促进溃疡面愈合
- D: 氯己定含漱液，每次 15-20ml，一日 2~3 次，含漱

答案：B

60. 可提供摘要、引文、索引及目录的信息属于

- A: 四级信息
- B: 三级信息
- C: 一级信息
- D: 二级信息

答案：D

61. 患者，男，72 岁既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。一个月前因出现哮喘症状就诊医师布地奈德气雾剂 200 μ g bid 吸入沙丁胺醇气雾剂 100 μ g prn 吸入，氨氯地平片 5mg qd 口服及硝酸甘油片 0.5mg prn 舌下含服治疗。

- A: 硝酸甘油剂量不足
- B: 沙丁胺醇的不良反应
- C: 氨氯地平的不良反应
- D: 布地奈德剂量太大

答案：B

62. 初步的临床药理学及人体安全性评价试验阶段，属于

- A: I 期临床试验
- B: IV 期临床试验

C: II 期临床试验

D: III 期临床试验

答案: A

63. 对半衰期短的药物，为了减少血药浓度波动可采取的方法是()

A: 减少给药剂量

B: 增加给药剂量

C: 延长给药间隔

D: 缩短给药间隔的同时减少单剂量

答案: D

64. (2015 年真题) 消化不良患者宜选用 ()。

A: 小檗碱

B: 干酵母

C: 阿苯达唑

D: 乳果糖

答案: B

65. 与黄连上清丸不宜联用的药物是

A: 氨茶碱

B: 乳酶生

C: 氢氧化铝

D: 苯巴比妥

答案: B

66. 血清天门冬氨酸氨基转移酶 (AST) 的正常值参考范围是

A: 速率法: <40U/L

B: <40U/L

C: 速率法：成人<40U/L

D: 成人<60U/L

答案：C

67. 在与患者进行沟通的过程中，切忌的事项是

A: 可提供一些宣传资料

B: 一次性尽量提供更多的信息

C: 认真聆听

D: 尽量避免使用专业术语

答案：B

68. (2016 年真题) 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别。

A: D 级

B: B 级

C: A 级

D: C 级

答案：A

69. 降钙素

A: 骨吸收抑制剂

B: 促进骨矿化剂

C: 激素替代剂

D: 骨形成刺激剂

答案：A

70. 振奋精神增加供氧能力的兴奋剂是

A: 苯丙胺

B: 呋塞米

C: 甲睾酮

D: 阿托品

答案: A

71. 患者，男性，36 岁，主因“反复上腹部疼痛 3 年，加重伴黑便 2 天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院 3 年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前 2 天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及暖气，并伴有黑便，呈糊状，共排 3 次，每次约 250g 左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36.2℃、P84 次/分、R20 次/分、BP110/70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 3~5 次/分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有 1.5cm×2cm 椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

A: 优先选择艾司奥美拉唑 20mgqd，疗程 6 周

B: 优先选择艾司奥美拉唑 20mgqd，疗程 4 周

C: 优先选择法莫替丁 20mgqn，疗程 8 周

D: 优先选择法莫替丁 20mgbid，疗程 8 周

答案: B

72. 以下不同人群中，白细胞或红细胞计数正常值参考范围的数值最高的是

A: 成人男性

B: 成人女性

C: 儿童

D: 新生儿

答案：D

73. 咳嗽较弱者宜选用的药物是

A: 右美沙芬

B: 喷托维林

C: 苯丙哌林

D: 氨溴索

答案：B

74. 妥布霉素可导致

A: 不可逆性肾小管坏死

B: 前列腺素合成障碍

C: 肾小球滤过率下降

D: 结晶沉积

答案：C

75. 填写具体；如患卵巢囊肿合并肺部感染注射头孢曲松引起不良反应，应填写肺部感染

A: 不良反应 / 事件的结果

B: 用药起止时间

C: 用药原因

D: ADR/ADE 过程描述

答案：C

76. 服用环孢素不宜同食

- A: 咖啡
- B: 食醋
- C: 葡萄柚汁
- D: 高蛋白食物

答案：C

77. 苯妥英钠、呋塞米蛋白结合率下降的机制是

- A: 组织吸收有自限性
- B: 药物生物转化障碍
- C: 经肾排泄的药物消除减慢
- D: 血浆蛋白含量下降，酸性代谢产物蓄积

答案：D

78. 胃食管反流病患者应避免使用的药物是（）

- A: 维生素 C
- B: 特拉唑嗪
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 美托洛尔

答案：C

79. 高胆固醇血症，首选的治疗药物是

- A: 烟酸类
- B: 他汀类
- C: ω -3 脂肪酸制剂
- D: 贝特类

答案：B

80. 患者，男，46 岁，因类风湿性关节炎长期使用免疫抑制剂，近日因出现发热、咳嗽、咳痰入院经病原学检查，诊断为侵袭性肺曲霉病，临床欲使用伏立康唑治疗。患者同时合并肝功能不全 Child-TurcottePugh(CTP) 评分为 13 分(CTPC 级)。根据 CTP 评分结果，药师的用建议是()

- A: 该患者重度肝功能不全，不建议使用伏立康唑
- B: 该患者中度肝功能不全，伏立康唑维持剂量减少 50%
- C: 该患者轻度肝功能不全，伏立康唑维持剂量不变
- D: 该患者轻度肝功能不全，伏立康唑维持剂量减少 25%

答案：A

81. 剂量过大，疗程过长，滴注速度过快，用药途径错误，重复用药等归属

- A: 药理作用
- B: 药物的使用
- C: 药动学相互作用
- D: 药物制剂因素

答案：B

82. 尤以铅中毒疗效好的解毒剂是

- A: 二巯丙醇
- B: 二巯丁二钠
- C: 青霉胺
- D: 依地酸钙钠

答案：D

83. 患者到药店要求购买痢特灵，药师应该给予

- A: 呋喃唑酮

- B: 喷托维林
- C: 诺氟沙星
- D: 双嘧达莫

答案：A

84. 《中国药典》规定"凉暗处"除避光外，温度不应超过（）

- A: 15℃
- B: 4℃
- C: 20℃
- D: 10℃

答案：C

85. （2017 年真题）治疗肠道蛔虫病可选用（）

- A: 莫沙必利
- B: 阿苯达唑
- C: 聚乙醇 4000
- D: 双八面体蒙脱石散

答案：B

86. 治疗疼痛“1 日 1 次，每次 75mg：最大剂量为 150mg，分两次服用”的药物是

- A: 罗通定
- B: 氨酚待因片
- C: 双氯芬酸钠缓释片
- D: 塞来昔布

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

87. 禁与单胺氧化酶抑制剂联用的药物不包括（）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/166241140110011030>