

2024 江西省袁州区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题真题附参考答案（典型题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者术后，给予肠外营养液 10%GS500ml、50%GS250ml、20%脂肪乳 250ml、8.5%复方氨基酸 750ml、水溶性维生素 10ml、脂溶性维生素 10ml、微量元素 10ml、10%氯化钠注射液 40ml、10%氯化钾注射液 30ml

- A: 450kcal
- B: 200kcal
- C: 700kcal
- D: 1150kcal

答案：C

2. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。日前体检：身高 160cm，体重 70kg；白细胞 8.0×10

- A: 格列齐特
- B: 二甲双胍
- C: 非诺贝特
- D: 辛伐他汀

答案：B

3. 早晨因咳嗽和打喷嚏引起的头痛，提示可能是

- A: 脑血管意外
- B: 脑肿瘤

C: 脑膜炎

D: 动脉瘤

答案：B

4. 消化不良很常见，半数以上人群在生命过程中曾因此病症而就诊，其主要症状有上腹饱胀、食欲缺乏等表现。

A: 雷尼替丁

B: 复方阿嗝米特肠溶片

C: 莫沙必利

D: 胰酶片

答案：A

5. 静脉注射青霉素的适宜溶媒是

A: 0.9%氯化钠注射液

B: 5%葡萄糖注射液

C: 复方氨基酸注射液

D: 50%葡萄糖注射液

答案：A

6. 解热镇痛药用于退热属于对症治疗，因此两次用药的间隔时间应该是

A: 4~6 小时

B: 5~7 小时

C: 2~4 小时

D: 3~5 小时

答案：A

7. 维 A 酸与过氧苯甲酰联合应用治疗痤疮时，正确的用法是

- A: 睡前应用过氧苯甲酰凝胶，晨起洗漱后应用维 A 酸凝胶或乳膏？
- B: 将两种药物的凝胶或乳膏充分混合后同时应用？
- C: 睡前应用维 A 酸凝胶或乳膏，晨起洗漱后应用过氧苯甲酰凝胶？
- D: 两药的凝胶或乳膏间隔 2 小时交替使用？

答案：C

8. 血清丙氨酸氨基转移酶正常参考区间是

- A: 男性 <40U/L
- B: 成人 <50U/L
- C: 男性 11~50U/L
- D: 成人 <40U/L

答案：D

9. 主要用于伴有血清 PSA 水平过高、前列腺体积增大的前列腺增生症患者的治疗药物是

- A: 奥昔布宁
- B: 非那雄胺
- C: 坦索罗辛
- D: 米多君

答案：B

10. 关于帕金森病患者的用药指导，错误的是

- A: 苯海索不宜与单胺氧化酶抑制剂同时服用
- B: 老年患者尽量选用苯海索，除非震颤严重影响生活质量
- C: 金刚烷胺剂量为 50~100mg，2~3 次/日，末次应在下午 4 时前服用
- D: 对于认知功能减退或因特殊工作之需，力求显著改善运动症状，可选用复方左旋多巴作为治疗首选药

答案：B

11. 禁用于严重痛风患者的调脂药物为

- A: 考来烯胺
- B: 烟酸类
- C: 阿托伐他汀
- D: 非诺贝特

答案：B

12. 血管紧张素 II 受体阻断剂

- A: 缬沙坦
- B: 氢氯噻嗪
- C: 氨氯地平
- D: 依那普利

答案：A

13. 患者,女,69岁,体型偏胖,BMI30.1主诉夜间咳嗽、咽部有异物感,平躺时常有反酸、烧心胸痛伴背痛,自用止咳糖浆无效。查体:咽红听诊双肺未闻及干湿性啰音,偶有哮鸣音。既往史:高血压病史12年,服用氨氯地平片5mgqd血压控制在140/85mmHg左右,高脂血症10年,服用阿托伐他汀钙片20mgqd

- A: 支气管哮喘
- B: 心绞痛
- C: 胃溃疡
- D: 胃食管反流病

答案：D

14. 1g 葡萄糖可提供的热量是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 4Kcal
- B: 2Kcal
- C: 3Kcal
- D: 1Kcal

答案：A

15. 紫外线加速一些药品的氧化、分解

- A: 温度
- B: 日光
- C: 空气
- D: 湿度

答案：B

16. (2017 年真题) 根据《中国成人超重和肥胖预防控制指南》体重指数 (BMI) 判断为肥胖的标准是 ()

- A: $BMI \leq 18.5$
- B: $BMI \geq 24.0$
- C: $BMI < 21.5$
- D: $BMI \geq 28.0$

答案：D

17. 下列药物中，不属于兴奋剂的是

- A: 利尿剂
- B: 精神刺激剂
- C: β 受体阻断剂
- D: 钙通道阻断剂

答案：D

18. 环磷酰胺

- A: 出血性膀胱炎
- B: 肺纤维化
- C: 心脏毒性
- D: 溶血性尿毒症

答案：A

19. 抗菌药物适宜

- A: 餐中服用
- B: 餐前服用
- C: 清晨服用
- D: 餐后服用

答案：B

20. 如“齐二药事件”

- A: 发现与规避假、劣药流入市场
- B: 药品上市前风险评估
- C: 发现药品质量问题
- D: 药品上市后风险评估

答案：A

21. 用质量调整生命年或伤残调整生命年为衡量指标，分析患者生活质量的提升与医疗成本的关系。该药物经济学评价方法是

- A: 成本-效果分析
- B: 成本-效益分析
- C: 成本-效用分析
- D: 最小成本分析

答案：C

22. 患者,男,65 岁因咳嗽、咳大量脓痰、呼吸困难入院,诊断为慢性阻塞性肺病急性加重。该患者临床治疗不应选用的药物是 ()

- A: 氨溴索
- B: 羧甲司坦
- C: 乙酰半胱氨酸
- D: 右美沙芬

答案: D

23. 发热 (发烧) 指人体体温升高, 超过正常范围, 主要表现是体温升高、脉搏加快。按体温状况, 发热分为低热、中等度热、高热、超高热。中等度热是指体温范围

- A: $38.1^{\circ}\text{C} \sim 39.0^{\circ}\text{C}$
- B: $39.1^{\circ}\text{C} \sim 41.0^{\circ}\text{C}$
- C: $37.0^{\circ}\text{C} \sim 38.3^{\circ}\text{C}$
- D: $37.4^{\circ}\text{C} \sim 38.0^{\circ}\text{C}$

答案: A

24. 人的体重指数 (BMI) = 体重 (kg) / 身高的平方 (m^2), 中国人根据 BMI 值判断肥胖的标准是

- A: <18.5
- B: $18.5 \sim 23.9$
- C: ≥ 28
- D: ≥ 26

答案: C

25. 易受光线影响而变质的药品是

- A: 硝酸甘油

- B: 阿卡波糖片
- C: 头孢曲松钠
- D: 复方甘草合剂

答案：A

26. 患者,男,72 岁既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。一个月前因出现哮喘症状就诊医师布地奈德气雾剂 200 μ g bid 吸入沙丁胺醇气雾剂 100 μ g prn 吸入,氨氯地平片 5mg qd 口服及硝酸甘油片 0.5mg prn 舌下含服治疗。

- A: 布地奈德剂量太大
- B: 硝酸甘油剂量不足
- C: 氨氯地平的不良反应
- D: 沙丁胺醇的不良反应

答案：D

27. 苯二氮（卓）类中毒血压下降时可给予

- A: 阿托品
- B: 有机硫类
- C: 间羟胺
- D: 地西泮

答案：C

28. 消化不良很常见，半数以上人群在生命过程中曾因此病症而就诊，其主要症状有上腹饱胀、食欲缺乏等表现。

- A: 微生态制剂不可用于消化不良的治疗
- B: 胰酶片必须用肠溶衣片，口服时不可嚼碎，应整片吞下
- C: 过量的干酵母和乳酶生可以引起腹泻
- D: 乳腺癌、机械性肠梗阻患者禁用多潘立酮

答案：A

29. 结核病化学治疗成功的关键措施是

- A: 采用间歇疗法
- B: 采用大剂量
- C: 采用短程疗法
- D: 避免与克服细菌耐药

答案：D

30. 患者突发心前区压榨性疼痛,立即取出硝酸甘油片,正确的使用方法是()

- A: 应同时碱化尿液
- B: 舌下含服
- C: 用温水调服
- D: 清晨服用

答案：B

31. 属于治疗荨麻疹的过敏活性物质阻释剂的是

- A: 酮替芬
- B: 赛庚啶
- C: 去氯羟嗪
- D: 异丙嗪

答案：A

32. 常见老年人 ADR 的药物类别,普萘洛尔致心动过缓、心脏停搏、诱发哮喘,加重心衰

- A: β 受体阻断剂
- B: 抗胆碱药

C: 抗生素

D: 钙通道阻滞剂

答案：A

33. 容易引湿的药物是

A: 阿扑吗啡

B: 牛痘菌苗

C: 青霉素类

D: 胃蛋白酶

答案：D

34. 茶碱属于

A: CYP3A4 抑制剂

B: CYP3A4 诱导剂

C: CYP2C19 底物药物

D: CYP1A2 底物药物

答案：D

35. 新药临床评价分为

A: 三期

B: 二期

C: 一期

D: 四期

答案：D

36. (肾功能不全者的抗菌药物给药方案调整)肾功能重度损害时，抗菌药减低至正常剂量的

A: $1/7 \sim 1/5$

B: $1/10 \sim 1/5$

C: $3/5 \sim 3/4$

D: $1/5 \sim 1/2$

答案：B

37. 由环境（灰尘、风沙、倒睫、屈光不正）刺激所致的非细菌性结膜炎可选用

A: 碘苷滴眼液

B: 杆菌肽眼膏

C: 1%泼尼松龙滴眼液

D: 硫酸锌滴眼液

答案：D

38. 对于效果不易察觉或起效慢的药物，应特别提示、告知坚持服药

A: 使患者了解药物的重要性

B: 针对患者生理及心理特点选药

C: 简化治疗方案

D: 使用分时药盒和用药记录

答案：A

39. 就乙肝血清免疫学检查而言，判别“大三阳”区别于“小三阳”的主要检查项目结果是

A: HBsAg(+)

B: 抗-HBe(+)

C: HBeAg(+)

D: 抗-HBs(+)

答案：C

40. 患者，女，54 岁。诊断为类风湿关节炎 2 年，目前服用甲氨蝶呤 (15mgqw) 和塞来昔布 (200mgqd)。患者因担心药品不良反应用药规律时断时续近日出现腕关节肿胀和疼痛加重晨僵明显加用泼尼松 10mgqd。

- A: 定期就诊评估病情,调整治疗方案
- B: 多晒太阳适量补充钙剂、维生素 D 预防骨质疏松
- C: 一旦症状改善,应即刻停药
- D: 早期治疗、遵医嘱规律用药

答案：C

41. 宜于睡前服用的药品是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 阿卡波糖
- C: 洛伐他汀
- D: 糖皮质激素

答案：C

42. 患者，男，48 岁，患有青光眼 3 年。今日因支气管哮喘急性发作，给予舒张支气管、抗炎等治疗，应告知该患者用药后需漱口的药物是 ()

- A: 多索茶碱注射液
- B: 沙丁胺醇气雾剂
- C: 布地奈德混悬液
- D: 孟鲁斯特纳咀嚼片

答案：C

43. 美托洛尔和肾上腺素的相互作用属于 ()。

- A: 与血浆蛋白结合
- B: 排泄

C: 酶诱导作用

D: 作用于同一受体的拮抗作用

答案: D

44. 为使铁剂更好的被人体吸收，宜同时应用

A: 维生素 C

B: 亚叶酸钙

C: 叶酸+维生素 B12

D: 硫酸亚铁

答案: A

45. 题]可影响幼儿软骨发育，导致承重关节损伤的药物是

A: 头孢唑林

B: 阿米卡星

C: 诺氟沙星

D: 米诺环素

答案: C

46. 吉法酯片治疗消化性溃疡，正确的用药方法是（）

A: 餐前 1/小时嚼碎服用

B: 睡前服用

C: 清晨空腹整片吞服，并保持上身直立至少 30 分钟

D: 餐后半小时服用

答案: D

47. 对于形似或声似的药品要加用醒目的标识，是针对药品调配环节防范措施中的

A: 及时沟通

- B: 规范操作、坚持核对
- C: 保证足够的人力配备
- D: 环境整齐、安静

答案：D

48. 应用华法林抗凝治疗时，INR 的安全有效范围在我国通常为

- A: <2.0
- B: $2.0 \sim 3.0$
- C: $2.0 \sim 2.5$
- D: >3.0

答案：B

49. 阿米洛利及复方制剂

- A: 可使驾驶员出现定向力障碍
- B: 可使驾驶员出现眩晕和幻觉
- C: 可导致驾驶员多尿或多汗
- D: 可使驾驶员视物模糊或辨色困难

答案：C

50. 已知 1%(g/mL) 枸橼酸钠溶液的冰点降低值为 0.185°C ，计算其等渗溶液的浓度是()。

- A: 2.91(%, g/mL)
- B: 2.61(%, g/mL)
- C: 3.11(%, g/mL)
- D: 2.81(%, g/mL)

答案：D

51. 慢性阻塞性肺病急性加重期伴脓痰者宜选用的治疗方案是()

- A: 吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药
- B: 长效 β_2 受体激动剂+吸入型糖皮质激素
- C: 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂
- D: 抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素

答案：D

52. 治疗药源性疾病的方法如下，最先采用的是

- A: 调整治疗方案
- B: 停用致病药物
- C: 对症治疗
- D: 拮抗致病药物

答案：B

53. （2018 年真题）婴幼儿腹泻，服用地衣芽孢杆菌活菌制剂，正确的使用方法是（）

- A: 清晨服用
- B: 应同时碱化尿液
- C: 舌下含服
- D: 用温水调服

答案：D

54. V 级临床研究的结论或任何级别多个研究有矛盾或不确定的结论属于

- A: C 级
- B: D 级
- C: E 级
- D: B 级

答案：B

55. 二巯丙醇用于解救

- A: 水银中毒
- B: 吗啡中毒
- C: 有机磷中毒
- D: 氰化物中毒

答案：A

56. 可透过胎盘屏障，可能引起胎儿甲状腺肿大及功能减退，在分娩时造成难产、窒息的药物是

- A: 苯海拉明
- B: 左甲状腺素
- C: 双氯芬酸
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：D

57. 患儿，女，4 岁半。身高 110cm，体重 15kg。一天前发热（39.1℃），咽喉痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，发病 20h 左右出现腹泻，约 2~5h，一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽位充血，出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \sim 10 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 小檗碱和鞣酸蛋白不宜同时服用？
- B: 首选口服补液，必要时静脉补液？
- C: 腹泻可致电解质丢失，故须特别注意补充？
- D: 药用炭可以吸附细菌和毒素，可与抗生素同时服用？

答案：D

58. 糖尿病合并肾病者宜首选的药物是

- A: 格列喹酮
- B: 阿卡波糖
- C: 二甲双胍
- D: 罗格列酮

答案：A

59. 氢氯噻嗪与地高辛同服出现心律失常的机制是

- A: 敏感化作用
- B: 协同作用
- C: 减少不良反应
- D: 竞争性拮抗作用

答案：A

60. 对于 ACEI 类药描述错误的是

- A: 抑制交感神经活性作用
- B: 抑制血管紧张素转化酶 (ACE) 活性
- C: 明显降低全身血管阻力
- D: 唯一的抑制心肌及血管重构药物

答案：A

61. 早餐前半小时服用的药物是 ()

- A: 枸橼酸铋钾
- B: 雷贝拉唑
- C: 瑞巴派特
- D: 吉法酯

答案：B

62. 作为退热药的首选，对乙酰氨基酚的优势是

- A: 大剂量对肝脏有损害
- B: 可作用缓和而持久
- C: 解热作用强，镇痛作用较弱
- D: 正常剂量下较为安全有效

答案：D

63. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 糖皮质激素
- B: 阿司匹林
- C: 布洛芬
- D: 抗菌药物

答案：A

64. 关于非甾体抗炎药的叙述正确是

- A: 发热时可首选非甾体抗炎药
- B: 非甾体抗炎药联合应用糖皮质激素类药物是造成胃肠道损害的危险因素
- C: 出现疼痛症状可首选非甾体抗炎药
- D: 使用非甾体抗炎药引起的肾功能不全发生率高于氨基糖苷类抗生素引起的肾功能不全

答案：B

65. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

- A: 妊娠 1~2 周
- B: 妊娠 1~3 周
- C: 妊娠 3~4 周
- D: 妊娠 3~5 周

答案：D

66. 抗结核治疗中，细胞内外均有杀菌作用，且单一杀菌力最强的药物是

- A: 利福平
- B: 异烟肼
- C: 乙胺丁醇
- D: 吡嗪酰胺

答案：B

67. 治疗发热成人服对乙酰氨基酚，每隔 4~6 小时重复用药 1 次；1 日用量不得超过

- A: 3.0g
- B: 2.0g
- C: 2.5g
- D: 4.5g

答案：B

68. 对合并糖尿病及肾病的高血压患者的降压目标是

- A: <160 / 90mmHg
- B: <150 / 90mmHg
- C: <140 / 85mmHg
- D: <130 / 80mmHg

答案：D

69. 患者，男，58 岁，高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 160mmHg，心率 75 次/分。该患者目前服用的药物除抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

- A: 双氯芬酸
- B: 碳酸钙 D
- C: 甲钴胺
- D: 氨基葡萄糖

答案：A

70. 血液净化疗法可使重症毒物中毒者愈后大为改观，血液净化的方法不包括

- A: 血液滤过
- B: 腹膜透析
- C: 血液透析
- D: 血液置换

答案：D

71. 表现为“牛肉样舌”的疾病为()

- A: 白血病
- B: 再生障碍性贫血
- C: 缺铁性贫血
- D: 巨幼细胞性贫血

答案：D

72. (2018 年真题) 患者，男，38 岁，因腹部受寒胃脘疼痛，应选用的药物是()

- A: 麦角胺咖啡因
- B: 山莨菪碱
- C: 布洛芬
- D: 卡马西平

答案：B

73. 可致急性肾衰竭、肾功能异常及肾小管损害的药物是

- A: 阿昔洛韦
- B: 阿洛司琼
- C: 甲氨蝶呤
- D: 利巴韦林

答案：A

74. 妊娠期妇女甲亢首选

- A: 放射性 ^{131}I
- B: 碘化钾
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 甲巯咪唑

答案：C

75. 癫痫持续状态的好发年龄段为（）

- A: 6 岁以内
- B: 1 岁以内及 65 岁以上
- C: 55 岁以上
- D: 65 岁以上

答案：B

76. 患者，男，59 岁，诊断为 2 型糖尿病，因口服降糖药疗效欠佳，给予预混胰岛素 30R 注射液。关于该患者用药教育的说法，错误的是（ ）

- A: 使用前应缓慢摇匀，确保给药剂量准确
- B: 胰岛素笔芯启用后不宜冷藏保存
- C: 应警惕发生低血糖，提醒患者随身携带木糖醇糖果
- D: 未开启的胰岛素制剂应冷藏保存，冷冻后不可再使用

答案：C

77. 患者，女，34 岁，因易疲劳、体重增加、反应迟钝、肌肉痉挛就诊，化验结果显示 TSH 增高 FT₃、FT₄ 减低，临床诊断为甲状腺功能减退使用左甲状腺素钠 100 μg qd 治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是（ ）

- A: 晚餐后顿服
- B: 早餐后半小时，顿服
- C: 早餐前半小时，顿服
- D: 睡前顿服

答案：C

78. 下列“给药时间是依据生物钟规律而设定”的事例中，最正确的是

- A: 餐前服用阿莫西林
- B: 清晨服用硫酸镁
- C: 餐前服用格列本脲
- D: 清晨服用帕罗西汀

答案：D

79. 临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排出毒物的同时，应积极使用特效的拮抗剂。

- A: 阿托品

B: 维生素 B

C: 维生素 K

D: 乙酰胺

答案：C

80. 从患者安全、环境污染和医务人员职业暴露多角度降低风险的是

A: 静脉药物配置

B: 参与临床药物治疗

C: 处方调配

D: 治疗药物监测

答案：A

81. (常用的特殊解毒剂的适应证)，急性阿片类及急性乙醇中毒的特殊解毒剂

A: 纳洛酮

B: 二巯丁二钠

C: 谷胱甘肽

D: 乙酰半胱氨酸

答案：A

82. 静脉滴注阿昔洛韦的适宜溶媒是

A: 复方氯化钠注射液

B: 0.9%氯化钠注射液

C: 50%葡萄糖注射液

D: 5%葡萄糖注射液

答案：B

83. 患儿，男，1 岁 3 个月，因仍不能独立行走而就诊。经询问其母亲，该患儿一直睡眠不好，夜哭较多，非常容易出汗，数次罹患呼吸道感染。查体：头部有“枕秃”。实验室检查：血钙水平低于正常值。诊断为“佝偻病”。

- A: 15 万—30 万 IU
- B: 30 万—45 万 IU
- C: 30 万~60 万 IU
- D: 10 万—15 万 IU

答案：A

84. 细菌性尿路感染最常见的致病菌是()

- A: 大肠埃希菌
- B: 铜绿假单胞菌
- C: 肠球菌
- D: 克雷伯杆菌

答案：A

85. 关于现代药学的发展,临床药学阶段的特征是

- A: 以促进合理用药为主
- B: 以新药研制为中心
- C: 以药品工业化生产为中心
- D: 药师的工作局限于药品调配、供应等基础工作

答案：A

86. 可能导致血小板(PLT)计数减少的药物是

- A: 氯氮平
- B: 苯妥英钠

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 阿司匹林

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/167154136046010024>