

2024 年安徽省宁国市《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题内部题库带答案（黄金题型）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 通过抑制碳酸酐酶发挥利尿作用的药物是

- A: 呋达帕胺
- B: 托拉塞米
- C: 乙酰唑胺
- D: 氢氯噻嗪

答案：C

2. 促胃肠动力药是()

- A: 甲氧氯普胺
- B: 肾上腺素
- C: 阿托品
- D: 熊去氧胆酸

答案：A

3. 属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的药品是

- A: 乙烯雌酚
- B: 氟他胺
- C: 他莫昔芬
- D: 托瑞米芬

答案：B

4. 哌拉西林和羧苄西林()

- A: 肾毒性大
- B: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- C: 口服，肌肉注射或静脉注射均可用于全身感染
- D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染

答案：D

5. 治疗地高辛中毒引起窦性心动过缓的药物是

- A: 阿托品
- B: 胺碘酮
- C: 阿利吉仑
- D: 沙库巴曲缬沙坦

答案：A

6. 属于拓扑异构酶 I 抑制剂的生物碱是

- A: 羟喜树碱
- B: 来曲唑
- C: 甲氨蝶呤
- D: 卡莫氟

答案：A

7. 肝素过量可选用的拮抗药是()

- A: 维生素 K1
- B: 氨甲苯酸
- C: 葡萄糖酸钙
- D: 鱼精蛋白

答案：D

8. 属于 IA 类抗心律失常药

- A: 利多卡因
- B: 胺碘酮
- C: 奎尼丁
- D: 普萘洛尔

答案：C

9. 地高辛的中毒血清浓度为()

- A: >20ng/ml
- B: >2ng/ml
- C: >5ng/ml
- D: >50ng/ml

答案：B

10. 不宜应用喹诺酮类药物的人群是

- A: 老年人
- B: 溃疡病患者
- C: 婴幼儿
- D: 肝病患者

答案：C

11. 长效的 5-HT₂受体阻断剂是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 帕洛诺司琼
- C: 氯丙嗪
- D: 劳拉西泮

答案：B

12. ACEI 与()联合应用时，可能影响后者的促红细胞生成作用。

- A: 噻嗪类利尿剂
- B: 人促红素
- C: 留钾利尿剂
- D: β 受体阻断剂

答案：B

13. 急性缺血性脑卒中发作，应用溶栓药治疗时间窗是在发病后

- A: 12 小时内
- B: 3 小时内
- C: 8 小时内
- D: 24 小时内

答案：B

14. 按作用时间分类，属于超长效的胰岛素 / 胰岛素类似物的是

- A: 精蛋白锌胰岛素
- B: 预混胰岛素
- C: 地特胰岛素
- D: 普通胰岛素

答案：C

15. 下述属于 β 受体阻断剂禁忌证的是

- A: 不适用于先天性青光眼患者
- B: 甲状腺功能亢进患者禁用
- C: 虹膜睫状体炎患者禁用
- D: 心动过缓、房室传导阻滞患者禁用

答案：D

16. 可中效、稳定的降低糖化血红蛋白的是

- A: 西格列汀
- B: 胰岛素皮下注射
- C: 阿卡波糖
- D: 吡格列酮

答案：A

17. 使用抗眼部细菌感染药利福平滴眼剂后，常见的不良反应是()

- A: 头痛、偏头痛
- B: 青光眼
- C: 牙龈出血和感染
- D: 全身过敏反应

答案：C

18. (2017 年真题) 眼底散瞳检查宜选用 ()

- A: 拉坦前列素滴眼剂
- B: 氯霉素滴眼剂
- C: 托吡卡胺滴眼剂
- D: 碘苷滴眼剂

答案：C

19. 对红霉素的描述，下列不正确的是

- A: 属繁殖期杀菌剂
- B: 具有肝脏毒性
- C: 对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌有效
- D: 抗菌谱与青霉素相似但略广

答案：A

20. 属于治疗固醇性胆囊结石的是

- A: 山莨菪碱
- B: 熊去氧胆酸
- C: 多潘立酮
- D: 胶体果胶铋

答案：B

21. 下列属于超短效胰岛素的是()

- A: 门冬胰岛素
- B: 低精蛋白锌胰岛素
- C: 精蛋白锌胰岛素
- D: 甘精胰岛素

答案：A

22. 关于奥司他韦作用特点的说法,错误的是()

- A: 治疗流感时,首次使用奥司他韦应当在流感症状出现后的 48 小时以内
- B: 1 岁以上儿童可以使用奥司他韦
- C: 奥司他韦可用于甲型和乙型流感的治疗
- D: 应严格掌握奥司他韦适应证,不能用于流感的预防

答案：D

23. 易使牙齿变黑的是

- A: 硫酸亚铁片
- B: 硫酸亚铁糖浆
- C: 琥珀酸亚铁胶囊
- D: 硫酸亚铁缓释片

答案：B

24. (2015 年真题) 属于雌激素受体阻断剂的抗肿瘤药是 () 。

- A: 他莫昔芬
- B: 阿那曲唑
- C: 炔雌醇
- D: 丙酸睾酮

答案: A

25. 促进钙吸收 ()

- A: 阿法骨化醇
- B: 葡萄糖酸钙
- C: 依降钙素
- D: 阿仑膦酸钠

答案: A

26. 卡马西平适用于

- A: 急慢性脑功能不全
- B: 神经源性尿崩症
- C: 原发性失眠
- D: 内分泌失调引起的失眠

答案: B

27. 属于低危患者可应用 PDE5 抑制剂的是

- A: 2 周前发生过心肌梗死或脑卒中
- B: 轻度、稳定型心绞痛
- C: 中度的充血性心力衰竭
- D: 高血压未得到控制者

答案: B

28. 关于孟鲁司特钠临床使用注意事项的说法，正确的

- A: 孟鲁司特钠起效快，适用于哮喘急性发作
- B: 孟鲁司特钠对阿司匹林诱发的哮喘无效
- C: 通过抑制磷酸二酯酶的活性而发挥作用
- D: 孟鲁司特钠使用后可能会导致嗜酸性粒细胞增多

答案：D

29. 呋塞米与抗组胺药合用时

- A: 利尿作用减弱
- B: 耳毒性增加
- C: 引起电解质紊乱的概率增加
- D: 低氯性碱中毒机会增加

答案：B

30. 下列关于紫杉醇的描述，错误的是

- A: 应预防由紫杉醇所致的超敏反应
- B: 与多西他赛相比，神经毒性和心脏毒性都较轻
- C: 长期应用可产生抗药性，出现多药耐药性现象
- D: 广谱、天然抗肿瘤药

答案：B

31. 属于二肽基肽酶-4 抑制剂的是

- A: 阿卡波糖
- B: 罗格列酮
- C: 二甲双胍
- D: 西格列汀

答案：D

32. 首选用于伤寒、副伤寒的是()

- A: 氯霉素
- B: 青霉素
- C: 两性霉素 B
- D: 克林霉素

答案: A

33. 磺酰脲类药物最常见的不良反应

- A: 低血糖
- B: 眩晕嗜睡
- C: 共济失调
- D: 腹痛、腹泻

答案: A

34. 卡马西平用于

- A: 神经源性尿崩症
- B: 早期帕金森病
- C: 特发性震颤
- D: 慢性脑功能不全

答案: A

35. 患者，男，42 岁。左耳流脓 1 年，脓稀不臭。检查发现左鼓膜紧张部穿孔，鼓室有黏膜，下述不适用的局部用药是

- A: 氯霉素滴耳液
- B: 3%过氧化氢
- C: 氧氟沙星滴耳液
- D: 酚甘油滴耳液

答案：D

36. 钙通道阻滞剂的药理作用不包括

- A: 主要舒张静脉，对动脉影响较小
- B: 抗动脉粥样硬化作用
- C: 抑制血小板活化
- D: 松弛支气管平滑肌

答案：A

37. 药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄色葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹理加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。若患者不能耐受万古霉素时，可选择替代的药物是（）

- A: 头孢哌酮
- B: 阿米卡星
- C: 替考拉宁
- D: 头孢曲松

答案：C

38. 磺酰脲类降糖药的作用机制是

- A: 抑制胰岛素降解
- B: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- C: 加速胰岛素合成
- D: 提高胰岛 β 细胞功能

答案：B

39. 下列可引起糖尿病患者血糖过低，而对非糖尿病患者无降血糖作用的抗心律失常药物是

- A: 美西律
- B: 普萘洛尔
- C: 胺碘酮
- D: 地尔硫革

答案：B

40. 患者,男,30 岁有长期便秘病史,因胃痛就医,诊断为胃溃疡,该患者治疗胃溃疡应避免使用的药物是 ()

- A: 雷贝拉唑
- B: 奥美拉唑
- C: 西咪替丁
- D: 氢氧化铝

答案：D

41. 通过抑制胆碱酯酶活性,提高脑内乙酰胆碱含量的药物是

- A: 阿尼西坦
- B: 舍曲林
- C: 多奈哌齐
- D: 艾地苯醌

答案：C

42. 为了保护亚胺培南,防止其在肾中破坏,应与其配伍的药物是 ()

- A: 他唑巴坦
- B: 克拉维酸
- C: 舒巴坦
- D: 西司他丁

答案：D

43. 下列药物中属于缩瞳药的是

- A: 托吡卡胺
- B: 硫酸阿托品
- C: 毛果芸香碱
- D: 氢溴酸后马托品

答案：C

44. 属于胞嘧啶抗代谢类药物的是()

- A: 长春瑞滨
- B: 甲氨蝶呤
- C: 吉西他滨
- D: 巯嘌呤

答案：C

45. 异烟肼抗结核杆菌的机制是

- A: 抑制 DNA 螺旋酶
- B: 抑制细菌细胞壁的合成
- C: 抑制细菌分枝菌酸合成
- D: 抑制细胞核酸代谢

答案：C

46. 关于地芬诺酯的叙述，不正确的是()

- A: 长期应用可产生依赖性
- B: 用于急、慢性功能性腹泻
- C: 可吸附肠内的细菌及有毒气体
- D: 能提高肠张力，减少肠蠕动

答案：C

47. 某患者新诊断为退行性膝关节炎,既往有磺胺过敏史,不宜选用的非甾体抗炎药是 ()

- A: 吲哚美辛
- B: 布洛芬
- C: 双氯芬酸
- D: 塞来昔布

答案: D

48. 镇静催眠药佐匹克隆的禁忌证是 ()

- A: 糖尿病
- B: 重症肌无力
- C: 低蛋白血症
- D: 癫痫

答案: B

49. 主要经胆汁排泄的是

- A: 头孢噻肟
- B: 头孢哌酮
- C: 庆大霉素
- D: 阿莫西林

答案: B

50. 患者,男,57岁,身高175cm,体重87kg,诊断为2型糖尿病。医生给予二甲双胍片口服,500mg, bid。

- A: 餐前半小时
- B: 餐后2小时
- C: 餐后半小时
- D: 随餐服用

答案：D

51. 下述药物中属于减鼻充血药的是

- A: 盐酸麻黄碱溶剂
- B: 复方薄荷樟脑溶剂
- C: 色甘酸钠溶剂
- D: 链霉素溶剂

答案：A

52. 属于单胺氧化酶抑制药的是

- A: 溴隐亭
- B: 石杉碱甲
- C: 金刚烷胺
- D: 司来吉兰

答案：D

53. （2016 年真题）可以碱化尿液，用于代谢性酸中毒的药品是

- A: 谷氨酸
- B: 氯化钾
- C: 乳酸钠
- D: 硫酸镁

答案：C

54. 容易引起球后神经炎的抗结核药物是

- A: 异烟肼
- B: 链霉素
- C: 乙胺丁醇
- D: 利福平

答案：C

55. (2018 年真题) 属于贝丁酸类的调节血脂药是 ()

- A: 非诺贝特
- B: 依折麦布
- C: 烟酸
- D: 辛伐他汀

答案：A

56. 用于较严重的频繁干咳，极量一次 100mg 的药物是

- A: 地塞米松
- B: 苯丙哌林
- C: 右美沙芬
- D: 可待因

答案：D

57. 糖皮质激素的药理作用不包括

- A: 免疫抑制
- B: 抗病毒
- C: 抗炎
- D: 抗休克

答案：B

58. 不属于氟喹诺酮类的药物是

- A: 莫西沙星
- B: 小檗碱
- C: 依诺沙星
- D: 环丙沙星

答案：B

59. 可用于减轻季节性过敏性鼻炎相关症状的药物是

- A: 白三烯受体阻断剂
- B: 磷酸二酯酶抑制剂
- C: M 受体拮抗剂
- D: β 受体激动剂

答案：A

60. 下列关于袪利尿药使用的描述中，不正确的是()

- A: 可多次应用最小有效剂量
- B: 可联用作用部位不同的利尿药
- C: 出现利尿药抵抗时，可使用低效利尿药增大剂量
- D: 单独使用可能会使利尿作用降低

答案：C

61. 慢性外耳道炎时局部滴用，促使耳道干燥，可选用()

- A: 伪麻黄碱
- B: 2%酚甘油
- C: 赛洛唑啉
- D: 3%硼酸乙醇

答案：D

62. 具有长效、平稳、血药浓度无峰值特点的胰岛素/胰岛素类代物是()
()

- A: 甘精胰岛素注射液
- B: 普通胰岛素注射液
- C: 预混胰岛素注射液

D: 精蛋白锌胰岛素注射液

答案: A

63. (2016 年真题) 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的是

A: 依折麦布

B: 非诺贝特

C: 阿昔莫司

D: 阿托伐他汀

答案: D

64. 司坦唑醇的禁忌证不包括

A: 肾炎

B: 严重心功能不全

C: 前列腺增生

D: 男性乳腺癌

答案: B

65. 对浅表和深部真菌感染都有效的抗真菌药物是

A: 灰黄霉素

B: 特比萘芬

C: 氟胞嘧啶

D: 酮康唑

答案: D

66. 12% 复方氨基酸注射液 (18AA) 的静脉滴速为

A: 滴速 20~30 滴 / 分

B: 滴速 80~100 滴 / 分

C: 不超过 15 滴 / 分

D: 不超过 40 滴 / 分

答案：A

67. 下列不可用于治疗前列腺增生的是

A: 特拉唑嗪

B: 非那雄胺

C: 西地那非

D: 坦洛新

答案：C

68. (2017 年真题) 可杀灭疥虫的药物是 ()

A: 维 A 酸

B: 林旦

C: 阿苯达唑

D: 甲苯达唑

答案：B

69. 主要用于肺炎支原体、衣原体、立克次体及螺旋体 (四体) 感染的药物是

A: 红霉素

B: 阿奇霉素

C: 头孢米诺

D: 四环素

答案：D

70. 金刚烷胺和美金刚合用

A: 增加锥体外系不良反应的风险

B: 增加中枢神经系统毒性 (建议避免合用)

C: 增加肾毒性

D: 可增加抗胆碱不良反应的危险

答案: B

71. 羟基脲选择性作用于肿瘤细胞

A: S 期

B: M 期

C: G

D: G

答案: A

72. 对择期手术者，且无需抗血小板治疗者，应于术前多久考虑停用抗血小板药、抗凝血药

A: 3 天

B: 5 天

C: 1 天

D: 1 周

答案: D

73. 哮喘急性发作首选的治疗药物是

A: 短效 B₂ 受体激动剂

B: 白三烯受体阻断剂

C: 吸入性糖皮质激素

D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案: A

74. 可抑制维生素 K 环氧化酶活性的抗凝血药是

A: 达比加群酯

B: 依诺肝素

C: 氨甲环酸

D: 华法林

答案: D

75. 小剂量时有抑制血栓形成作用的是

A: 吲哚美辛

B: 阿司匹林

C: 对乙酰氨基酚

D: 塞来昔布

答案: B

76. 硫脲类药物用于甲状腺功能亢进内科治疗的正确给药方式是

A: 开始给小剂量，基础代谢正常后药量递减，直至维持量

B: 开始给小剂量，以后逐渐加大剂量，直至基础代谢率正常，改用维持量

C: 开始给大剂量，基础代谢正常后药量递减，直至维持量

D: 开始给治疗量，基础代谢正常后继续给 3~6 个月停药

答案: C

77. (2015 年真题) 应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的项目是 ()。

A: B 淋巴细胞表面的 CD20 抗原

B: 血管内皮生长因子

C: 人表皮生长因子受体-2

D: 表皮生长因子受体

答案: C

78. 可产生严重的低血压、皮疹、高钾血症的肾素抑制剂是 ()

- A: 利血平
- B: 甲基多巴
- C: 哌唑嗪
- D: 阿利克仑

答案：D

79. 具有抑制胃酸分泌作用的药物是

- A: 莫沙必利
- B: 西沙必利
- C: 碳酸氢钠
- D: 奥美拉唑

答案：D

80. 骨髓抑制最严重的是 ()

- A: 亚叶酸钙
- B: 卡铂
- C: 顺铂
- D: 奥沙利铂

答案：B

81. 仅用于绝经后妇女，不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是

- A: 骨化三醇
- B: 降钙素
- C: 雷洛昔芬
- D: 阿仑膦酸钠

答案：C

82. 连续使用应间隔 4h 以上

- A: 麻黄碱
- B: 羟甲唑啉
- C: 酚甘油滴耳液
- D: 赛洛唑啉

答案：B

83. 下列维生素中，属于水溶性的是（）。

- A: 维生素 A
- B: 维生素
- C: 维生素
- D: 维生素

答案：D

84. 葡萄球菌感染的角膜炎可选用

- A: 金霉素眼膏
- B: 1%泼尼松滴眼液
- C: 夫西地酸滴眼剂
- D: 多黏菌素 B 滴眼液

答案：C

85. （2016 年真题）哮喘急性发作首选的治疗药物是

- A: 短效 β_2 受体激动剂
- B: 磷酸二酯酶抑制剂
- C: 吸入性糖皮质激素
- D: 白三烯受体阻断剂

答案：A

86. 与吲达帕胺合用，可导致心律失常的是

- A: 多巴胺
- B: 胺碘酮
- C: 考来烯胺
- D: 拟交感药

答案：B

87. 属于 I b 类抗心律失常药的是

- A: 奎尼丁
- B: 胺碘酮
- C: 利多卡因
- D: 普罗帕酮

答案：C

88. (2021 年真题) 可用于治疗蛔虫病、蛲虫病、钩虫病和鞭虫病的广谱驱虫药物是 ()

- A: 甲硝唑
- B: 乙胺嗪
- C: 甲苯咪唑
- D: 氯硝柳胺

答案：C

89. 胰岛素依赖型重症糖尿病用

- A: 二甲双胍
- B: 胰岛素皮下注射
- C: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- D: 艾塞那肽

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/168021025046007022>