

2025--2025 年主治医师之内科主治 303 基础试题 库和答案要点

单选题（共 45 题）

1、诊断低血糖症，除外

- A. 发作时血糖低于 3.0mmol/L ，伴有血浆胰岛素值 $\geq 36\text{pmol/L}$
- B. 严重者静脉输葡萄糖液可缓解
- C. 口服糖水或进餐无效
- D. 出汗、紧张、饥饿
- E. 48 小时饥饿试验可诱发

【答案】 C

2、女，20 岁，8 月中旬以“发热、腹泻 3 天，抽搐、意识不清 4 小时”为主诉入院。查体：BP $90/60\text{mmHg}$ ，P 90 次/分，T 39.5°C ，意识不清，呼之不应，双侧瞳孔不等大，颈强，心肺未见异常。化验末梢血 WBC $20 \times 10^9/\text{L}$ ，N85%，L15%。该患儿应立即给予下列哪种药物治疗

- A. 甘露醇
- B. 多巴胺
- C. 头孢菌素
- D. 糖皮质激素
- E. 灌肠

【答案】 A

3、女性，16 岁，幼年曾患肺门淋巴结结核，近 3 年来咳嗽、咳痰有时为脓性，偶咯血。胸片显示，右下肺野可疑絮状影，右心缘模糊，右心膈角难以辨认从影像学表现看，病变部位可能在

- A. 右下叶后基底段

臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

- B. 中叶
- C. 纵隔胸膜增厚
- D. 右下叶
- E. 叶间胸膜

【答案】 B

4、最符合丝虫病所致胸腔积液改变的是

- A. Rivalta 试验（-）、中性粒细胞为主
- B. Rivalta 试验（+）、葡萄糖含量降低
- C. Rivalta 试验（+）、淋巴细胞为主、ADA 升高、CEA 小于 $10\mu\text{g/l}$
- D. Rivalta 试验（+）、苏丹III染色阳性、胆固醇含量正常
- E. Rivalta 试验（±）、淋巴细胞为主、ADA 降低、CEA 大于 $10\mu\text{g/l}$

【答案】 D

5、患者，男，30岁。自幼出现发作性呼吸困难，间断咳嗽。3天来喘息发作，伴咳嗽，咳少量粘液痰。体检：端坐呼吸，大汗，口唇发绀，两肺可闻及广泛哮鸣音，最可能的诊断是

- A. 自发性气胸
- B. 喘息型支气管炎
- C. 慢性支气管炎合并肺内感染
- D. 哮喘急性发作
- E. 心源性哮喘

【答案】 D

6、下列哪项不是肝性脑病的诱因

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

- A. 感染
- B. 便秘
- C. 高血糖
- D. 高蛋白饮食
- E. 大量排钾利尿

【答案】 C

7、患者女，37岁，劳累后突发寒战、高热1天、伴腰痛，尿频、急、痛，查体：体温39.6℃，呼吸24次/分，脉搏100次/分，血压90/60mmHg，左肾区叩痛（+）。尿常规白细胞满视野，红细胞10~15个/HP，可见白细胞管型，尿蛋白（+）。

- A. IVP
- B. 肾超声检查
- C. 清洁中段尿培养
- D. 膀胱镜检查
- E. 肾活检病理检查
- F. CT

【答案】 C

8、结核性腹膜炎最主要的感染途径是

- A. 呼吸道播散
- B. 腹腔内结核病灶直接蔓延
- C. 血行播散
- D. 淋巴播散
- E. 泌尿道播散

【答案】 B

9、女，32岁。双腕和膝关节疼痛，伴高热2个月。曾有癫痫样发作一次。心脏超声检查示中等量心包积液；X线胸片示右侧少量胸腔积液。血常规检查Hb、WBC和血小板下降。尿蛋白(++)，多种抗生素治疗无效，最可能诊断

- A. 恶性肿瘤颅内转移
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 再生障碍性贫血
- D. 肾小球肾炎急性发作
- E. 结核性胸膜炎和心包炎

【答案】 B

10、患者女，46岁，因“颜面皮疹、周身水肿3个月”来诊。孕3次，均在孕12周左右出现自然流产，无明显口干、眼干，无口腔溃疡及关节肿痛。入院后查体：颜面部可见充血性皮疹，周身水肿。检查示尿蛋白(+++)，血小板 $4.6 \times 10^9/L$

- A. 慢性肾炎
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 特发性血小板减少性紫癜
- D. 混合性结缔组织病
- E. 染色体异常
- F. 干燥综合征

【答案】 B

11、进行性脊髓性肌萎缩

- A. 全身肌肉萎缩及肌束震颤

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

- B. 咽反射消失
- C. 双上肢肌肉萎缩及巴宾斯基征阳性
- D. 咽反射亢进
- E. 舌肌萎缩

【答案】 A

12、咳嗽伴发热在下列哪种疾病中不常见

- A. 急性下呼吸道感染
- B. 胸膜炎
- C. 急性上呼吸道感染
- D. 自发性气胸
- E. 肺结核

【答案】 D

13、干酪型结核性腹膜炎常见并发症为()

- A. 发热和盗汗
- B. 腹水
- C. 肠瘘
- D. 腹部肿块
- E. 肠梗阻

【答案】 C

14、患者，女性，35岁，人工流产后出现双手指关节痛3个月，伴晨僵约1小时左右，对症用中药治疗效果不佳；查体双手第1、2掌指关节(MCP)肿胀，压

痛明显，第4近端指间关节(PIP)肿胀，压痛明显；X线示关节间隙正常，双手骨质疏松，可见小囊性破坏样改变

- A. 骨关节炎
- B. 类风湿关节炎
- C. 系统性红斑狼疮
- D. 多发性肌炎
- E. 强直性脊柱炎

【答案】 B

15、以下哪项属于胃癌前病变

- A. 残胃炎
- B. 胃黏膜上皮中度以上非典型增生
- C. 胃溃疡
- D. 慢性萎缩性胃炎
- E. Hp 相关性胃炎

【答案】 B

16、铁缺乏时，供给骨髓造血用的铁是下列哪项提供的

- A. 贮存铁
- B. 血红蛋白铁
- C. 运转中的铁
- D. 易变池铁
- E. 肌红蛋白铁

【答案】 A

17、下述血管炎中与乙型病毒性肝炎有关的是

- A. 结节性多动脉炎
- B. 贝赫切特(白塞)病
- C. Wegener 肉芽肿
- D. 巨细胞动脉炎
- E. 变应性肉芽肿

【答案】 A

18、男性，40岁，某蓄电池厂工人，因持续性腹绞痛，阵发性加剧而入院。患者自诉近5年来经常有腹绞痛发作，部位多在脐周，发作时尚能坚持工作。但近1年来，腹痛发作频繁，发作时大汗淋漓，面色苍白，在地上打滚，并伴有头痛、头昏、乏力、关节酸痛。查体：一般情况尚可，体温正常，面色苍白，牙龈有色素沉着，眼底动脉痉挛，腹部平软，肝脾未扪及，肠鸣音正常，诊断为慢性铅中毒

- A. 二巯基丙醇
- B. 二巯基丙磺酸钠
- C. 二巯基丁二钠
- D. 依地酸二钠钙
- E. 纳洛酮

【答案】 D

19、在哮喘治疗中能起到“节约类固醇”作用的药物是

- A. β
- B. 尼多酸钠
- C. 色苷酸钠

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

D. 抗胆碱能药物

E. 罗红霉素

【答案】 C

20、急性心肌梗死出现无脉性室性心动过速时，治疗首选

A. 普鲁卡因胺

B. 电复律

C. 索他洛尔

D. 利多卡因

E. 胺碘酮

【答案】 B

21、患者，女性，20岁。心慌、多汗，胃纳亢进伴消瘦2个月余就诊。体检：甲状腺Ⅱ度肿大，右上极可闻及血管杂音

A. TSH ↑

B. TSH ↓

C. TGAb、TPOAb ↑

D. 吸碘率正常

E. TRAb 阳性

【答案】 A

22、女性，60岁，近年常有尿频、尿急无尿痛，尿常规检查正常，可能的诊断是

A. 膀胱调节功能障碍

B. 膀胱肿瘤

百川东到海，何时复西归？少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府

C. 尿路结石伴感染

D. 肾下垂

E. 尿路梗阻

【答案】 A

23、建立人工通气的最好方法是

A. 人工呼吸，胸外心脏按压

B. 阿托品

C. 气管插管

D. 人工心脏起搏

E. 冰帽

【答案】 C

24、患儿 8 岁，反复发作性短暂意识丧失，动作中止。智力基本正常

A. 地西洋

B. 乙琥胺

C. 苯妥英钠

D. 丙戊酸钠

E. 卡马西平

【答案】 B

25、男性，60 岁，慢性咳嗽、咳痰 20 年，受凉后症状加重伴明显气短 1 周入院。血气分析示：pH7.30，PaCO

A. 肺不张

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

- B. 二氧化碳潴留加重
- C. 氧中毒
- D. 肺损伤
- E. 以上都不是

【答案】 B

26、关于右心室心肌病，下列说法错误的是

- A. 多数患者表现为右心衰竭
- B. 多数患者表现为全心衰竭
- C. 常发生室性心律失常
- D. 部分患者可无症状
- E. 可以引起猝死

【答案】 A

27、以下均是阻塞性肺气肿的诊断依据除了

- A. 在原有咳嗽、咳痰等症状的基础上出现了逐渐加重的呼吸困难
- B. 口唇发绀
- C. X 线胸片示两肺透亮度增加，横膈低平
- D. 两肺叩诊呈过清音，心浊音界缩小或不易叩出
- E. 有阻塞性通气功能障碍

【答案】 B

28、脑血栓形成最常见的病因是

- A. 心内栓子脱落

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

- B. 糖尿病
- C. 高血压
- D. 脑动脉粥样硬化
- E. 脑动脉炎

【答案】 D

29、男性，25岁，慢性哮喘，长期吸入激素，病情有显著改善。近2日天气变化后有发作，但症状不重

- A. 静脉输注甲泼尼松(甲基强的松龙)，雾化吸入 β
- B. 使用麻黄碱(麻黄素)
- C. 吸入异丙肾上腺素
- D. 口服泼尼松(强的松)，短期使用(1周)
- E. 口服茶碱控释片

【答案】 C

30、轻度急性氨基甲酸酯类农药中毒时，首选的解毒方法是

- A. 阿托品和氯解磷定联合使用
- B. 小剂量阿托品加对症治疗
- C. 使用氯解磷定加对症治疗
- D. 单独使用氯解磷定
- E. 单独大剂量使用阿托品，并达阿托品化

【答案】 B

31、治疗慢性粒细胞白血病

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

- A. VP 方案
- B. DA
- C. 口服别嘌呤醇
- D. 信号传导抑制剂
- E. 氟达拉滨

【答案】 D

32、溃疡性结肠炎

- A. 哨兵祥和结肠切割征
- B. 鸟嘴征
- C. 跳跃征
- D. 铅管征
- E. 鹅卵石征

【答案】 D

33、支气管哮喘与心源性哮喘一时难以鉴别时，可采用下列哪种药物治疗

- A. 呋塞米
- B. 吗啡或哌替啶
- C. 氨茶碱
- D. 西地兰
- E. 肾上腺素

【答案】 C

34、疟疾的典型热型为

臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

- A. 波状热
- B. 弛张热
- C. 间歇热
- D. 不规则热
- E. 稽留热

【答案】 C

35、男性，35岁，咳嗽、乏力3个月，查体：浅表淋巴结未触及。X线胸片：双肺斑片条索阴影，右肺上野2cm×2cm球形淡薄阴影，密度均匀，边缘欠清，痰涂片抗酸杆菌(++)。既往史：3年前因胃癌行胃大部切除术。本次发病予HERZ抗结核治疗3个月，复查X线胸片，双肺斑片阴影明显吸收，但右上球形阴影略有增大，体重减轻

- A. 肺结核，结核球
- B. 肺结核，周围型肺癌
- C. 肺结核，炎性假瘤
- D. 肺结核，真菌感染
- E. 肺结核，错构瘤

【答案】 B

36、霍乱早期死亡的主要原因

- A. 继发肺部严重感染
- B. 急性肺水肿
- C. 脑水肿
- D. 周围循环衰竭
- E. 急性肾功衰竭

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/175244000032012034>