

《医学影像学》选择题库附答案

医学影像学选择题库及答案

A型题:

- 1、女性生殖器结核最常见的是: ()
A.输卵管结核 B.子宫内膜结核 C.子宫颈结核
D.卵巢结核 E.结核性子宫内膜炎合并卵巢结核
- 2、在骨盆平片上, 子宫输卵管区域出现钙化影: ()
A.无价值 B.有定量定性价值 C.有一定价值
D.有定性价值 E.有定量价值
- 3、下列哪种检查方法常兼有治疗作用: ()
A.子宫输卵管碘油造影 B.盆腔充气造影 C.盆腔动脉造影
D.盆腔静脉造影 E.腹部平片
- 4、输卵管结核的X线表现中哪项描述不妥: ()
A.输卵管僵直呈锈铁丝状 B.管腔内干酪坏死显示不规则充盈缺损
C.壶腹部积水扩张呈桑椹状或腊肠状 D.多段性狭窄呈串珠状
E.输卵管边缘毛糙, 见细小壁龛或闭塞
- 5、X线片上有节育器但宫腔探查无节育器, 应考虑: ()
A.节育器过大 B.节育器过小 C.节育器变形
D.节育器入腹腔 E.节育器低位
- 6、关于乳腺纤维瘤的叙述中, 不正确的是: ()
A.好发于青年妇女 B.多位于乳腺外上象限 C.肿块边缘光滑,
密度均匀 D.压痛明显, 与月经周期有关
E.肿块边缘可出现细窄的透明晕
- 7、对泌尿系阳性结石, 应选何种检查为宜? ()
A.腹部平片 B.C T C.腹膜后充气造影
D.逆行肾盂造影 E.静脉肾盂造影
- 8、婴幼儿最常见的肾肿瘤是: ()
A.肾腺癌 B.肾盂乳头状瘤 C.肾胚胎瘤
D.神经母细胞瘤 E.肾盂乳头状癌

- 9、碘制造影剂可发生过敏反应，除哪项外均属于轻度反应：（ ）
- A.恶心、呕吐 B.气喘、呼吸困难 C.荨麻疹
D.头昏、头痛 E.面色潮红
- 10、体层摄影最常用于：（ ）
- A.骨骼 B.气管、支气管、肺 C.头颅
D.腹部 E.四肢及关节
- 11、正常人左肺一般由几个肺段组成：（ ）
- A.7个 B.8个 C.9个 D.10个 E.11个
- 12、用X线证实少量胸水时，以下哪种摄影方法最好？（ ）
- A.健侧向下侧卧后前位 B.健侧向下侧卧侧位
C.患侧向下侧卧侧位 D.患侧向下侧卧后前位
E.仰卧前后位
- 13、婴幼儿在胸片上见两肺沿肺纹理呈现小三角形或斑点状致密影和泡性小透亮区，首先应诊断：（ ）
- A.化脓性肺炎 B.支原体肺炎 C.病毒性肺炎
D.节段性肺炎 E.支气管肺炎
- 14、其中可见骨骼或牙齿阴影的纵隔肿瘤是：（ ）
- A.畸胎类肿瘤 B.神经源性肿瘤 C.支气管囊肿
D.食管囊肿 E.恶性淋巴瘤
- 15、摄小儿胸部X线片时，有如下情况，请您找出错误者：（ ）
- A.不能坐立的婴幼儿，不一定用立位摄影 B.呼气和吸气相摄片无明显差别
C.用大毫安、短时间 D.正常胸腺有时会与心脏增大混淆
E.正常也可见气管移位，如头颈的扭转
- 16、哪项是贲门痉挛的征象：（ ）
- A.食管下端不规则充盈缺损 B.食管下端狭窄，边缘呈锯齿状
C.食管下端狭窄，边缘光整，粘膜正常 D.食管下端狭窄，轮廓僵硬不能扩张
E.食管下端中断，钡剂无法下行
- 17、骨与关节X线摄片检查常规要求：（ ）
- A.正侧位摄片 B.双侧对照摄片 C.左右斜位摄片
D.正侧位摄片必要时双侧对照 E.正侧位片，包括周围软组织

及邻近一个关节

18、关节结核的关节面破坏首先发生在：（ ）

A.骨骺 B.干骺端 C.骨骺板 D.关节非持重部分，滑膜附着处 E.关节承重部位，穿过关节呈对称性

19、消化道常用造影剂是：（ ）

A、碘化油 B、泛影葡胺 C、优维显 D、硫酸钡 E、阿米培克 20、颅内肿瘤应尽早选用下列哪种检查？（ ）

A、透视 B、摄片 C、CT D、B超 E、脑血管造影

21、局限性阻塞性肺气肿最常见的病因是：（ ）

A、支气管哮喘 B、支气管扩张 C、慢性支气管炎 D、大叶性肺炎 E、支气管肺癌

22、膈肌升高的病人，当你发现肺底部横线条影时，首先考虑：（ ）

A、肺部炎症 B、肺纤维化 C、胸膜肥厚 D、肺水肿 E、盘状肺不张

23、下列胸部X线表现，哪项是婴儿肺结核最常见的表现？（ ） A、肺内浸润阴影和肺门淋巴结肿大 B、结核球

C、空洞和肺门淋巴结肿大 D、胸水 E、薄壁空洞

24、胸片上常不能看到的骨结构有：（ ）

A、锁骨 B、肋骨 C、肩胛骨 D、腰椎 E、胸椎

25、肺源性心脏病最常见的原因是：（ ）

A、慢性支气管炎、肺气肿 B、胸膜增厚粘连 C、肺结核 D、机化性肺炎 E、支气管扩张症

26、下述X线征象哪项是左心房增大的可靠指征？（ ）

A、食道受压移位 B、右心室漏斗部和肺动脉段凸起 C、鹿角征和 Kerley 氏线 D、双重阴影和双弧影 E、透视下相反搏动点上移

27、心包积液最常见的原因是：（ ）

A、化脓性 B、风湿性 C、结核性 D、出血性 E、类风湿性

28、三岁小儿，钡灌肠发现直肠局限性狭窄，近端肠管明显扩张，诊断应考虑为：（ ）

- A、先天性肛门闭锁 B、急性肠套叠 C、乙状结肠扭转
- D、直肠癌 E、先天性巨结肠

29、肠结核的好发部位是：（ ）

- A、十二指肠 B、空肠 C、回盲部 D、回肠末端
- E、直肠乙状结肠

30、先天性巨结肠作钡灌肠检查，下列哪一项是错误的？（ ）

- A、钡剂最好用等渗液配制 B、先用肥皂水作清洁灌肠
- C、肛管不宜插入过高 D、灌肠时钡剂量不宜过多
- E、检查完毕后抽出钡剂

31、下列哪项检查不属于特殊检查？（ ）

- A、透视 B、体层摄影 C、记波摄影 D、高千伏摄影
- E、荧光缩影

32、CT的优点是：（ ）

- A、密度分辨率高 B、空间分辨率高 C、密度分辨率低
- D、空间分辨率低 E、密度分辨率低而空间分辨率高

33、肺纹理主要是由哪些解剖结构构成的？（ ）

- A、支气管动、静脉 B、淋巴管 C、肺动、静脉
- D、支气管 E、支气管动、静脉和淋巴管

34、青年患者，右肺下叶背段见一薄壁空洞，应首先考虑：（ ）

- A、肺脓疡 B、肺结核 C、肺癌
- D、先天性肺囊肿 E、肺包虫囊肿

35、上叶大叶性肺炎吸收期与肺结核鉴别时，主要应结合：（ ）

- A、临床病史 B、血沉 C、白细胞计数和分类
- D、体征 E、其他实验室检查

36、下列哪一征象不支持纵隔肿瘤的诊断？（ ）

- A、透视下见肿块随呼吸上、下移动 B、肿块最大上下径在纵隔内
- C、肿块压迫气管 D、肿块边缘与纵隔交角呈钝角 E、肿瘤钙化

- 37、对纵隔肿瘤诊断价值最大的检查方法：（）
A、胸透 B、胸片 C、CT D、胸部正侧位 E、体层
- 38、能显示胃小区的方法是：（）
A、常规钡餐造影 B、脏壁造影 C、胃血管造影术
D、纤维胃镜检查 E、胃双重对比造影
- 39、一张良好的腹部平片上，正常不能显影的是：（）
A、肝脏 B、脾脏 C、肾脏 D、腰大肌 E、胰腺
- 40、食管下段管腔狭窄，扩张受限，粘膜破坏，有充盈缺损，应诊断为：（）
A、食道静脉曲张 B、食道内异物 C、食道平滑肌瘤
D、食道癌 E、食管良性狭窄
- 41、气管支气管异物常发生于：（）
A、左上叶 B、左下叶 C、左舌叶 D、右上叶 E、右下叶
- 42、支气管肺炎易发生于：（）
A、两肺上叶 B、两肺下叶 C、右肺中叶
D、两肺尖 E、左肺舌叶
- 43、大叶性肺炎实变期见于：（）
A、发病后1—6小时 B、发病后6—12小时 C、发病后即刻
D、发病2—3天后 E、发病后7—10天
- 44、肺癌易形成空洞的是：（）
A、腺癌 B、鳞癌 C、未分化癌 D、肺泡细胞癌
E、转移性肺癌
- 45、可出现爆米花样钙化的是：（）
A、肺癌 B、结核球 C、矽肺
D、胸膜间皮瘤 E、错构瘤
- 46、最常见的膈疝是（）
A、食管裂孔疝 B、胸肋三角区裂孔疝合并腰肋三角区裂孔疝
C、外伤性膈疝 D、胸腹膜裂孔疝 E、胸骨旁裂孔疝
- 47、下列哪种不是左向右分流的先天性心脏病：（）
A、房间隔缺损 B、室间隔缺损 C、动脉导管未闭

D、心内膜垫缺损 E、法鲁氏三联症

48、哪种先天性心脏病肺血减少：（）

A、房间隔缺损 B、室间隔缺损 C、动脉导管未闭

D、艾森曼格氏综合征 E、法鲁氏三联症

49、胃溃疡好发于：（）

A、胃大弯 B、胃底部 C、角切迹 D、胃窦部 E、胃体后壁

50、下列钡剂到达盲肠的时间，哪个说明小肠运动过慢：（）

A、2小时以上 B、3小时以上 C、4小时以上

D、5小时以上 E、6小时以上

51、形成正位肺门阴影最重要的解剖结构是（）

A、肺动脉 B、肺静脉 C、支气管 D、支气管动脉 E、淋巴组织

52、下述叙述中除哪项外均是右肺上叶不张的X线表现？（）

A、气管右移 B、右侧上部肋间隙变窄 C、右上肺门增大 D、横裂呈凹面向下的弧形 E、上叶呈折扇形密度增高

53、婴幼儿肺部炎症早期出现胸腔积液或液气胸，常提示以下何项感染？（） A、链球菌 B、肺炎双球菌 C、金黄色葡萄球菌

D、病毒 E、支原体

54、某男，45岁，体检发现左肺下叶有一小块阴影，直径约2.0cm，

密度不均，边缘模糊；体层片呈分叶状，边缘有短细毛刺，考虑为：（） A、肺结核球 B、周围型肺癌 C、错构瘤

D、球形肺炎 E、矽肺结节

55、某女士，30岁，照片发现右前上纵隔有一椭圆形阴影，其中有斑点状致密影，透

视下见块影可随吞咽动作上、下移动。首先考虑：（）

A、胸腺瘤 B、畸胎瘤 C、支气管囊肿

D、心包囊肿 E、胸内甲状腺

56、下述哪个病变可造成纵隔向患侧移位？（）

A、胸腔积液 B、气胸 C、一侧性肺气肿

D、广泛性胸膜肥厚 E、较大的肺肿瘤

57、子宫输卵管造影时，出现咳嗽，呼吸困难咯血及偏瘫或昏迷时，主要考虑为：（）

- A、碘过敏 B、迷走神经兴奋 C、碘油栓塞
- D、麻醉药物过敏 E、以上都不是

58、腰骶尾椎体表前面之位置，下列哪项是错误的？（）

- A、第一腰椎——剑突末端与肚脐连线中点
- B、第三腰椎——正对脐部 C、第五腰椎——脐下3cm
- D、第二骶椎——髂前上嵴连线中点
- E、尾骨与耻骨联合同一平面

59、关于造影剂的使用，哪项是错误的？（）

- A、胆影葡胺——胆道造影 B、泛影葡胺——尿路造影
- C、碘化油——心血管造影 D、医用硫酸钡——消化道造影
- E、空气——脑室造影

60、下列碘过敏试验方法哪项是错误的：（）

- A、皮下试验 B、眼结膜试验 C、舌下试验
- D、口服法试验 E、静脉注射法试验

61、肾结石的特征性形状是：（）

A、长条形 B、同心圆形 C、分层状 D、桑椹状 E、鹿角形 62、肾呈分叶状增大，

肾盂造影示肾盂肾盏弧形压迫、变狭、拉长、移位应诊断为：（）

- A、马蹄肾 B、肾囊肿 C、肾结核 D、肾盂癌
- E、肾胚胎瘤

63、关于多囊肾的叙述，哪项是错误的？（）

A、病变多为两侧性 B、病变多累及全肾 C、肾外形增大呈分叶状

D、肾盂肾盏常有侵蚀破坏 E、肾功能较差，静脉肾盂造影常不能显影

64、指出下列X线所见乳突类型哪型可有病理意义？（）

- A、气化型 B、硬化型 C、板障型
- D、混合型 E、板障型和混合型

- 65、儿童颅内压增高最主要的X线表现是：（）
A、颅缝分离 B、颅板变薄 C、脑回压迹增多
D、蝶鞍扩大 E、导静脉扩大
- 66、外伤性关节脱位最常见于：（）
A、肩关节 B、肘关节 C、髋关节 D、腕关节 E、膝关节
- 67、急性化脓性骨髓炎的病理变化特点是：（）
A、局部骨质疏松 B、以骨质破坏为主，周围伴骨质硬化
C、以骨质增生硬化为主 D、早期即有骨质破坏出现
E、以骨质破坏为主，一般没有明显骨质增生硬化
- 68、下列哪项不是脊椎结核的X线征象？（）
A、椎体破坏变形，相互嵌入 B、脊柱后凸畸形 C、脊柱呈“竹节状”外观
D、椎间隙变窄或消失 E、椎旁脓肿形成
- 69、下列哪个不是先天性髋关节脱位的X线征象？（）
A、患侧骨盆发育不良 B、沈通氏线不连续 C、股骨头位于伯肯氏方格的外上象限
D、髂颈线不连续 E、关节囊肿胀，股骨头破坏
- 70、正常成人血钙和血磷的乘积为：（）
A、20 B、30 C、40 D、50 E、60
- 71、关于骨质疏松的X线表现，下列哪项正确？（）
A、骨络变形 B、骨质破坏 C、骨小梁模糊
D、假性骨折线出现 E、骨密度减低
- 72、儿童化脓性骨髓炎不易进入关节腔的原因是：（）
A、儿童关节对化脓性炎症的抵抗力强
B、脓肿容易向软组织溃疡 C、骨骺板起屏障作用
D、关节囊对关节腔有保护作用 E、关节间隙比成人大
- 73、左前斜位心影后缘下部是哪个房室的投影？（）
A、右心房 B、右心室 C、肺动脉圆锥
D、左心房 E、左心室
- 74、肠套迭最常见的类型是：（）
A、小肠型 B、回盲型 C、回结肠型

- D、结肠型 E、复式套叠
- 75、胃肠道穿孔的主要 X 线征象是：（）
- A、胃泡增大，胃膈间距增大 B、膈下游离气体
C、麻痹性肠梗阻 D、肠管充气扩张 E、气液平出现
- 76、肺尖病变最好应摄：（）
- A、胸部后前位 B、胸部前后位 C、肺尖前凸位
D、肺尖后凸位 E、肺尖放大摄影
- 77、暗室与机房之间建筑防护厚度一般应大于 1.5mm 铅当量目的为：（）
- A、胶片防射线 B、胶片防可见光 C、胶片防潮
D、胶片防化学气体 E、胶片防热
- 78、下列防护物质中，最理想的防护物是：（）
- A、铁 B、铅 C、铜 D、铝 E、建筑材料
- 79、在操作 X 线机时，下列使用方法哪项是违章的？（）
- A、电源电压不超过规定电压正负 10% B、搁置时间长则经过训练后再使用
C、X 线管套表面温度不超过 50-60℃
D、曝光过程是可临时调动各调节旋钮 E、高压电缆使用时弯曲弧度直径不宜过小
- 80、疑消化道穿孔，观察膈下游离气体应摄：（）
- A、左侧卧水平投照 B、右侧卧水平投照 C、仰卧水平投照
D、仰卧后前位 E、站立后前位
- 81、增感屏与胶片接触不良时会导致：（）
- A、胶片上出现阴影 B、胶片上的黑色条纹 C、缩短显影时间
D、X 线照片影像模糊 E、以上都不是
- 82、观察儿童骨龄应摄：（）
- A、踝关节 B、腕关节 C、膝关节 D、肘关节 E、胸片
- 83、阳性肾结石与胆石平片鉴别应摄：（）
- A、腹部仰卧前后位 B、腹部侧卧前后位 C、腹部站立前后位
D、腹部站立后前位 E、腹部侧位
- 84、肾结核平片征象：（）
- A、肾影倒“八字”形 B、病侧“肾下垂” C、肾影不清

- 85、哪种类型的积液可出现外高内低的弧线？（）
A、游离性胸膜腔积液 B、包裹性胸膜腔积液
C、肺下积液 D、肺囊肿 E、肺脓肿
- 86、下列关于透视的叙述，哪项是错误的？（）
A、透视前医生要充分暗适应 B、电视透视要开启影像增强装置
C、病人要脱去外衣，取出衣袋内杂物 D、透视时应按一定顺序，照射野大小适当，受检部位贴近荧光屏或影像增强器 E、透视时脚开关不要断续
- 87、静脉尿路造影常用造影剂为：（）
A、硫酸钡 B、泛影葡胺 C、碘化油 D、阿米培克 E、泛影钠
- 88、哪一种为非离子型造影剂？（）
A、硫酸钡 B、泛影葡胺 C、碘化油 D、阿米培克 E、泛影钠
- 89、支气管造影常用造影剂为：（）
A、硫酸钡 B、泛影葡胺 C、碘化油 D、阿米培克 E、泛影钠
- 90、腹内实质性脏器病变宜先采用何种检查？（）
A、透视 B、摄片 C、CT D、B超 E、脑血管造影
- 91、早期妊娠只能用哪种检查诊断？（）
A、透视 B、摄片 C、CT D、B超 E、脑血管造影
- 92、下列哪项不是支气管造影检查的适应症？（）
A、支气管扩张——明确程度及范围 B、大咯血——找出出血原因
C、肺癌——了解支气管阻塞情况 D、支气管胸膜瘘——了解瘘道情况
E、肺不张——区别炎症或癌症性不张
- 93、在后前位胸片上哪一叶肺不张最易显示不清而漏诊？（）
A、左肺下叶 B、左肺上叶 C、右肺下叶 D、右肺中叶 E、右肺上叶
- 94、某女性患者，25岁，低热、乏力及微咳，有蛔虫病史。X线见左肺尖淡片状阴影，
经抗结核治疗一周该阴影消失，而在肺部其它部位又出现类似阴

你认为何种疾病可能性最大？（）

A、过敏性肺炎 B、肺结核 C、葡萄球菌性肺炎 D、支原体肺炎
E、霉菌性肺炎

95、一患者，肺外围有一圆形阴影，轮廓清楚、光整，直径约3.0cm，其中可见爆米花状钙化，

其余肺野清晰，无自觉症状。首先考虑：（）

A、结核球 B、错构瘤 C、炎性假瘤 D、球形肺炎 E、肺癌

96、X线诊断肺段隔离症的最有价值的方法是：（）

A、胸部后前片 B、支气管造影 C、主动脉造影 D、体层摄影
E、CT扫描

97、矽肺造成肺部的纤维化是：（）

A、稳定而无明显变化的弥漫性纤维化 B、时轻时重的纤维化 C、局限性纤维化

D、慢性进行性弥漫性纤维化 E、纤维化的吸收与肺实质的修复同时进行 98、指出哪项X线所见与疾病的组合是错误的？（）

A、病灶呈密度均匀一致阴影——大叶性肺炎 B、圆形、卵圆形，边缘清楚或模糊——肺癌

C、病灶呈大小一致、密度一致、分布一致——急性粟粒性肺结核

D、蜂窝状阴影——支气管扩张 E、沿肺纹理分布的串珠状阴影——矽肺 99、从下面所述并发于原发性肺癌的X线表现中，选出不恰当者：（）

A、空洞形成 B、肺不张 C、肺炎 D、肺气肿 E、肺门淋巴结钙化

100、哪一类肺癌易出现空洞？（）

A、鳞癌 B、腺癌 C、未分化癌 D、肺泡癌 E、转移性肿瘤

101、哪一类肺癌易出现分叶状边缘？（）

A、鳞癌 B、腺癌 C、未分化癌 D、肺泡癌 E、转移性肿瘤

102、下列哪种囊肿不在纵隔内？（）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/175322103120011322>