

主治医师（口腔修复学）-相关专业知识(A1/A2 型题 2)

1、X 线片显示髓腔消失，界限不清，甚至根管不清，则多是

- A. 髓腔钙化
- B. 髓腔根管钙化
- C. 髓石
- D. 投照条件不良所致
- E. 伪影

2、白斑的临床类型分为

- A. 寻常型、增殖型、落叶型、红斑型
- B. 光滑型、结节型
- C. 斑块状、颗粒状、皱纸状、疣状
- D. 皱纸状、海绵状、鳞片状
- E. 萎缩型、肥厚型

3、以下哪项疾病可引起口腔黏膜色素沉着

- A. 缺铁性贫血
- B. 血小板减少性紫癜
- C. 原发性慢性肾上腺皮质功能减退
- D. 维生素 C 缺乏症

E. 糖尿病

4、以下哪项不符合原发性慢性肾上腺皮质功能减退症的口腔表现

- A. 口腔黏膜色素沉着一般早于皮肤
- B. 常发生在唇红、颊、牙龈、舌缘和舌尖等部位
- C. 色泽为蓝黑色或暗棕色
- D. 形状为斑块、斑点或斑纹
- E. 色素沉着区有烧灼感

5、维生素 B 缺乏症的口腔表征为

- A. 常为该病的早期损害，表现为口角炎、唇炎和舌炎
- B. 早期舌尖、舌缘充血发红，菌状乳头红肿。其后全舌、口腔黏膜咽部发红，有热痛感，可发生表浅溃疡
- C. 牙龈炎、牙龈出血是早期出现的突出表现
- D. 口腔黏膜苍白色，以唇、舌、龈明显
- E. 口腔黏膜和咽喉出现坏死性溃疡

6、使用固定矫治器后，牙齿的唇面发现的不规则白色斑块，其病理表现不会出现的结构是

- A. 透明层
- B. 暗层
- C. 病损体部

D. 表层

E. 细菌侵入层

7、使用固定矫治器的治疗过程中或拆除矫治器后可能会在牙齿的唇（颊）侧牙面上发现形态不规则的白垩色斑块，这种斑块是

A. 釉质脱钙

B. 白色斑块

C. 正畸粘结剂的残留

D. 再矿化斑块

E. 继发龋

8、MTM 改善前牙区美观及咬合可实现

A. 纠正重度前牙反

B. 关闭前牙间隙

C. 牙弓间隙足够时，纠正前牙扭转、错位

D. 纠正牙及牙槽性前牙反

E. 除 A 外皆可

9、MTM 的矫治特点是

A. 移动牙齿的数量及范围小

B. 设计简单，需要患者积极配合

C. 应用轻力及间断力

D. 改正不良习惯，需及时保持及调

E. 以上皆是

10、修复前正畸治疗主要包括

A. 开拓失牙间隙，调整牙齿位置

B. 竖直倾斜基牙，集中间隙修复缺牙

C. 压入伸长的对颌牙

D. 改善前牙深覆

E. 以上皆是

11、TMD 患者矫治中应注意的问题

A. 出现新的干扰

B. 后牙区错未矫正

C. 咬合功能未恢复

D. 施力不当

E. 以上皆是

12、TMD 患者正畸治疗的原则不包括

A. 强调不良咬合因素的去

B. 注重咬合运动的协调和稳定

C. 选择轻力及间歇力

D. 避免关节进一步的损伤

E. 使用下颌为支抗的口外力

13、以下哪项不属于 TMD 患者选择正畸治疗的适应证

A. 有致病因素障碍

B. 关节有不可逆的器质性损害

C. 对已有关节结构紊乱及关节盘附着松弛的错患者，应视情况而定

D. 早期关节盘可复性移位者

E. 早期关节盘不可复性移位者

14、牙周病患者正畸治疗后的保持与一般正畸患者有何不同

A. 没什么不同

B. 多需要长期保持

C. 允许有较多牙移动

D. 吃饭时不必戴用

E. 可采用正位器作牙列最后精细调整移动的保持法

15、某男性患者，29 岁，因上颌前部根尖部唇侧反复肿胀伴流脓性分泌物半年到我院就诊，临床检查示叩痛，松动(+)，牙体颜色正常，牙髓活力检查无明显反应。为了明确诊断，最佳的影像检查方法是

A. 曲面体层片

B. 超声检查

C. 根尖片

D. 翼片

E. CT 检查

16、X 线片示根尖有一约 $0.5\text{cm} \times 0.5\text{cm}$ 卵圆形透明区，边界清楚但不光滑，最可能的诊断为

A. 根尖周囊肿

B. 根尖周脓肿

C. 根尖周肉芽肿

D. 根尖周炎

E. 根尖骨质吸收

17、X 线片示根尖部有约豌豆大的圆形透射影，边界清楚、光滑，有骨白线围绕，中心密度均匀，最可能的诊断为

A. 根尖周囊肿

B. 根尖周脓肿

C. 根尖周肉芽肿

D. 根尖骨质疏松

E. 以上都不是

18、X 线牙片上牙齿邻面颈部所呈现的三角形透明区是

A. 邻面龋

B. 正常牙颈部

- C. 牙槽嵴吸收
- D. 牙颈部脱钙
- E. 投照角度不正确所致

19、X线片上正常牙槽骨骨纹排列

- A. 均呈网状
- B. 均呈放射状
- C. 上颌呈水平状，下颌呈网状
- D. 均呈水平状
- E. 上颌呈颗粒状，下颌牙间呈水平状根尖部呈放射状

20、作瘻管造影时应用下列哪种造影剂

- A. 30%泛影葡胺
- B. 10%碘油
- C. 40%碘油
- D. 60%碘水
- E. 以上皆不是

21、翼片对下列哪项检查较适宜

- A. 观察多发性早期邻面龋
- B. 观察咬合创伤的程度
- C. 观察牙周间隙的大小

D. 观察窝沟部深龋是否达到髓腔

E. 以上皆适宜

22、以下对颞下颌关节上腔造影正常图像的描述，不正确的是

A. 开口位前上隐窝造影剂基本消失

B. 开口位前上隐窝造影剂仍存留

C. 关节上腔呈” S” 形

D. 中段造影剂较窄

E. 关节盘后带位于髁突横嵴之上

23、大的邻牙间隙(blackspace)可以通过以下哪种方法矫治

A. 直接固定矫治器关闭间隙

B. 邻面去釉后关闭间隙

C. 调节相邻牙轴倾度

D. 正位器

E. 活动矫治器

24、成人辅助性治疗在开拓失牙间隙后如采用种植修复，应在去除矫治器后何时进行修复

A. 保持半年

B. 保持 1 年

C. 保持 1~3 个月

D. 即刻种植

E. 保持 4 周

25、综合性正畸治疗是指

A. 通过牙齿移动，为其他牙病的控制和恢复口腔功能的治疗提供更为有利的条件

B. 对非骨性或者仅有轻度骨性错畸形的健康成年人牙列进行的全面的正畸治疗

C. 对成年人严重发育性或外伤性骨性牙颌面畸形，采用外科与正畸联合治疗的方法对其进行矫治

D. 维持正常牙弓长度的保障、助萌、阻萌，维护正常口腔建环境，去除干扰，矫正异常的唇、舌系带，以及刺激牙颌发育的咀嚼训练等

E. 破除各种口腔的不良习惯、治疗早期错，以重建正常的发育

26、成人颞下颌关节紊乱病正畸诊断和治疗的原则是

A. 正畸治疗的 TMD 患者主要是由于异常造成的，正畸治疗应尽量改善干扰

B. TMD 的常见症状主要是疼痛、下颌异常及弹响，正畸治疗主要针对 TMD 症状

C. TMD 患者应少用板以避免颌间距升高

D. TMD 患者矫治可注重前牙的美观而忽视后牙的关系

E. TMD 患者可用再定位板以增加颌间距，减缓关节内压

27、成人颞下颌关节紊乱病正畸治疗中应注意的问题是

- A. 正畸治疗的 TMD 患者主要是由于的异常造成的，正畸治疗应尽量改善干扰
- B. TMD 的常见症状主要是疼痛、下颌异常及弹响，正畸治疗主要针对 TMD 症状
- C. TMD 患者应少用板以避免颌间距升高
- D. TMD 患者矫治可注重前牙的美观而忽视后牙的关系
- E. TMD 患者可用再定位板以增加颌间距，减缓关节内压

28、某男性患者，69 岁，诉左上后牙冷热刺激酸痛 1 个月，检查：14、15 未见龋，牙槽骨吸收至根中 1/3，根分叉暴露，探诊牙龈出血，叩(+)，松动 II 度，冷刺激与对照牙比较酸痛，持续。最可能的诊断是

- A. 急性牙髓炎
- B. 慢性牙髓炎
- C. 逆行性牙髓炎
- D. 急性根尖周炎
- E. 慢性根尖周炎

29、某男患儿，7 岁，自述左上后牙松动，咬合不适，影响进食。口内检查，左上第二乳磨牙近中龋损，探无不适，叩诊(-)，牙龈正常，

松动III度。左上第一恒磨牙远中颊尖已萌，近中未萌。由以上条件可见，左上第二乳磨牙松动的主要原因是

- A. 外伤
- B. 牙周病
- C. 根尖周炎
- D. 替牙期正常松动
- E. 左上第一恒磨牙异位萌出

30、某男患儿，8岁，2小时前骑自行车摔倒，自诉上前牙与地面碰撞，无晕厥史。检查见左上唇有少量擦伤，双侧上中切牙均未完全萌出，其中左上中切牙萌出相对较多。双侧上中切牙无松动，牙龈无异常，叩诊左上中切牙音高，右上中切牙音低沉。仅从以上条件最有可能的诊断是

- A. 左上中切牙嵌入
- B. 右上中切牙嵌入
- C. 左上中切牙部分脱位
- D. 右上中切牙部分脱位
- E. 双侧上中切牙部分脱位

31、不属于牙周病流行影响因素的是

- A. 口腔卫生
- B. 营养

- C. 吸烟
- D. 饮酒
- E. 系统性疾病

32、先天性牙缺失的影响主要表现为

- A. 影响邻牙的位置
- B. 影响牙弓形态
- C. 上、下牙弓不协调
- D. 牙弓出现间隙
- E. 以上都有可能

33、成人正畸的内容不包括

- A. 综合性正畸治疗
- B. 小范围牙移动
- C. 辅助性正畸
- D. 外科正畸联合治疗
- E. 功能矫形治疗

34、以下哪种正畸治疗不是成人辅助性正畸治疗

- A. 修复前的小范围牙移动
- B. 牙列中的开展失牙间隙
- C. 改善前牙深覆以利于修复治疗

- D. 前牙打开咬合改正前牙深覆
- E. 压低伸长的对颌牙为修复治疗创造条件

35、颞下颌关节紊乱病正畸治疗的目的是

- A. 正畸治疗强调美观而不用注重咬合功能的接触和稳定
- B. 对于下颌前导的患者，前牙可以有双重咬合
- C. 不应使用过大的口外力以免导致下颌的后退、关节的压迫
- D. 矫治力应选用重力和持续力
- E. 矫治注重 TMD 的症状而不是造成症状的因素

36、牙周病正畸治疗的方法

- A. 牙周病的治疗多用口外弓增加支抗，关闭前牙间隙
- B. 对牙槽骨吸收的患者，常减少冠根比以利于正畸治疗牙槽骨改建
- C. 牙周病的正畸治疗应矫正每个位置不正的错位牙
- D. 牙周病正畸治疗后常选用正位器作为保持器
- E. 牙周病的正畸治疗少用片段弓技术

37、牙周病的正畸治疗特点是

- A. 强调对称拔牙，治疗疗程短
- B. 正畸治疗少用平面导板，可多用弹性橡皮圈关闭间隙
- C. 牙周组织的牵张力应稍大，以便诱导牙周组织增生
- D. 正畸治疗应多用金属结扎丝，以减少菌斑的堆积

E. 正畸治疗不需口腔多学科的配合

38、成人正畸的目标是

- A. 达到理想的牙合关系
- B. 追求前牙的美观而不是健康的牙合关系
- C. 达到个体化的最佳牙合关系
- D. 统一的，不用考虑个体的具体需要
- E. 更多强调美观

39、术前正畸的目的不包括

- A. 排齐牙列
- B. 整平牙弓
- C. 解除后牙反
- D. 消除胎干扰
- E. 通过增大患者的代偿功能以简化手术，降低手术风险

40、外科正畸术后复发的原因是

- A. 咀嚼肌和舌骨上肌群的牵拉
- B. 手术中髁突的移位
- C. 下颌的逆时针旋转
- D. 下颌骨近远心骨段位置的旋转
- E. 以上都是

41、唇腭裂的治疗顺序是

- A. 早期骨移植，整形腭护板，唇裂修补术，腭裂修补术，语音训练
- B. 整形腭护板，唇裂修补术，早期骨移植，腭裂修补术，语音训练
- C. 唇裂修补术，整形腭护板，早期骨移植，腭裂修补术，语音训练
- D. 整形腭护板，唇裂修补术，语音训练，腭裂修补术，早期骨移植
- E. 唇裂修补术，整形腭护板，语音训练，早期骨移植，腭裂修补术

42、患者晨起发现刷牙时右侧口角漏水，照镜发现右侧口角下垂、眼睑闭合不全。就诊后查体，右侧口腔颊、舌及口底黏膜较对侧干燥、无光泽；右侧舌前 2/3 味觉较对侧迟钝；听力较对侧差；Schirmer 试验发现右侧泪液分泌少于对侧。该患者面神经损害的部位可能在

- A. 茎乳孔以外
- B. 鼓索与镫骨肌神经节之间
- C. 膝状神经节
- D. 膝状神经节以上
- E. 镫骨肌神经节与膝状神经节之间

43、贝尔面瘫患者发病仅 1 天，目前其最佳治疗应为

- A. 大剂量糖皮质激素+阿司匹林
- B. 大剂量糖皮质激素+阿司匹林+营养神经药物（维生素 B₁、B₁₂）
- C. 大剂量糖皮质激素+阿司匹林+营养神经药物（维生素 B₁、B₁₂）+保护

眼睛

D. 大剂量糖皮质激素+阿司匹林+营养神经药物（维生素 B₁、B₁₂）+保护眼睛+强针刺治疗

E. 大剂量糖皮质激素+阿司匹林+营养神经药物（维生素 B₁、B₁₂）+保护眼睛+立即面神经管减压术

44、三叉神经痛的特点为

A. 阵发性持续性疼痛，夜间加重

B. 阵发性疼痛，白天多发疼痛一般与咀嚼和张闭口运动有关

C. 阵发性疼痛，冷热刺激诱发骤然发生的阵发性电击样剧烈疼痛

D. 持续性疼痛，咀嚼和张闭口运动加重临床上常有先兆期和头痛期

E. 持续性疼痛，吞咽加剧每次发作持续数小时三叉神经某分布支区域内，骤然发生闪电式的极为剧烈的疼痛，通常白天发作，与冷热刺激无关。

45、支配面部表情运动的主要脑神经是

A. 舌神经

B. 舌咽神经

C. 面神经

D. 三叉神经

E. 迷走神经

46、支配口腔颌面部感觉的主要脑神经是

- A. 舌下神经
- B. 舌咽神经
- C. 面神经
- D. 三叉神经
- E. 迷走神经

47、正畸矫正深覆的方法不包括

- A. 平面导板
- B. 摇椅形弓丝配合 II 类牵引
- C. 多用途弓压低前牙
- D. J 形钩高位牵引或微种植体压低上下前牙
- E. 后牙高嵌体

48、使不锈钢正畸弓丝变硬的方法是

- A. 回火
- B. 冷加工硬化
- C. 老化变硬
- D. 沉积变硬
- E. 以上均不可以

49、咬下唇不良习惯可导致以下错畸形的种类是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/176002144212010230>