1、在硫测定中，用差减法测定的是（ ）

A.全硫

B.有机硫

C.硫酸盐硫

D.硫化铁硫

2、 少量氯化物对人体是没有毒害作用的，药典规定检查氯化物杂质主要是因为它（ ）

A.影响药物的测定的准确度

B.影响药物的测定的选择性

C.影响药物的测定的灵敏度

D.影响药物的纯度水平

E.以上都不对。

3、砷盐检查法中，在检砷装置导气管中塞入醋酸铅棉花的作用是（ ）

A.吸收砷化氢

B.吸收溴化氢

C.吸收硫化氢

D.吸收氯化氢

4、硫喷妥钠与铜盐的鉴别反应生成物为（ ）

A.紫色

B.绿色

C.蓝色

D.黄色

E.紫茧色

5、饮料作霉菌及酵母菌分离时，首选（ ）培养基。

A.高盐察氏

B.马铃薯

C.孟加拉红

D.马铃薯葡萄糖琼脂

6、Na 、Mg 、Al 、Si 、P 、S 、Cl 这七种元素，其非金属性自左到右（ ）。

A.金属性逐渐减弱

B.逐渐减弱

C.逐渐增强

D.无法判断

7、重复灼烧至前后两产欠称量结果相差不超过（ ）mg 为恒重。

A.0.1

B.0.2

C.0.5

D.1.0

8、健康马的白细胞数为（ ）

A.6～7×109/L

B.7～8×109/L

C.8～9×109/L

D.9～10×109/L

9、原子吸收光谱法测定配合饲料中微量元素铁、铜、锰、锌的含量时，用干法灰化样品，适用于( )。

A.所有的动物饲料

B.部分矿物原料

C.水

D.磷酸氢钙

10、需检查对氨基酚的药物是( )

A.氢化可的松

B.异烟肼

C.头孢他啶

D.阿司匹林

E.对乙酰氨基酚

11、实验室钾、钠活泼金属因剧烈反应而引起的失火只能用（ ）灭火。

A.砂土覆盖

B.泡沫灭火器

C.干粉灭火器

D.CO_2 灭火器

12、测定时应用酸碱滴定的是( )。

A.测油脂皂化价

B.莫尔法测定盐分

C.钙的测定

D.都不是

13、测定脲酶活性时，对样品粉碎细度的要求为(　)

A.200μm

B.180μm

C.160μm

D.250μm

14、测定粘稠饲料试样中水分和其他挥发性物质含量，下列说法不正确的是（ ）。

A.称量瓶内放一薄层砂和一根玻璃棒

B.将称量瓶及内容物质和盖一并放入的干燥箱内干燥

C.称取 10g 试样于称量瓶，准确至 0.1g

D.用玻璃棒将试样与砂充分混合，玻璃棒留在称量瓶中

15、当把可疑颗粒夹入烧杯后，应接着做（ ）。

A.做定性试验

B.放在显微镜下确认可疑颗粒是否在烧杯内

C.向烧杯内加水

D.用表面皿将烧杯口盖好

16、健康猪的白细胞数为（ ）。

A.10～11×109/L

B.11～12×109/L

C.13～14×109/L

D.15～16×109/L

17、酶联免疫吸附法测定饲料中黄曲霉毒素 B1,酶标测定仪在 450nm 处测定(　　)。

A.吸收光谱

B.吸光度

C.旋光度

D.溶解度

18、魏氏血沉管管壁上有多少个刻度（ ）。

A.20

B.200

C.50

D.500

19、测定粗蛋白的指示剂( )

A.甲基红—溴甲酚绿指示剂

B.甲基橙—溴甲酚绿钠盐指示剂

C.中性红—次甲基蓝指示剂

D.甲基红—溴甲酚绿钠盐指示剂

20、肉毒中毒的临床症状基本上都属于（ ）表现。

A.神经麻痹

B.急性胃肠炎

C.脑膜炎

D.轻度胃肠炎

21、吩噻嗪类药物易被氧化，这是因为其结构中具有( )

A.低价态的硫元素

B.环上 N 原子

C.侧链脂肪胺

D.侧链上的卤素原子

22、下列维生素属于水溶性维生素的是(　)

A.维生物 A

B.维生物 E

C.维生物 C

D.维生物 D

23、比色法测总磷的过程中用作配置磷标准液的试剂是（ ）

A.领苯二甲酸氢钾

B.磷酸氢二钾

C.磷酸钾

D.磷酸二氢钾

24、中国药典中硫酸亚铁片的含量测定方法是( )

A.铈量法

B.硝酸法

C.高氯酸法

D.高锰酸钾法

25、粗脂肪中除真脂肪外，还含有其他溶于（ ）的有机物质。

A.乙醚

B.石油醚

C.乙醇

D.四氯化碳

26、GC 法测定糕点中丙酸钙是使用的测量器是(　)。

A.TCD

B.FID

C.ECD

D.FDP

27、核左移是指(　)增多。

A.嗜中性白细胞

B.分叶型嗜中性白细胞

C.幼稚型和杆状型嗜中性白细胞

28、水溶性氯化物测定方法中，配制总离子强度缓冲液所需要的硝酸浓度为(　)。

A.0.01mol/L

B.0.1mol/L

C.1mol/L

D.3mol/L

29、( )能精确地反应测定数据之间的离散性。

A.相对偏差

B.标准偏差

C.相对误差

D.绝对误差

30、酚红法测定大豆制品中尿素酶活性，当溶液在(　)min 内呈粉红色表示尿素酶活性很强;( )min 内呈粉红色表示尿素酶活性强;( )min 内呈粉红色表示有点尿素酶活性;( )min 内呈粉红色表示没有尿素酶活性。

A.2,2~10、10~30,30~60

B.1,1~10,10~15,15~30

C.2,2~5,5~20,26~60

D.1,1~5,5~10,15~30

31、冷原子吸收光谱法测定饲料中汞含量，空白试验为( )。

A.水

B.砷标准溶液

C.硝酸、硫酸混合液

D.没有特殊要求

32、煤的挥发分测量的温度和时间条件分别为（ ）。

A.(815±10)℃，40min

B.(815±10)℃，7min

C.(775±25)℃，7min

D.(900±10)℃，7min

33、在啤酒发酵过程中，(）约 96%发酵为乙醇和二氧化碳，2.5%生成其它发酵副产物，

1.5%合成新酵母细胞。

A.可发酵糖

B.麦汁中含氮物质

C.麦汁中的氨基酸

D.麦汁中嘌呤和嘧啶

34、在测定油脂的酸价时所使用的指示剂为（ ）。

A.5

B.10

C.100

D.1000

35、烟煤胶质层指数的测定中，煤杯在多长时间内升温至 250℃（ ）

A.20min

B.30min

C.25min

D.10min

36、病猪剖检，发现肠的回盲口处有扣状肿胀、溃疡，应怀疑为(　)。

A.猪肺疫

B.猪丹毒

C.猪瘟

37、滤纸是(　)方法测定饲料中的 CA 所必需的。

A.高锰酸钾法

B.EDTA 法

C.高氯酸法

D.高锰酸钾法和 EDTA 法

38、若变量 x、y，存在严格的线性关系，则相关系数（ ）。

A.等于 1

B.等于-1

C.少于 1

D.无法确定

39、标定盐酸标准溶液终点的颜色()。

A.由绿色变为暗红色

B.由黄色变为暗红色

C.由绿色变为黄色

D.由绿色变为紫色

40、混合过程实际上是由对流、扩散、剪切等混合作用与分离作用并存的一个过程，机型、（ ）、操作、静电都会影响混合的质量。

A.混合组分的化学特性

B.混合组分的物理特性

C.混合组分的营养含量

D.混合组分的含水量

41、荧光分光光度法测定饲料中维生素 B1，饲料中维生素 B1 在碱性条件下被(　　)生成荧光色素-硫色素，硫色素在正丁醇中的荧光强度与试样中维生素 B1 的含量呈正比，并依次进行定量测定。

A.高锰酸钾氧化

B.碘化钾氧化

C.铁氰化钾氧化

D.硫酸亚铁氧化

42、下面均需称量的物品，适宜用差减称量法的是（ ）。

A.称量瓶的重量

B.用纯金属铜，配制准确浓度的溶液

C.称 0.1g 酚酞，配制指示剂用

D.称取 4 份 NaCl，标定 AgNO3 溶液

43、《中国药典》采用高效液相色谱法测定含量的药物是（ ）

A.地西泮

B.硝苯地平

C.盐酸氯丙嗪注射液

D.左氧氟沙星

44、煤挥发分产率的测定实验中,煤样在马弗炉中隔绝空气加热几分钟（ ）

A.5min

B.7min

C.10min

D.15min

45、在甾体激素类药物杂质检查中，应重点检查的特殊杂质是（ ）

A.其他甾体

B.游离磷酸盐

C.甲醇和丙酮

D.乙炔基

46、以下不属于仪器设备技术资料的是( )

A.仪器验收单

B.仪器说明书

C.检验报告副本

D.维修报告

47、当饱和蒸汽在过热器中被加热成过热蒸汽时，所含的小水滴会被()至蒸干，水滴中的某些物质将以结晶析出，当结晶量较多时形成积盐。

A.蒸发

B.浓缩

C.挥发

D.蒸发、浓缩

48、在测定饲料粗蛋白的过程中，试样要消煮成( )的蓝绿色

A.半透明

B.不透明

C.混浊

D.透明

49、在碘量法中通常是利用（ ）作指示剂。

A.淀粉

B.铬黑 T

C.甲基橙

D.KMnO4

50、在砷的硼氢化物还原光度法测定中，硼氢化钾片由硼氢化钾和氯化钠组成，其比例为( )。

A.1：3

B.2：3

C.1：5

D.2：5

51、在试液的平衡电位测定完成后，我们是根据（ ）得出试液的氟离子浓度。

A.曲线方程

B.斯特方程

C.马赫方程

D.能斯特方程

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/176004030155010055