

[整理]肛肠科护理研究生出科理论考试试题

1.临床最多见的直肠肛管周围脓肿是（） [单选题] *

A.肛周皮下脓肿(正确答案)

B.坐骨肛管间隙脓肿

C.骨盆直肠间隙脓肿

D.直肠后间隙脓肿

E.直肠黏膜下脓肿

2.肛裂病人最突出的临床表现是（） [单选题] *

A.排便时及排便后肛门剧烈疼痛(正确答案)

B.反复便秘

C.便血

D.肛门瘙痒

E.反复脓肿形成

3.混合痔是指（） [单选题] *

A.同时存在内痔和外痔

B.两个以上内痔

C.两个以上外痔

D.齿状线上、下静脉丛互相吻合而成(正确答案)

E.痔与肛裂同时存在

4.肛裂"三联症"是指同时存在（） [单选题] *

A.肛裂、"前哨痔"及肛乳头肥大(正确答案)

B.肛裂、肛瘘、痔

C.肛裂、直肠肛管周围脓肿、肛痿

5.骨盆直肠间隙脓肿的诊断最主要的检查方法是（） [单选题] *

A.直肠指检

B.穿刺抽脓(正确答案)

C.B超

D.内镜检查

E.碘油造影

6.静脉丛切除术的适应症是（） [单选题] *

A.内痔

B.血栓外痔

C.静脉曲张性外痔(正确答案)

D.混合痔的内痔部

7.以下不属于肛痿病人临床特点的是（） [单选题] *

A.反复形成脓肿

B.肛门瘙痒

C.排便后肛门剧烈疼痛(正确答案)

D.肛周外口时有分泌物排出

E.红色乳头状突起外口

8.关于血栓性外痔的说法错误的是（） [单选题] *

A.48小时内肛门疼痛最为剧烈

B.腹内压增高时可加剧疼痛

C.疼痛一般不能自行缓解

D.肛门表面可见红色或暗红色硬结

E.先行热敷，再行手术治疗(正确答案)

9.痔切除术后第一天，应密切观察（） [单选题] *

A.伤口出血(正确答案)

B.排便情况

C.排尿情况

D.肛门疼痛

E.肠蠕动恢复

10.适用于肛门手术的体位（） [单选题] *

A.蹲位

B.截石位(正确答案)

C.左侧卧位

D.膝胸位

E.右侧卧位

11.适用于检查直肠脱垂的体位（） [单选题] *

A.蹲位(正确答案)

B.截石位

C.左侧卧位

D.膝胸位

12.检查肛管直肠疾病最常用的卧位是（） [单选题] *

A.左侧卧位

B.膝胸卧位(正确答案)

C.截石位

D.右侧卧位

E.蹲位

13.热水坐浴的禁忌证是（） [单选题] *

A.肛门部充血

B.外阴部炎症

C.痔疮手术后

D.肛门周围感染

E.妊娠后期痔疮疼痛(正确答案)

14.内痔患者护理中，与预防便秘的措施无关的是（） [单选题] *

A.每天坚持适当活动

B.多饮水、多吃蔬菜

C.忌酒和辛辣食物

D.养成每天定时排便的习惯

E.坚持每晚肛门坐浴(正确答案)

15.对年老体弱的患者，直肠肛管检查时最好采用（） [单选题] *

A.膝胸卧位

B.截石位

C.左侧卧位(正确答案)

D.蹲位

E.折刀位

16.与肛管术后尿潴留无关的是（） [单选题] *

A.麻醉作用

B.局部伤口疼痛

C.不习惯卧床排尿

D.肛管内填敷料

E.伤口出血(正确答案)

17.直肠肛管术后护理不正确的是 () [单选题] *

A.便后高锰酸钾溶液坐浴

B.术后 1~2 天内应适当给予止痛剂

C.粪便干结可服液状石蜡

D.术后排尿困难可热敷、按摩膀胱

E.术后早期腹胀时可行肛管排气(正确答案)

18.以下有明显全身中毒症状的是 () [单选题] *

A.肛瘘

B.炎性外痔

C.肛旁皮下脓肿

D.骨盆直肠窝脓肿(正确答案)

E.坐骨直肠窝脓肿

19.腰椎穿刺后，患者应去枕平卧的时间为 () [单选题] *

A.1~2 小时

B.3~4 小时

C.4~6 小时(正确答案)

D.10~12 小时

E.24 小时

20.门静脉高压症可引起哪种肛门疾病 () [单选题] *

A.肛裂

B.肛瘘

C.直肠脱垂

D.痔(正确答案)

E.直肠息肉

21.肛门坐浴的作用, 错误的是 () [单选题] *

A.缓解肛门括约肌痉挛

B.减轻伤口疼痛

C.保持肛门清洁

D.有利于伤口引流

E.防止伤口出血(正确答案)

22.直肠癌的早期表现是 () [单选题] *

A.排便习惯改变

B.黏液血便;排便困难(正确答案)

C.便条变细

D.腹痛、腹胀、便秘

E.肠梗阻症状;全身中毒症状

23.内痔的便血特点是 () [单选题] *

A.粪便中带血

B.无痛性间歇性便后出鲜血(正确答案)

C.便后便血伴疼痛

D.黏液血便

E.便后便血伴里急后重

24.肛管疾病手术后护理, 错误的是 () [单选题] *

A.进少渣饮食

- B.不限制排便
- C.一周内不灌肠(正确答案)
- D.排便后换药, 再坐浴
- E.必要时扩张肛门

25.不常用的直肠肛管检查体位是 () [单选题] *

- A.弯腰前卧位
- B.截石位
- C.蹲位
- D.右侧卧位(正确答案)
- E.膝卧位

26.哪种疾病不宜作肛门指诊 () [单选题] *

- A.内痔
- B.肛裂(正确答案)
- C.直肠癌
- D.肛瘘
- E.直肠息肉

27.关于痔的治疗, 哪项是错误的 () [单选题] *

- A.单纯内痔可用注射疗法
- B.二期内痔可用单纯结扎法治疗
- C.嵌顿内痔可先做湿敷再复位
- D.环状内痔可行环形切除术
- E.外痔可用枯痔钉疗法(正确答案)

28.大便出血的患者最重要的检查是 () [单选题] *

- A.大便隐血试验
- B.纤维结肠镜检查
- C.直肠指诊(正确答案)
- D.癌胚抗检查
- E.钡灌肠检查

29.不会发生癌变的直肠息肉是（） [单选题] *

- A.管状腺瘤
- B.绒毛状腺瘤
- C.混合性息肉
- D.幼年型息肉(正确答案)
- E.家族性腺瘤性息肉

30.直肠粘膜呈现 8~10 个隆起的纵行皱襞称为（） [单选题] *

- A.肛环
- B.肛柱(正确答案)
- C.肛瓣
- D.肛窦
- E.肛乳头

31.引起肛瘘的最常见原因是（） [单选题] *

- A.肛管直肠周围脓肿(正确答案)
- B.内痔
- C.结核
- D.肛裂
- E.肠道炎性疾病

32.直肠长度大约为（C） [单选题] *

4~8cm(正确答案)

8~12cm

12~15cm

8~15cm

16~20cm

33.直肠癌的主要的转移途径是 () [单选题] *

A.种植转移

B.淋巴转移(正确答案)

C.血行转移

D.直接浸润

E.以上都不对

34.直肠癌早期症状是 () [单选题] *

A.脓血便

B.粘液血便

C.大便变细

D.排便困难

E.大便习惯和性状改变(正确答案)

35.直肠癌根治性手术能否保留肛门取决于 () [单选题] *

A.癌瘤的大小

B.癌瘤侵犯范围

C.癌瘤有无转移

D.癌瘤距肛门距离(正确答案)

E.乙状结肠的长短

36.早起发现直肠癌最重要的检查方法是 () [单选题] *

A.直肠指检(正确答案)

B.内窥镜检查

C.X线钡剂灌肠

D.便常规检查

E.CEA测定

37.确诊直肠癌最可靠的办法是 () [单选题] *

A.直肠指诊

B.便常规检查

C.大便脱落细胞学检查

D.活体组织病理学检查(正确答案)

E.气钡直肠造影检查

38.肛瘘内口大多数位于 () [单选题] *

A.肛窦内(正确答案)

B.直肠瓣处

C.肛提肌处

D.肛管

E.肛门缘

39.肛瘘手术中,最重要的是 () [单选题] *

A.麻醉充分

B.肛管括约肌松弛

C.找出外口

D.明确瘘管与括约肌关系(正确答案)

E.手术后呈“V”型创面

40.女性，39岁，半年前因肛旁脓肿切开引流，之后局部皮肤反复红肿，破溃，局部痒，应考虑为（） [单选题] *

- A.肛旁疖肿
- B.肛瘘(正确答案)
- C.混合痔
- D.血栓性外痔
- E.肛旁慢性肉芽肿

41.肛管的括约肌功能主要依靠哪种结构的作用（） [单选题] *

- A.外括约肌的深部
- B.内括约肌
- C.肛提肌
- D.肛管直肠环(正确答案)
- E.外括约肌皮下部

42.关于直肠肛管的解剖，下列哪一项是错误的（） [单选题] *

- A.齿线以上是粘膜，以下是皮肤
- B.齿线以上由直肠上，下动脉供应(正确答案)
- C.齿线以下的静脉丛属直肠下静脉丛
- D.齿线以下的淋巴回流到腹股沟淋巴结
- E.齿线以上的直肠粘膜受阴部内神经支配

43.直肠肛管交界的齿线在临床上的重要性是（） [单选题] *

- A.齿线上的直肠有神经反射弧
- B.齿线上的直肠易受感染
- C.齿线上下血液供应、神经、淋巴引流各异(正确答案)
- D.齿线、肛管容易受伤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/176130130031010044>