

2022 年内蒙古自治区成考（专升本）大学医学综合预测试卷

一、单选题

1、迅速失血可导致休克，出血量至少超过全身总血量的比例是()

(A)20%

(B)30%

(C)40%

(D)50%

2、卵巢动脉的起始部位是（）

(A)髂内动脉

(B)腹主动脉

(C)髂外动脉

(D)子宫动脉

(E)肾动脉

3、不受动眼神经支配的眼肌是（）

(A)下直肌

(B)上睑提肌

(C)上直肌

(D)内直肌

(E)外直肌

4、女，32岁。低热、盗汗、腹胀2个月。腹水检查结果：比重1.018，蛋白27g/L，WBC $600 \times 10^6/L$ ，L0.55。普通细菌培养阴性。最可能的诊断是（）

(A)结核性腹膜炎

(B)化脓性腹膜炎

(C)肝硬化腹水

(D)恶性腹水

(E)自发性细菌性腹膜炎

5、腭扁桃体的位置在【】

(A)喉前庭的侧壁

(B)鼻咽部的侧壁

(C)喉咽部的侧壁

(D)口腔的侧壁

(E)口咽部的侧壁

6、一侧视交叉外侧部的不交叉纤维损伤时，引起的视野缺损是（）

(A)双眼视野鼻侧半偏盲

(B)患侧视野鼻侧半偏盲

(C)双眼视野对侧半同向性偏盲

(D)双眼视野颞侧半偏盲

(E)患侧眼全盲

7、下列关于丹毒的描述，正确的是()

(A)好发于下肢与面部

(B)感染多发生于皮下

(C)金黄色葡萄球菌是常见病原菌

(D)切开引流是治疗的关键

8、输卵管外侧端的开口部位在【】

(A)卵巢

(B)腹膜腔

(C) 卵巢窝

(D) 腹腔

(E) 阴道后穹

9、某胸痛患者的心电图示：II、III、aVF 导联 ST 段抬高，T 波倒置，病理 Q 波形成。最可能的诊断是（）

(A) 肥厚型梗阻性心肌病

(B) 急性心包炎

(C) 急性心肌梗死

(D) 变异型心绞痛

(E) 急性肺栓塞

10、具有结肠带和肠脂垂的肠管是（）

(A) 肛管

(B) 直肠

(C) 阑尾

(D) 盲肠

(E) 回肠

11、大量胸腔积液的典型体征是【】

(A) 病变侧呼吸动度加大

(B) 病变侧叩诊实音

(C) 气管偏向患侧

(D) 病变部位可闻及啰音

(E) 语音共振增强

12、通常情况下，术后胃肠减压拔管的指征是（）

- (A) 肛门排气后
- (B) 无肠鸣音
- (C) 肠鸣音存在
- (D) 术后 3 天
- (E) 患者要求拔除

13、三尖瓣所在的位置是 ()

- (A) 左房室口
- (B) 肺动脉口
- (C) 主动脉口
- (D) 冠状窦口
- (E) 右房室口

14、女，65 岁。因持续性心前区疼痛 5 小时就诊。心电图示：V1~V5 导联 ST 段呈弓背向上抬高与 T 波形成单向曲线，异常 Q 波形成。最可能的诊断是 【】

- (A) 不稳定型心绞痛
- (B) 急性心肌梗死
- (C) 急性心肌炎
- (D) 急性肺栓塞
- (E) 急性心包炎

15、阻塞性通气功能障碍患者肺功能改变的特点是 ()

- (A) 一秒率降低
- (B) 通气/血流比例失调
- (C) 气速指数 > 1.0
- (D) 残气量减少

(E)肺活量增加

16、横断脑干网状结构使易化区活动占优势，其结果是（）

(A)嗜睡

(B)昏迷

(C)去大脑僵直

(D)柔软性麻痹

(E)意向性震颤

17、男，48岁。近期健康体检报告示：血 BUN 6.0mmol/L ，总胆红素 $12.7\mu\text{mol/L}$ ，

AST 71U/L ，空腹血糖 6.0mmol/L ，总胆固醇 7.5mmol/L 。临床的诊断是（）

(A)肾功能不全伴黄疸

(B)肝功能异常伴血脂异常

(C)肝功能衰竭伴黄疸

(D)糖尿病伴肾功能不全

(E)糖尿病伴血脂异常

18、动脉血压升高时心动周期主要的变化是【】

(A) 等容收缩期延长

(B) 房缩期延长

(C) 快速射血期延长

(D) 减慢射血期延长

(E) 心室舒张期延长

19、激素经血液循环被运行后作用于靶细胞的作用方式是（）

(A)远距分泌

(B)内在分泌

(C)自分泌

(D)旁分泌

(E)神经分泌

20、某患者腹壁曲张静脉分布于腹壁两侧，脐上和脐下静脉血流方向均向上。最可能的原因是【】

(A)肝静脉血栓

(B)胃底静脉开放

(C)脾肾静脉分流

(D)下腔静脉阻塞

(E)门静脉癌栓

21、某患者误输异型血后无尿3天。测血压正常。最有效的治疗是【】

(A)输注地塞米松

(B)输注碳酸氢钠

(C)输注甘露醇

(D)血液透析

(E)输注速尿

22、调节产热活动最重要的体液因素是()

(A)甲状腺激素

(B)甲状旁腺激素

(C)胰岛素

(D)生长激素

23、代谢性碱中毒常同时存在的电解质紊乱是()

(A)高钾血症

(B)低钠血症

(C)高钠血症

(D)低钾血症

24、输血的目的不包括（）

(A)杀灭细菌，抗感染

(B)纠正贫血

(C)改善凝血功能

(D)对出血患者补充血容量

(E)提高血浆蛋白

25、根据烧伤早期补液的原则，第一个 8 小时内，应该输入第一天总液体量的【】

(A) 1 / 6

(B) 1 / 3

(C) 1 / 4

(D) 1 / 5

(E) 1 / 2

26、眼球血管膜最肥厚部分是【】

(A) 睫状体

(B) 虹膜

(C) 脉络膜

(D) 巩膜

(E) 视网膜

27、胸外心脏按压时，正确的按压部位是（）

(A)胸骨中、上 1/3 交界处

- (B)胸骨左缘第 3 肋间
- (C)胸骨左缘第 4 肋间
- (D)左锁骨中线第 4 肋间
- (E)胸骨中、下 1/3 交界处

28、清创术的目的是【】

- (A) 冲洗伤腔
- (B) 清除伤口内异物
- (C) 修剪伤口边缘
- (D) 清除血肿
- (E) 将污染伤口变为清洁伤口

29、正常时激活膀胱壁牵张感受器的膀胱内尿量最小范围是（）

- (A)200~300mL
- (B)800~900mL
- (C)600~700mL
- (D)400~500mL
- (E)1000~1100mL

30、不属于机体内环境的体液是（）

- (A)淋巴液
- (B)组织液
- (C)血浆
- (D)脑脊液
- (E)细胞内液

31、男，60岁。餐后突感上腹痛、大汗1小时。查体：腹肌紧张，压痛、反跳痛(+)，肝浊音界消失。此时应首选的检查是()

- (A)立位腹平片
- (B)血、尿淀粉酶
- (C)腹部B超
- (D)心电图

32、下列不属于急性上消化道出血临床表现的是（）

- (A)上腹部压痛阳性
- (B)柏油便
- (C)呕吐咖啡样物质
- (D)听诊肠鸣音活跃
- (E)可出现头晕、心悸

33、房水产生的部位是()

- (A)睫状体
- (B)虹膜
- (C)角膜
- (D)脉络膜

34、男，70岁。有慢性支气管炎病史30年。受凉后突发气促、烦躁3天。查体：口唇发绀，呼吸36次/分，脉率100次/分，双肺闻及哮鸣音。首选的辅助检查是()

- (A)心电图
- (B)血常规
- (C)血气分析

(D)肺功能

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/176222125105010104>