

肝胆胰外科护理出科考试

一、选择题

- 1.在我国引起门静脉高压征的主要原因是（） [单选题] *

A.酒精性肝硬化

B.血吸虫病性肝硬化

C.肝炎后肝硬化 ✓

D.Budd —Chiari征

E.肝外门静脉血栓形成
- 2.肝性脑病患者暂停蛋白质饮食是为了（） [单选题] *

A.减少氨的产生 ✓

B.减少氨的吸收

C.促使氨的转化

D.降低血尿素氮

E.降低肠道内 pH 值
- 3.门静脉高压征肝性脑病饮食的护理措施错误的是（） [单选题] *

A.高糖类

B.高蛋白质 ✓

C.高维生素

D.低脂肪

E.有食管静脉曲张者，避免过热.干硬食物

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

4.原发性肝癌普查常首选（） [单选题] *

A. CT

B. AFP ✓

C. MRI

D. AKP

E. B超

5.胆道疾病首选的检查方法是（） [单选题] *

A. B超 ✓

B.腹部评估

C.口服胆囊造影

D. 静脉胆道造影

E.经皮肝穿刺胆管造影

6.胆道疾病做B超检查前应（） [单选题] *

A. 禁食水 4h

B.禁食水 12h 禁食 8h，禁水 4h

C. 禁食 12h，禁水 4h

D. 禁食 12h，禁水 8h ✓

7.雷诺(Reynold)五联征是指（） [单选题] *

A.胆绞痛、高热、黄疸、呕吐、腹泻

B.胆绞痛、高热、黄疸、休克、神志不清 ✓

C.高热、黄疸、呕吐、腹泻、寒战

D. 休克、神志不清、黄疸、呕吐、发热

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》

E.都不是

8.胆道手术后，T 管一般留置的时间是（） [单选题] *

A. 5d

B. 7d

C. 14d ✓

D. 20d

E. 30d

9. T 管造影后应开放引流多少小时以上（） [单选题] *

A. 4h

B. 8h

C. 10h

D. 12h

E. 24h ✓

10.胆道术后病人在 T 管拔管前，下列护理措施必不可少的是（） [单选题] *

A. 无菌冲洗

B. B 超

C. 抗生素

D. 试验性夹管 1～2d ✓

E.检查血胆红素

11.急性胰腺炎病人禁食的目的是（） [单选题] *

A. 控制饮食

B. 避免胃扩张

为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载

C.减少胃液分泌

D.减少胰液分泌 ✓

E.解除胰管痉挛

12. 急性胰腺炎出现脉率快、腹水呈血性、血压低或休克时，应考虑为（） [单选题] *

A. 水肿性胰腺炎

B. 胰腺炎合并腹腔内脏器官破裂

C. 出血坏死性胰腺炎 ✓

D. 胰腺炎合并腹腔感染

E. 出血性胰腺炎

13. 某患者，70 岁，有冠心病史，可疑直肠癌，准备进行直肠指检，采用何种体位为宜（） [单选题] *

A. 仰卧位

B. 蹲位

C. 侧卧位 ✓

D. 截石位

E. 膝胸位

14. 原发性腹膜炎与继发性腹膜炎的主要区别是（） [单选题] *

A. 有无全身感染

B. 有无腹膜刺激征

C. 腹胀的程度不一

D. 腹痛的性质不同

E. 腹腔内有无原发病灶 ✓

15. 有利于腹膜炎渗液流至盆腔，减少毒素吸收的护理措施是（） [单选题] *

天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

- A. 禁食、禁饮
- B. 胃肠减压
- C. 应用抗生素
- D. 安置半卧位 ✓
- E. 保持腹腔引流通畅

16. 胃肠减压护理，下列哪项不正确（） [单选题] *

- A. 病人应禁食
- B. 保持减压管通畅
- C. 胃管堵塞禁止冲洗 ✓
- D. 注意口腔护理
- E. 记录吸出液的量及性质

17. 护理胃肠减压的病人时，哪项是错误的（） [单选题] *

- A. 及时更换引流瓶
- B. 口服药物后持续胃肠减压 ✓
- C. 观察并记录引流液的量及性状
- D. 注意口腔护理
- E. 持水和电解质平衡

18. 胃肠减压最可靠的拔管指征是（） [单选题] *

- A. 体温正常
- B. 腹胀消失
- C. 肠鸣音恢复
- D. 食欲增加

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

E.肛门排气 ✓

19. 男性，23 岁，因急性胆囊炎穿孔而继发腹膜炎，手术后为了预防粘连性肠梗阻，最主要的护理措施是（） [单选题] *

A. 充分补液

B. 合理应用抗生素

C. 禁食和胃肠减压

D. 指导患者早期下床活动 ✓

E. 维持引流管引流通畅

20. 患者，女性，45 岁。胆总管切开取石术后，T 形管引流 2 周，拔除 T 管前试行夹闭管道 1~2d，重点观察内容应该是（） [单选题] *

A. 胆汁性腹膜炎.高热.黄疸 ✓

B. 大便颜色

C. 饮食与睡眠

D. 引流管皮肤口处有无异常症状

E. 生命体征和神志

21. 女性，42 岁，1d 前出现转移性右下腹痛，麦氏点有固定压痛，现腹痛突然加剧，范围扩大，腹部有肌紧张。应考虑（） [单选题] *

A. 单纯性阑尾炎

B. 化脓性阑尾炎

C. 坏疽性阑尾炎

D. 阑尾周围脓肿

E. 阑尾穿孔腹膜炎 ✓

不飞则已，一飞冲天；一鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

22. 上消化道出血可表现为呕血或黑粪，最重要取决于（） [单选题] *

- A. 出血的部位
- B. 出血的量和速度 ✓
- C. 病变的性质
- D. 凝血机制
- E. 胃肠蠕动情况

23. 阑尾手术切口的标志点为（） [单选题] *

- A. 麦氏点 ✓
- B. 华氏点
- C. 墨氏点
- D. 雷氏点
- E. 左下腹

24. 急性阑尾炎最常见的病因为（） [单选题] *

- A. 阑尾管腔阻塞 ✓
- B. 细菌入侵
- C. 急性肠炎
- D. 血吸虫病
- E. 经常进食高脂肪

25. 患者，女性。因脓血便来院就诊，确诊为直肠癌后，行直肠癌根治术(Miles手术)，术后患者拒绝见人，其护理诊断是（） [单选题] *

- A. 不合作
- B. 绝望

君子忧道不忧贫。——孔丘

C. 悲哀

D. 焦虑

E. 自我形象紊乱 ✓

26. 属于肠外营养输注途径的是（） [单选题] *

A. 鼻胃管

B. 胃造瘘

C. 空肠造瘘

D. 中心静脉插管 ✓

E. 鼻肠管

27. 通过中心静脉途径进行肠外营养支持的患者，估计其接受营养支持的时间至少应为（） [单选题] *

A. 1 周

B. 2 周 ✓

C. 3 周

D. 4 周

E. 5 周

28. 可不经消化道直接吸收的肠内营养剂是（） [单选题] *

A. 匀浆膳

B. 要素饮食 ✓

C. 大分子聚合物

D. 牛奶

E. 蔬菜汁

29. 对胃内营养所用的营养液的要求，错误的是（） [单选题] *

穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

- A. 每天配置当日量
- B. 在容器中悬挂输注不应超过 4～6h
- C. 浓度应从低到高，容量由少到多
- D. 尽量采用一次投给法喂养 ✓
- E. 经鼻胃管输注多采用半卧位

30. 胃肠内外营养支持的代谢并发症有（） [单选题] *

- A. 脓毒症
- B. 空气栓塞
- C. 静脉炎、血栓形成
- D. 气胸、血胸
- E. 低血糖 ✓

31. 男性患者，经鼻胃管进行肠内营养支持，护士的护理措施中正确的是（） [单选题] *

- A. 若胃内容物残留量为 200ml，可继续输注营养液
- B. 输注营养液时应取头部抬高 30° 的半卧位 ✓
- C. 若输注过程中患者突然出现呛咳、呼吸急促或咳出类似营养液的痰，应减慢输注速
- D. 营养液浓度一般由 25 % 开始逐渐增至 50 %
- E. 营养液量逐渐增加，3d 内达到全量

32. 女性患者，患胰腺癌入院，经中心静脉导管接受胃肠外营养支持，护士的导管护理正确的是（） [单选题] *

- A. 每周一次消毒穿刺部位
- B. 可经中心静脉注射途径给予抗生素
- C. 可经中心脉注射途径输血

D. 可经中心静脉注射导管抽血

E. 输液结束后要用肝素稀释液封管 ✓

33. 女性患者，65 岁，因结肠癌收入院，可以帮助护士判断其有营养不良的依据是（） [单选题] *

A. 3 个月内体重下降超过 5% ✓

B. 1 个月内体重下降超过 5kg

C. 1 个月内体重下降 5%

D. 血清白蛋白 40g/l

E. 体质指数高于正常范围

34. 术后早期活动的优点，下列哪项不对（） [单选题] *

A. 减少血栓性静脉炎的发生

B. 减少伤口感染的机会 ✓

C. 减少肺部并发症

D. 防止腹胀.便秘

E. 促进排尿功能的恢复

35. 术后尿潴留的处理，首先是（） [单选题] *

A. 严格无菌操作下导尿

B. 诱导排尿 ✓

C. 耻骨上穿刺

D. 禁饮水

E. 应用利尿剂

36. 李某，胆囊摘除术后切口裂开，下列处理不妥的是（） [单选题] *

A. 安慰患者

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄晞

B. 立即在病床上将内脏还纳 ✓

C. 送手术室缝合

D. 用腹带包扎

E. 立即用无菌盐水纱布覆盖

37. 王某，腹部手术后，咳嗽.痰黏稠，不能咳出，主要护理措施是（） [单选题] *

A. 给抗生素

B. 鼓励翻身

C. 戒烟

D. 给镇咳药物

E. 超声雾化吸入 ✓

38. 急性梗阻性化脓性胆管炎最关键的治疗是（） [单选题] *

A. 及时使用抗生素

B. 应用肾上腺皮质激素

C. 及时用升压药

D. 紧急胆道减压术 ✓

E. 纠正电解质酸碱平衡

39. 急性胆囊炎引起的腹痛常发生于（） [单选题] *

A. 清晨起床时

B. 剧烈运动时

C. 空腹时

D. 油腻餐后 ✓

E. 紧张工作时

不飞则已，一飞冲天；一鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

40. 急性胆囊炎时出现右肩背部疼痛属于（） [单选题] *

- A. 内脏性疼痛
- B. 躯体性疼痛
- C. 牵涉性疼痛 ✓
- D. 弥散性疼痛
- E. 迟钝性疼痛

41. 胆总管引流术后，T 管引流胆汁过多常提示（） [单选题] *

- A. 肝细胞分泌亢进
- B. 胆管分泌胆汁过多
- C. 胆囊浓缩功能减退
- D. 胆道下端梗阻 ✓
- E. 十二指肠反流

42. 胆总管切开取石术后腹腔引流液呈“胆汁”样，应考虑（） [单选题] *

- A. 正常引流液
- B. 低蛋白血症
- C. 胆瘘 ✓
- D. 胰瘘
- E. 肠瘘

43. 胆道 T 管引流和腹腔引流管的护理措施，两者不同的是（） [单选题] *

- A. 保持引流管通畅
- B. 每天更换引流袋
- C. 观察引流量和性状

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

D. 拔管前夹管观察 1~2d ✓

E. 引流袋不可高于引流出口

44. 男性，40 岁，因肝外胆管结石导致梗阻性黄疸，伴皮肤瘙痒难忍，对其皮肤瘙痒的护理不正确的是

() [单选题] *

A. 用手抓挠止痒 ✓

B. 温水擦洗皮肤

C. 外用止痒药物

D. 告知患者相关知识

E. 应用炉甘石洗剂

45. 男性，46 岁，因胆囊结石行胆囊切除术，出院时指导患者饮食宜 () [单选题] *

A. 低盐.低糖.低脂肪饮食

B. 高蛋白.低脂肪饮食 ✓

C. 低蛋白.低脂肪饮食

D. 低糖.低盐.低脂肪饮食

E. 高蛋白.高维生素.低盐饮食

46. 赵女士，42 岁。皮肤.巩膜出现明显黄染，粪便呈陶土色，尿液黄褐色，B 超检查肝内外胆管无明显

扩张，进一步检查应选择 () [单选题] *

A. 腹部 x 线平片

B. 口服胆囊造影

C. 静脉胆道造影

D. 内镜逆行胰胆管造影

E. 经皮肝穿刺胆道造影 ✓

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

47.应用最广泛、简易的诊断急性胰腺炎的方法是（） [单选题] *

A. B 超

B. MRI

C. 血清钙测定

D. 血气分析

E. 血、尿淀粉酶测定 ✓

48. 急性胰腺炎时，血淀粉酶（） [单选题] *

A. 增高最早 ✓

B. 增高稍晚

C. 增高最晚

D. 不增高

E. 持续增高

49. 预防急性胰腺炎有重要意义的措施是（） [单选题] *

A. 注意饮食卫生

B. 经常应用抗生素预防感染

C. 防治胆道疾病 ✓

D. 经常服用消化酶类药物

E. 控制糖尿病

50. 重症胰腺炎时 Gre-Tumer 征常见于病人（） [单选题] *

A. 胸部

B. 腰部 ✓

C. 脐周

为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载

D. 肩部

E. 臀部

51. 患者，男性，41 岁，在 ERCP 检查后出现腹部持续疼痛，血清淀粉酶检查超过正常值，应考虑（）

[单选题] *

A. 急性胆管炎

B. 急性胃炎

C. 急性肠炎

D. 急性胰腺炎 ✓

E. 急性胆管梗阻

52. 急腹症的腹壁痛主要是壁腹膜受腹腔病变刺激所致，其疼痛类型是（） [单选题] *

A. 内脏性疼痛

B. 躯体性疼痛 ✓

C. 膨胀性疼痛

D. 痉挛性疼痛

E. 缺血性疼痛

53. 李先生，30 岁，昨日夜间因车祸外伤，以脾破裂急诊入院，T36℃，BP96/60mmHg，P90 次/分，

R22 次/分，急需急诊手术. 下列哪些准备是不必要的（） [单选题] *

A. 做好患者及家属的心理护理

B. 立即配血，做药物过敏试验

C. 迅速建立静脉通路

D. 输血 ✓

54. 李先生，30 岁，昨日夜间因车祸外伤，以脾破裂急诊入院，T36℃，BP96/60mmHg，P90 次/分，

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

R22 次/分，急需急诊手术.皮肤准备的范围是（） [单选题] *

- A. 上自乳头连线，下到耻骨联合 ✓
- B. 两侧到腋中线
- C. 上自锁骨，下至脐平
- D. 上自乳头连线，下至大腿上三分之一

55. 男性，40 岁，右上腹受伤致肝破裂。神志清楚，上腹部明显压痛，面色苍白，四肢湿冷，脉搏 130

次/分，血压 80/60mmHg ，尿少，口渴，过度换气。患者的诊断是（） [单选题] *

- A. 出血性休克 ✓
- B. 过敏性休克
- C. 损伤性休克
- D. 神经源性休克

56. 男性，40 岁，右上腹受伤致肝破裂。神志清楚，上腹部明显压痛，面色苍白，四肢湿冷，脉搏 130

次/分，血压 80/60mmHg ，尿少，口渴，过度换气。诊断休克的主要依据（） [单选题] *

- A. 低血压
- B. 脉搏快
- C. 尿少
- D. 临床综合表现 ✓

57. 男性，40 岁，右上腹受伤致肝破裂。神志清楚，上腹部明显压痛，面色苍白，四肢湿冷，脉搏 130

次/分，血压 80/60mmHg ，尿少，口渴，过度换气。采取下列监测措施中，哪一项不必要（） [单选题] *

- A. 肢体温度
- B. 血压、脉搏、尿量
- C. 精神状态

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

D. 头部 CT 检查 ✓

58. 患者，男性，57 岁，主因“腹胀、气促半月，加重 3 天”入院，B 超示腹部大量腹水，欲行腹腔穿刺减轻不适。该患者穿刺时最适宜的体位为（） [单选题] *

A. 半卧位

B. 侧卧位 ✓

C. 平卧位

D. 端坐位

59. 患者，男性，57 岁，主因“腹胀、气促半月，加重 3 天”入院，B 超示腹部大量腹水，欲行腹腔穿刺减轻不适。如果患者腹水是由于肝硬化引起，一次放腹水量最多不超过（） [单选题] *

A. 1000 毫升

B. 2000 毫升

C. 3000 毫升 ✓

D. 4000 毫升

60. 患者，男性，57 岁，主因“腹胀、气促半月，加重 3 天”入院，B 超示腹部大量腹水，欲行腹腔穿刺减轻不适。如果患者腹水是由于肝硬化引起，该患者腹水的性质最可能的是（） [单选题] *

A. 淡黄色浑浊

B. 淡黄色澄清 ✓

C. 血性

D. 深黄色浑浊

61. 患者，男，42 岁，呕吐、腹泻 2 天，意识模糊、烦躁不安半天急诊入院。查体：BP 110/70mmHg，神志恍惚，巩膜中度黄染，颈部可见数枚蜘蛛痣。心肺未见异常，腹软，肝肋下未触及，脾肋下 3cm。双上肢散在出血点，Hb 90g/L，WBC $3.22 \times 10^9/L$ ，血糖 7.0mmol/L，尿糖(+)，尿酮(-)尿镜检(-)对确诊

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/178000104112007041>