

主治医师（口腔医学）-相关专业知识(A1/A2 型题 2)

1、以下富含核黄素的食物是

- A. 牛奶
- B. 菠菜
- C. 肝
- D. 胡萝卜
- E. 以上都是

2、以下疾病名称中，与其他不属于同类的是

- A. 口腔红斑病
- B. 增殖性红斑
- C. 红色增殖性病变
- D. 红色肥厚症
- E. 炎症性红斑

3、关于 Stevens-Johnson 综合征，以下描述正确的是

- A. 带状疱疹病毒侵犯面神经膝状神经节，出现耳痛、面瘫及听力障碍
- B. 尼氏征阳性
- C. 口腔大面积糜烂，伴鼻腔、生殖器、肛门、眼睛等部位黏膜出现糜烂及炎症

D. 口腔黏膜上皮出现过角化及异常增生

E. 幼儿舌系带中央两侧出现溃疡

4、某女性患者，46 岁，1 型糖尿病，全口多数患牙的牙周袋深度在 5mm 以上，且松动度达 I ~ II 度，牙石(++)，牙龈探诊出血。初步诊断为与糖尿病有关的牙周炎，此类患者实施牙周治疗效果最好的时间是

A. 血糖控制前

B. 服用抗生素后

C. 血糖控制后

D. 血糖控制后又失控时

E. 任何时机

5、某男性患者，52 岁，半年来自觉左上后牙冷热敏感，有咬合痛，近 2 天出现自发痛及夜间痛。检查：牙体完整，颊舌侧牙龈退缩至釉质牙骨质界下 4~5mm，探针为可探入根分叉外形，冷诊敏感。X 线片显示根分叉区骨密度降低，近远中牙周膜增宽。可采用的治疗方法是

A. 根管治疗

B. 翻瓣术

C. 龈上洁治及龈下刮治

D. 调

E. 以上所有选项

6、某女性患者，46 岁，慢性牙周炎，牙周基础治疗后 1 个月复查，其根分叉处牙周探诊仍有牙龈出血。在分析疗效不佳的可能原因中，可以排除的是

- A. 治疗不彻底
- B. 有釉突
- C. 畸形舌侧沟
- D. 关系
- E. 口腔卫生不良

7、某男性患儿，3 岁，全口乳牙牙龈红肿，袋深 4~5mm，溢脓，有口臭，手掌、足底皲裂明显，其最有可能的诊断是

- A. Down 综合征
- B. Stevens-Johnson 综合征
- C. Papillon-Lefevre 综合征
- D. 艾迪生病
- E. 巴塞多病

8、某男性患者，13 岁，主诉牙龈逐渐肿大 6 个月，有鼻炎史。检查显示前牙牙龈过度生长明显，覆盖牙面近 1/3，牙龈色泽较红。应诊断为

- A. 牙龈纤维瘤病伴龈炎

- B. 增生性龈炎
- C. 肉芽肿型牙龈瘤
- D. 青春期龈炎
- E. 血管型牙龈瘤

9、某男性患者，29 岁，发热 3 天，多数牙的龈乳头红肿伴局部小脓肿形成。右下前磨牙叩诊敏感。口服抗菌药无效。经中西医结合治疗，急性炎症消退，牙龈恢复正常。应诊断为

- A. 急性牙周炎
- B. 急性多发性牙周脓肿
- C. 急性多发性牙龈脓肿
- D. 慢性牙周炎急性发作
- E. 以上均不是

10、某男性患者，15 岁，全口牙龈肿胀，波及龈乳头、边缘龈和附着龈，外形不规则，呈结节状，龈色苍白，中等硬度，龈缘坏死、溃疡和假膜覆盖，疼痛，有口臭。牙龈有明显的出血倾向，且不易止住。血常规检查，发现白细胞数目及形态异常。应考虑有以下病变可能

- A. 坏死溃疡性龈炎
- B. 血管型牙龈瘤
- C. 肉芽肿型牙龈瘤
- D. 白血病的牙龈病损

E. 青春期龈炎

11、根分叉病变治疗难度大的原因不包括

A. 根分叉入口过于窄小

B. 骨破坏形态复杂

C. 根面有凹槽

D. 刮治器械工作刃过短

E. 存在解剖变异

12、暂时性夹板的适应证，不正确的是

A. 外伤引起的牙齿松动

B. 牙周手术前固定患牙

C. 牙周病导致的牙齿松动 II 度

D. 有继发性创伤，导致患牙松动、移位

E. 牙周炎症不能控制

13、对牙龈翻瓣术适应证的叙述不正确的是

A. 刮治术无效的病变范围广泛的牙周袋

B. 复合性牙周袋或多数骨下袋需修整牙槽骨者

C. 牙周袋在 4mm 以内

D. 牙周袋袋底超过膜龈联合，不宜做龈切术

E. 前牙唇侧多数性骨下袋

14、以下疾病可以造成牙周组织损害，但除外

- A. 糖尿病
- B. Down 综合征
- C. Papillon-Lefevre 综合征
- D. 胆囊炎
- E. 艾滋病

15、关于艾滋病患者描述不正确的是

- A. 30%患者的首发症状为口腔疾病
- B. 线形牙龈红斑为艾滋病特有的牙周病损
- C. 菌斑成分与 HIV 阴性者无明显区别
- D. 容易发生口腔内的机会性感染
- E. 坏死性溃疡性牙周炎发生率在 4%~10%

16、关于掌跖角化-牙周破坏综合征描述不正确的是

- A. 皮肤和牙周病变多在 4 岁前共同出现
- B. 患儿智力障碍但身体发育正常
- C. 既侵犯乳牙又侵犯恒牙
- D. 有深牙周袋，牙槽骨吸收迅速
- E. 对常规牙周治疗疗效不佳

17、掌跖角化-牙周破坏综合征是

- A. 常染色体显性遗传
- B. 常染色体隐性遗传
- C. 性染色体显性遗传
- D. 性染色体隐性遗传
- E. 非遗传性疾病

18、对III度根分叉病变描述不正确的是

- A. 病变波及全部根分叉
- B. 根间牙槽骨完全吸收
- C. X线片见骨质消失呈透射区
- D. 牙龈覆盖根分叉区
- E. 探针可进入根分叉区，但不能穿通

19、引起根分叉病变的主要原因是

- A. 存在釉珠，无牙周膜附着
- B. 创伤
- C. 菌斑
- D. 磨牙髓室底常有侧副根管存在
- E. 以上均是

20、根分叉区易形成牙周袋的原因是

- A. 此处常存在釉突，无牙周膜附着
- B. 根分叉区对力反应敏感
- C. 此处易堆积牙石，菌斑
- D. 磨牙髓室底常有侧副根管存在
- E. 以上均是

21、药物性牙龈过度生长与牙龈纤维瘤病的区别是

- A. 服药史
- B. 家族史
- C. 牙龈过度生长累及的范围
- D. 牙龈过度生长的程度
- E. 以上都是

22、有关妊娠性牙龈瘤的发生发展，以下描述不正确的是

- A. 是受局部因素刺激的结果
- B. 多发生于下前牙龈乳头区
- C. 极易出血
- D. 少有疼痛
- E. 去除局部刺激物后，均可自行消退

23、吸烟促进牙周病发展的机制中不包括

- A. 改变中性粒细胞的功能，并减少血清的免疫球蛋白

- B. 降低局部氧张力
- C. 抑制牙周组织血管的形成
- D. 恶化吸烟者的口腔卫生状况
- E. 抑制成纤维细胞及成骨细胞

24、不属于牙周组织防御机制的是

- A. 上皮附着的封闭作用
- B. 釉质牙骨质交界的三种形式
- C. 龈沟液
- D. 白细胞
- E. 上皮的快速更新和修复

25、由糖尿病因素导致牙周病加重的病理机制是

- A. 白细胞趋化和吞噬功能缺陷
- B. 伤口愈合障碍
- C. 免疫功能下降
- D. 抗感染能力下降
- E. 糖化末端产物与其细胞受体作用的加强

26、中性粒细胞减少与功能降低有可能对牙周组织健康产生影响，但通常不会见于以下患者

- A. 侵袭性牙周炎患者

- B. 粒细胞功能低下患者
- C. 慢性牙周炎患者
- D. 糖尿病患者
- E. Down 综合征患者

27、属于牙周病全身易感因素有

- A. 性激素
- B. 精神压力
- C. 艾滋病
- D. 骨质疏松症
- E. 以上都是

28、有关上皮附着，与其性质无关的描述为

- A. 是牙龈组织与牙齿表面的连接
- B. 是牙龈借结合上皮与牙齿表面的连接
- C. 比牙龈上皮更新快
- D. 可防御细菌侵入
- E. 是机体识别致病菌的传感器

29、弧形骨吸收最常见的牙位为

- A. 下前牙
- B. 第一磨牙

- C. 尖牙
- D. 前磨牙
- E. 上前牙

30、垂直性食物嵌塞的主要病因是

- A. 接触点异常
- B. 牙龈退缩
- C. 牙冠畸形
- D. 牙石堆积
- E. 进食含纤维素多的食物

31、牙周塞治剂不能用于

- A. 牙周手术后
- B. 龈出血
- C. 龈痿溢脓
- D. 牙颈部过敏
- E. 扩张的牙周袋

32、龈切除术的切口位置应在

- A. 袋底冠方，刀刃向冠方，并与牙面成 45°
- B. 正对袋底，刀刃向冠方，并与牙面成 80°
- C. 袋底根方，刀刃向根方，并与牙面成 45°

D. 袋底根方，刀刃向冠方，并与牙面成 45°

E. 定点线上，刀刃向根方，并与牙面成 80°

33、某女性患者，37 岁，因上颌中切牙隐痛不适前来就诊，X 线片显示根管形态不规则，有局限性的膨大透影区域，追溯病史该牙曾有外伤史，诊断为

A. 牙隐裂

B. 根折

C. 牙外吸收

D. 牙内吸收

E. 牙髓钙化

34、采用固位钉进行大面积龋损的牙体修复时钉道设计应注意

A. 保护牙髓

B. 在釉质牙本质界内的牙本质中，最好在轴角处制作

C. 避让牙尖下的髓角和正对根分叉的薄弱区

D. 钉道方向与牙表面平行

E. 以上都是

35、牙内吸收的诊断依据主要是

A. 病史

B. 临床表现

- C. X 线片
- D. 牙髓活力测试
- E. 血清学检查

36、牙内吸收多发生于

- A. 外伤牙
- B. 再植牙
- C. 活髓切断术后
- D. 盖髓术后
- E. 以上都有可能

37、牙髓弥漫性钙化最常发生于

- A. 急性牙髓炎
- B. 外伤后的患牙
- C. 深龋
- D. 牙周炎
- E. 磨损

38、无牙畸形常伴随

- A. 毛发稀疏
- B. 指甲缺失
- C. 缺少皮脂腺

- D. 汗腺少
- E. 以上都有

39、多生牙最多见于

- A. 下颌前磨牙区
- B. 上颌侧切牙区
- C. 上颌两中切牙之间
- D. 上颌第四磨牙
- E. 下颌第四磨牙

40、釉珠附着在

- A. 牙冠部表面
- B. 牙根尖部牙髓表面
- C. 冠髓内壁
- D. 根髓内壁
- E. 近颈部牙骨质表面

41、粘连形成结合牙的组织为

- A. 釉质
- B. 牙本质
- C. 牙骨质
- D. 骨组织

E. 纤维组织

42、融合牙最常见于

A. 上颌恒切牙

B. 下颌恒切牙

C. 上颌乳切牙

D. 下颌乳切牙

E. 正常牙与多生牙

43、遗传性乳光牙本质属于

A. 常染色体隐性遗传

B. 常染色体半显性遗传

C. 常染色体共显性遗传

D. 常染色体显性遗传

E. 伴性遗传

44、以下不是梅毒牙临床表现的是

A. 多见于恒牙列

B. 牙冠光照下呈现乳光色

C. 桑葚样磨牙

D. 蕾状磨牙

E. 半月形切牙

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/178027004137006132>