

传染病知识 试题库(带答案)

艾滋病部分

一、单项选择题

- 1、目前全球艾滋病流行最严重的地区是：（ ）
A、亚洲 B 欧洲 C 非洲 D 北美
- 2、下列哪项不是急性 HIV 感染的临床表现：（ ）
A、发热 B 咽痛 C 淋巴结肿大 D 口腔真菌感染
- 3、HIV 感染人体后主要导致下列哪个系统损害：（ ）
A、消化系统 B 免疫系统 C 循环系统 D 骨骼系统
- 4、下列哪类人群不属于艾滋病毒感染的高危人群：（ ）
A、同性恋者 B 性乱交者 C 静脉吸毒者 D 无偿献血人员
- 5、艾滋病患者常见的肿瘤是（ ）
A、霍奇金病 B 淋巴肉瘤 C 卡波济肉瘤 D 非霍奇金淋巴瘤
- 6、下列哪项不是艾滋病的传播途径：（ ）
A、性传播 B 母婴垂直传播 C 血、血制品、器官移植和污染的注射器 D 蚊虫叮咬
- 7、艾滋病病毒通过血液和血液制品传播的概率大约是：（ ）
A、40% B 60% C 80% D 100%
- 8、下列哪项检查能够最终确定病人感染了艾滋病毒：（ ）
A、血常规 B HIV 抗体确诊试验 C HIV 抗体筛查试验 D 尿常规
- 9、HIV 不可以用下列哪种方法杀灭：（ ）
A、37℃，10%漂白粉处理 30 分钟 B 焚烧 C 室温，3 天 D 56℃，30 分钟
- 10、艾滋病常见合并症不包括：（ ）
A、肺炎 B 一过性脑膜炎 C 念珠菌性食管炎 D 急性肾炎

11、当 HIV 侵入机体后，未进入发病期者被称为：（ ） A 艾滋病病人 B 艾滋病病毒感染者 C 窗口期 D 艾滋病期 12 成年人艾滋病无症状感染期平均时间为：（ ） A 5 年 B 8 年 C 12 年 D 15 年

13、艾滋病感染的年龄分布以下列哪个年龄组为主：（ ）

A、> 20 B 20~40 C 40~50 D <50

14、对于 HIV / AIDS 的诊断最重要的根据是：（ ）

A、具有高危行为 B 经确认 HIV 抗体阳性 C 临床表现 D A+C

15、我国目前 AIDS 传播方式中所占比例最高的是：（ ）

A、异性接触 B 母婴传播 C 输血 D 共用针具注射毒品

二、是非题

1、感染 HIV 的人是艾滋病的唯一传染源。（ ）

2、使用安全套在很大程度上可以预防艾滋病感染。（ ）

3、两次初筛试验抗体阳性即可确诊 HIV 感染。（ ）

4、HIV 急性感染期中，患者不具备传染性，无任何症状。（ ）

5、如母亲为艾滋病人，其新生儿血中 HIV 抗体阳性，即可确诊是感染了 HIV。（ ）

6、一般用于乙型肝炎的消毒药物，完全可以用于艾滋病病毒的消毒。（ ） 77、艾滋病病毒的感染有明显的季节性。（ ）

8、抗病毒治疗主要是抑制病毒在体内复制，目前主张联合用药。（ ）

9、目前我国的艾滋病病毒主要为 HIV-1 型。（ ）

10、艾滋病属于甲类传染病。（ ）

艾滋病部分试题答案

一、单项选择题

1、C 2 D 3 B 4 D 5 C 6 D 7 D 8 B 9 C 10 D 11 B 12 B 13

B 14 B 15 D

二、是非题

1、是 2是 3非 4非 5非 6是 7非 8是 9是 10非

一、单项选择题

1、霍乱的病原体形状为：（ ）

A、杆菌 B弧菌 C球菌 D螺旋体

2、按传染病防治法霍乱为：（ ）

A、甲类传染病 B乙类传染病 C丙类传染病 D未被列入分类

3、霍乱属：（ ）

A、国家检疫传染病 B地区检疫传染病 C国际检疫传染病 D局部地区检疫传染病

4、霍乱的传染源哪项不正确：（ ）

A、轻型患者 B隐性感染者 C带菌者 D来自流行区的人

5、目前引起霍乱暴发流行的菌株属于：（ ）

A、O1 群古典生物型 B O1 群埃尔托生物型和 O139 群

C、O1 群古典生物型和 O139 群 D O1 群和 O22 群

6、霍乱流行特征不包括：（ ）

A、突然暴发 B传播快 C可引起全球性大流行 D呈明显季节性

7、有关霍乱的临床分期哪项不正确：（ ）

A、吐泻期 B脱水期 C恢复期 D循环衰竭期

8、下列哪项不符合霍乱诊断条件：（ ）

A、有腹泻表现，粪培养阳性

B、流行区出现典型霍乱症状及体征，双份血清抗体滴度呈 4 倍以上上升者

C、粪培养阳性前 5 天有腹泻症状者

D、非流行区出现呕吐、腹泻表现，但无流行病学史者

9、霍乱的治疗原则不包括：（）

A、严格隔离 B 预防治疗 C 及时补液 D 抗菌治疗

10、霍乱的预防措施中哪项不正确：（）

A、普遍预防服用抗菌药物 B 建立腹泻肠道门诊 C 加强引水消毒和食品管理 D 疫苗接种

11、典型霍乱患者脱水期不包括哪种表现：（）

A、循环衰竭 B 代谢性酸中毒 C 电解质平衡紊乱 D 首先发生抽搐、昏迷

12、典型霍乱患者血常规检查不出现哪种结果：（）

A、红细胞计数升高 B 淋巴细胞比率上升 C 白细胞升高 D 血红蛋白升高

13、吐泻期典型霍乱患者临床表现不包括：（）

A、腹泻时常有里急后重感 B 腹泻为首发症状 C 发热少见

D、严重患者出现“米泔水”样排泄物

14、关于霍乱患者补液治疗哪项不合理：（）

A、轻度失水以口服补液为主 B 液体多选择 541 溶液

C、重度脱水通常采用两条静脉通道补液 D 所有患者均采用静脉补液

15、切断霍乱传播途径中不合理的措施为：（）

A、不去疫区旅游 B 改善卫生设施 C 加强饮水消毒和食品管理 D 消灭苍蝇等传播媒介

二、是非题

1、霍乱的病原体为革兰氏阴性菌。（）

2、霍乱为烈性肠道传染病。（）

3、人群对霍乱病原体不存在普遍易感性。（）

4、霍乱病原体在自然环境中存活时间不长。（）

5、霍乱病原体对消毒剂敏感。（）

- 6、夏秋季不是我国霍乱流行季节。（）
- 7、霍乱患者均出现“米泔水”样呕吐、腹泻物。（）
- 8、纠正脱水是治疗霍乱的关键环节之一。（）
- 9、抗菌药物的应用对霍乱的治疗至关重要。（）
- 10、典型霍乱患者脱水期可出现循环衰竭。（）

霍乱部分试题答案

一、单项选择题

- 1、B 2A 3C 4D 5B 6D 7D 8D 9B 10A 11D 12B 13
A 14D 15A

二、是非题

- 1、是 2是 3非 4非 5是 6非 7非 8是 9非 10是

一、单项选择题

- 1、鼠疫是主要通过下列哪种媒介传播的自然疫源性烈性传染病：（）
- A、野鼠 B鼠蚤 C蚊子 D家鼠
- 2、鼠疫杆菌属哪种细菌：（）
- A、革兰氏染色阴性需氧菌 B革兰氏染色阴性厌氧菌
C、革兰氏染色阳性需氧菌 D革兰氏染色阳性厌氧菌
- 3、鼠疫属于国家哪种法定传染病：（）
- A、甲类 B乙类 C丙类 D丁类
- 4、发现鼠疫疑似病例后，应以最快的通讯方式向当地疾病预防控制中心报告，报告的时限为：（）
- A、城市2小时内，农村4小时内 B城市4小时内，农村6小时内
C、城市6小时内，农村12小时内 D城市12小时内，农村24小时内
- 5、鼠疫分型中病死率极高，最严重的临床类型是：（）

A、肺鼠疫 B 腺鼠疫 C 败血症型鼠疫 D 肠鼠疫

6、鼠疫检疫属：（）

A、国家检疫传染病 B 地区检疫传染病 C 局部地区检疫传染病 D 国际检疫传染病

7、鼠疫杆菌在外界环境中抵抗力：（）

A、弱 B 强 C 一般 D 极强

8、鼠疫杆菌对一般消毒剂：（）

A、不敏感 B、敏感 C、一般 D、极敏感

9、哪一项不是鼠疫的传播途径：（）

A、鼠蚤叮咬 B、呼吸道 C、输血 D、皮肤粘膜

10、关于鼠疫的流行特点哪项不正确：（）

A、有明显的季节性 B 爆发流行多见

C、与鼠类活动和鼠蚤繁殖有关 D 有明显的地方性

11、除轻型鼠疫外其它各型临床表现不包括：（）

A、寒战、高热 B 剧烈头痛和神志改变 C 皮肤粘膜出血 D 均有淋巴结肿大

12、鼠疫患者血常规检查不出现哪种结果：（）

A、白细胞降低 B、白细胞升高 C、血小板降低 D、血色素降低

13、关于鼠疫的治疗哪项不合理：（）

A、隔离患者 B、抗菌药物的应用 C、肿大淋巴结切开排脓需待软化局限后 D、以对症治疗为主

14、有关鼠疫的诊断哪项不正确：（）

A、流行病学资料 B、临床表现 C、培养获得病原菌 D、淋巴结活检

15、预防鼠疫措施哪项不合理：（）

A、加强疫区管理 B、疫区人群普遍预防应用抗菌药物 C、灭鼠、灭蚤 D、疫苗接种

二、是非题

- 1、人群对鼠疫杆菌普遍易感。 ()
- 2、肺鼠疫患者胸部 X 线表现与病情严重程度极不一致。 ()
- 3、鼠疫潜伏期为 1 周左右，曾进行预防接种者可延长至 3 周。 ()
- 4、鼠疫患者急性期间隔两周的血清抗体滴度呈 4 倍以上增高，有诊断价值。 ()
- 5、鼠疫疫苗一般 1 年接种一次，必要时 6 个月后再接种一次。 ()
- 6、鼠疫的主要传播途径是经呼吸道飞沫传播。 ()
- 7、腺鼠疫最为常见。 ()
- 8、各型鼠疫的病程一般均在 1 周左右。 ()
- 9、鼠疫确诊的唯一依据是培养获得病原菌。 ()
- 10、青霉素类抗生素治疗鼠疫最为有效。 ()

鼠疫部分试题答案

一、单项选择题 1、B2、A3、A4、C5、A6、D7、A8、B9、C10、B11、D12、A13、D1415B

二、是非题 1、是 2、非 3、非 4、是 5、是 6、非 7、是 8、是 9、非 10、非

人禽流感部分

一、单项选择题

- 1、关于人禽流感的描述下列哪一项是错误的： ()
A、病原体为甲型流感病毒 B 人、禽、畜共患疾病
C、人流感病毒毒素与禽流感病毒毒素不同。 D 病禽及健康带毒的禽是其主要传染源。
- 2、对禽流感病毒描述下列哪项是错误的： ()
A、是甲型流感病毒 B 可分为高致病性、低致病性和非致病性
C、变异性大 D 对人类不致病
- 3、禽流感的主要传播途径是： ()
A、密切接触传播 B 空气飞沫传播 C 粪-饮水-口传播 D 虫媒传播

传染性非典型性肺炎部分

一、单项选择题

1、传染性非典型性肺炎的英文名称缩写为：()

A、AIDS B SARS C ARDS D HFRS

2、传染性非典型性肺炎的病原体为：()

A、轮状病毒 B 冠状病毒 C、衣原体 D、支原体

3、传染性非典型性肺炎的主要传染源为：()

A、隐性感染者 B、患者 C 潜伏期感染者 D、慢性感染者

4、传染性非典型性肺炎的人间传播途径不包括：()

A、近距离飞沫传播 B 接触传播 C、气溶胶传播 D、虫媒传播

5、2003 年我国传染性非典型性肺炎最早发生的地区为：()

A、北京 B 广东 C、香港 D、内蒙古

6、传染性非典型性肺炎的主要临床表现有：()

A、持续性高热 B、头痛、全身酸痛、乏力 C、干咳、少痰 D、呼吸道卡他症状

7、对传染性非典型性肺炎病人发病后的密切接触者，应自与病人最后接触之日起，进行医学观察天数为：()

A、7 B 10 C 14 D 21

8、传染性非典型性肺炎的预防措施不包括：()

A、隔离病人 B、密切接触者的医学观察 C 注射疫苗 D、加强疫情监测报告

9、下列哪一项不是传染性非典型性肺炎的主要个人防护措施：()

A、加强工作场所和居室通风 B、注意个人卫生 C、通过适量运动增强肌体免疫力
D、注射干扰素

10 10 目前传染性非典型性肺炎最主要治疗措施为：()

A、对症支持治疗 B、抗病毒治疗 C、激素治疗 D、抗菌治疗

- 1、传染性非典型性肺炎又称为呼吸窘迫综合征。()
- 2、传染性非典型性肺炎的病毒对外界抵抗力较弱。()
- 3、传染性非典型性肺炎的主要传播途径为消化道传播。()
- 4、传染性非典型性肺炎的主要传染源为隐性感染者。()
- 5、传染性非典型性肺炎的重症患者多为儿童。()
- 6、传染性非典型性肺炎病人接触史是该病诊断的主要依据之一。()
- 7、呼吸道卡他症状是传染性非典型性肺炎的主要临床表现之一。()
- 8、传染性非典型性肺炎的主要治疗措施为隔离和对症支持治疗。() 传染性非典型性肺炎患者外周血白细胞总数明显升高。()
- 10、胸片 X 线检查对于传染性非典型性肺炎的诊断非常重要。()
- 11、对传染性非典型性肺炎发热超过 38.5℃ 患者,应立即使用大剂量肾上腺皮质激素治疗。
- 12、收治传染性非典型性肺炎患者的病区应与其它病区分开。()
- 13、家属可探视陪护传染性非典型性肺炎病人。()
- 14、传染性非典型性肺炎疫苗已研制成功,可用于预防。()
- 15、传染性非典型性肺炎是我国法定的乙类传染病。()

传染性非典型性肺炎部分试题答案

一、单项选择题

1、B 2 B 3 B 4 D 5 B 6、A 7 C 8 C 9 D 10 A

二、是非题

1、非 2、是 3、非 4、非 5、非 6、是 7、非 8、是 9、非 10、是 11、非 12、是 13、非 14、非 15 是

流行性感部分

单项选择题

1、流行性感冒是： ()

- A、消化道传染病 B、呼吸道传染病 C、虫媒传染病 D、自然疫源性传染病
- 2、流行性感的高发季节为：（）
- A、夏秋季 B、秋冬季 C、冬春季 D、春夏季
- 3、流行性感冒的典型临床表现不包括：（）
- A、高热伴畏寒或寒颤 B、头痛、肌痛、乏力 C、急性热病容 D、腹痛、腹泻
- 4、流行性感冒确诊的主要依据是：（）
- A、发病季节 B、呼吸道症状轻微而全身中毒症状重 C、病毒分离 D、血凝抑制实验
- 5、流行性感冒主要治疗措施不包括：（）
- A、呼吸道隔离 B、解热镇痛及支持 C、抗菌治疗 D、金刚烷胺等抗病毒治疗
- 6、流行性感冒的病原是：（）
- A、细菌 B、病毒 C、衣原体 D、支原体
- 7、流行性感冒疫情监测的主要目的不包括：（）
- A、及早发现病原变异 B、及早发现病人 C、及早采取预防措施 D、确定疫苗接种对象
- 8、流行性感冒的预防措施中下列哪项是错误的：（）
- A、对流行性感冒患者进行隔离和治疗 B、流行性感冒流行前接种流感疫苗
C、流行前给所有感冒人群使用金刚烷胺进行药物预防 D、减少公众集会活动
- 9、关于流行性感冒下列哪项是错误的：（）
- A、由流行性感冒病毒引起 B、流行性感冒病毒易发生变异
C、临床表现上呼吸道症状较重 D、发热及全身中毒症状较重
- 10、关于流行性感冒下列哪项是错误的：（）
- A、人群对流感病毒普遍易感 B、持续高热、剧烈咳嗽、呼吸急促
C、抗菌治疗无效 D、流感患者愈后可获得终生免疫力

二、是非题

- 1、流行性感胃是由病毒引起的急性呼吸道传染病。（）
- 2、流行性感胃的易感人群为儿童和老年人。（）
- 3、流行性感胃易形成大流行。（）
- 4、流行性感胃的病原体变异性小。（）
- 5、流行性感胃的主要传染源包括病人和隐性感染者。（）
- 6、流行性感胃是急性呼吸道传染病，上呼吸道症状如鼻塞、流涕等较全身中毒症状如发热、全身酸痛更明显。（）
- 7、流行性感胃患者血常规化验结果为白细胞总数减少，中性粒白细胞相对增多。（）
- 8、血清学检查对流感的诊断无明显意义。（）
- 9、流感病毒感染可引起原发性病毒性肺炎，且病情重。（）
- 10、卧床休息是流行性感胃高热患者的重要治疗措施之一。（）
- 11、目前还没有特效的抗流感病毒的治疗药物。（）
- 12、轻症流行性感胃患者不需要隔离。（）
- 13、流行性感胃流行期间应减少或暂停大型集会。（）
- 14、经常通风，保持室内空气清洁新鲜是预防流行性感胃的重要措施之一。（）
- 15、性感胃灭活疫苗的主要接种对象是少年儿童。（）

流行性感胃部分试题答案

一、单项选择题

1、B 2C 3D 4C 5C 6B 7D 8C 9C 10D 二、是非题

1、是 2非 3是 4非 5是 6非 7非 8非 9是 10是 11是 12非 13是
14、是 15非

肺结核部分

一、单项选择题

1、传染性肺结核指：（）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/178037023076006036>