

2023-24 年浙江省玉环县《执业药师之西药专业二》资格考试必刷 200 题题库（实用）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2015 年真题）用于低分子肝素过量时解救的药品是（ ）。

- A: 维生素 K1
- B: 氨甲环酸
- C: 酚磺乙胺
- D: 鱼精蛋白

答案：D

2. 抑制微管聚合，阻碍纺锤体的形成

- A: 他莫昔芬
- B: 紫杉醇
- C: 羟喜树碱
- D: 长春碱

答案：D

3. 属于广谱抗病毒药物的是

- A: 阿昔洛韦
- B: 阿糖腺苷
- C: 奥司他韦
- D: 干扰素

答案：D

4. 以上属于成瘾产妇的新生儿戒断症状的是

- A: 惊厥、震颤、反射加速、发热
- B: 哈欠、打喷嚏、流涕、出汗
- C: 胃痉挛、心动过速、极度疲乏
- D: 神经过敏、失眠、恶心、呕吐

答案：A

5. 对其他药物不能控制的顽固性癫痫仍有效的是

- A: 丙戊酸钠
- B: 乙琥胺
- C: 苯妥英钠
- D: 卡马西平

答案：A

6. 对氨基水杨酸抗结核菌作用原理是()

- A: 干扰叶酸合成
- B: 抑制 DNA 回旋酶
- C: 形成 NAD 的同系物，抑制结核菌生长
- D: 抑制蛋白质合成

答案：C

7. 属于治疗固醇性胆囊结石的是

- A: 山莨菪碱
- B: 胶体果胶铋
- C: 多潘立酮
- D: 熊去氧胆酸

答案：D

8. 拮抗双香豆素类过量引起出血的适宜解毒药物是

- A: 氨甲环酸
- B: 鱼精蛋白
- C: 氨甲苯酸
- D: 维生素 K

答案：D

9. (2020 年真题) 属于一线抗结核分枝杆菌的药物是

- A: 莫西沙星、卡那霉素、卷曲霉素
- B: 异烟肼、阿米卡星、对氨基水杨酸
- C: 异烟肼、吡嗪酰胺、乙胺丁醇
- D: 异烟肼、利福平、莫西沙星

答案：C

10. (2017 年真题) 具有留钾作用的利尿药是 ()

- A: 甘露醇
- B: 甘油果糖
- C: 去氨加压素
- D: 螺内酯

答案：D

11. 可拮抗维生素 B

- A: 异烟肼
- B: 丙磺舒
- C: 雌激素
- D: 糖皮质激素

答案：A

12. 物质代谢过程中催化"一碳单位"转移反应的辅酶组成成分是

- A: 叶酸
- B: 维生素 A
- C: 维生素 B
- D: 维生素

答案：A

13. 青霉素的抗菌谱不包括

- A: 脑膜炎双球菌
- B: 破伤风杆菌
- C: 肺炎球菌
- D: 伤寒杆菌

答案：D

14. 辅助治疗不孕症的维生素是

- A: 维生素 B6
- B: 烟酸
- C: 维生素 B2
- D: 维生素 E

答案：D

15. (2017 年真题) 可能引起持续性干咳的抗高血压药是 ()

- A: 氨氯地平
- B: 硝普钠
- C: 阿利克仑(阿利吉仑)
- D: 卡托普利

答案：D

16. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食、增加运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片 20mg/d 治疗。若采用强化治疗，辛伐他汀片的最大日剂量是()。

- A: 40mg
- B: 80mg
- C: 20mg
- D: 100mg

答案：B

17. 与神经-肌肉阻滞剂合用，可加重神经-肌肉阻滞作用的是

- A: 头孢氨苄
- B: 阿莫西林
- C: 克拉霉素
- D: 阿米卡星

答案：D

18. (2020 年真题) 下列药动学/药效学 (PK/PD) 参数中，适用于浓度依赖型抗菌药物的评估指标

- A: 血浆药时曲线下面积与血浆达峰时间比值 (AUC/T_{max})
- B: 血浆药物峰浓度与达峰时间比值 (C_{max}/T_{max})
- C: 血浆药物峰浓度与最低抑菌浓度比值 (C_{max}/MIC)
- D: 血浆药物半衰期 (t_{1/2})

答案：C

19. 适用于轻、中度心力衰竭及左、右心室充盈量高的患者的是

- A: 米力农
- B: 卡维地洛

C: 氢氯噻嗪

D: 氯沙坦

答案: C

20. 与硝酸酯类药物联合应用发生严重低血压的药物是

A: 去甲肾上腺素

B: 西地那非

C: 丙酸睾酮

D: 坎利酮

答案: B

21. 下列哪种药物与碳酸钙合用时易发高钙血症()

A: 阿莫西林

B: 噻嗪类利尿药

C: 四环素

D: 氧化镁

答案: B

22. 又称为腺嘌呤，是生物体内辅酶与核酸的组成和活性成分，具有刺激骨髓白细胞增生作用的是

A: 丙酸诺龙

B: 维生素 B₄

C: 鲨肝醇

D: 小檗胺

答案: B

23. 异甘草酸镁作为保护肝细胞药的作用机制是

A: 降低血清丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 水平

B: 作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用

C: 促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞

D: 通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用

答案：D

24. 影响疟原虫叶酸代谢过程的抗疟药是

A: 青蒿素

B: 乙胺嘧啶

C: 伯氨喹

D: 奎宁

答案：B

25. (2017 年真题) 可导致新生儿药物性黄疸的是 ()

A: 阿莫西林

B: 兴孢他啶

C: 林可霉素

D: 磺胺嘧啶

答案：D

26. 利尿作用最强，特别当急、慢性肾衰竭(肌酐清除率 $<30\text{ml/min}$)时可作为首选治疗的利尿药为 ()

A: 噻嗪类利尿药

B: 留钾利尿药

C: 碳酸酐酶抑制剂

D: 袢利尿药

答案：D

27. 属于肝药酶诱导剂，与华法林合用会减弱后者抗凝作用的药物是

- A: 氯苯那敏
- B: 苯妥英钠
- C: 唑吡坦
- D: 丙戊酸钠

答案：B

28. 属于长效 β

- A: 沙美特罗
- B: 布地奈德
- C: 多索茶碱
- D: 沙丁胺醇

答案：A

29. 抗菌谱较广，还可用于治疗自身免疫性疾病

- A: 丝裂霉素
- B: 阿霉素
- C: 环磷酰胺
- D: 放线菌素 D

答案：C

30. 属于吗啡的前药，过量或长期使用易产生成瘾性的是

- A: 氨溴索
- B: 右美沙芬
- C: 可待因
- D: 苯丙哌林

答案：C

31. 降压时常见干咳的不良反应，发生率约为 20% 的药物是

- A: 硝普钠
- B: 硝苯地平
- C: 烟酸
- D: 卡托普利

答案：D

32. (2018 年真题) 属于肾上腺受体激动剂的降眼压药是 ()

- A: 地匹福林
- B: 毛果芸香碱
- C: 噻吗洛尔
- D: 拉坦前列素

答案：A

33. 与氯吡格雷合用，竞争 CYP2C19，使用氯吡格雷患者血栓不良反应事件增多的药物是

- A: 雷贝拉唑
- B: 泮托拉唑
- C: 奥美拉唑
- D: 西咪替丁

答案：C

34. 选择性抑制 COX-2 的药物是

- A: 塞来昔布
- B: 吲哚美辛
- C: 布洛芬
- D: 对乙酰氨基酚

答案：A

35. 抗菌活性强，并对 β -内酰胺酶高度稳定，属于碳青霉烯类的抗菌药物是()。

- A: 头孢美唑
- B: 头孢吡肟
- C: 亚胺培南
- D: 氨曲南

答案：C

36. 与其他抗真菌药无交叉耐药性的棘白霉素类抗真菌药是

- A: 卡泊芬净
- B: 两性霉素
- C: 氟胞嘧啶
- D: 阿糖胞苷

答案：A

37. 临床上最常用的内分泌治疗药物是

- A: 他莫昔芬
- B: 雄激素
- C: 氨氯米特
- D: 雌激素

答案：A

38. 阿托品禁用于

- A: 胆绞痛
- B: 全身麻醉前给药
- C: 青光眼

D: 遗尿症

答案: C

39. 12%复方氨基酸注射液（18AA）的静脉滴速为

A: 不超过 40 滴 / 分

B: 滴速 80~100 滴 / 分

C: 不超过 15 滴 / 分

D: 滴速 20~30 滴 / 分

答案: D

40. 与吲达帕胺合用，可导致心律失常的是

A: 多巴胺

B: 考来烯胺

C: 胺碘酮

D: 拟交感药

答案: C

41. 叶酸可用于巨幼细胞贫血治疗时，为改善神经症状，应同时并服

A: 叶酸

B: 维生素 B12

C: 维生素 B6

D: 烟酸

答案: B

42. β 受体阻滞药降低眼压的作用机制是()

A: 增加房水的葡萄膜巩膜通路的外流和引流

B: 增加房水经小梁网的外流，降低眼压

C: 缩小瞳孔，开放前房角

D: 减少房水生成，促进房水引流的排出

答案：D

43. 正在使用氯吡格雷的患者如需同时使用质子泵抑制剂，应选择()

A: 泮托拉唑

B: 埃索美拉唑

C: 兰索拉唑

D: 奥美拉唑

答案：A

44. 患者，男，70 岁。进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示胃多发性溃疡(A

A: 替米沙坦

B: 胶体果胶铋胶囊

C: 美托洛尔

D: 埃索美拉唑钠

答案：B

45. 下列属于窄谱抗菌药物的是

A: 氨曲南

B: 头孢唑啉

C: 环丙沙星

D: 阿莫西林

答案：A

46. 既有抗病毒作用又有抗肿瘤作用的免疫调节剂是

A: 干扰素

B: 硫唑嘌呤

C: 环磷酰胺

D: 更昔洛韦

答案: A

47. 静脉滴注给药用于真菌性肺炎的药物是

A: 灰黄霉素

B: 两性霉素 B

C: 酮康唑

D: 特比萘芬

答案: B

48. 治疗慢性心力衰竭，ACEI 和 () 联合有协同作用。

A: 噻嗪类利尿剂

B: 留钾利尿剂

C: 人促红素

D: β 受体阻断剂

答案: D

49. 下列何药对心房颤动无治疗作用

A: 胺碘酮

B: 利多卡因

C: 普萘洛尔

D: 奎尼丁

答案: B

50. 口服呋喃妥因可用于治疗 ()

A: 呼吸道感染

B: 肺感染

C: 尿路感染

D: 肠道感染

答案: C

51. 急性化脓性中耳炎患者，鼓膜穿孔后停用 2% 酚甘油滴耳，是因为酚甘油

A: 没有抗生素水溶液效果佳

B: 对鼓室黏膜及鼓膜有腐蚀作用

C: 仅有止痛作用

D: 油剂不易经穿孔进入中耳

答案: B

52. 对 G

A: 第三代头孢菌素

B: 第一代头孢菌素

C: 第四代头孢菌素

D: 第二代头孢菌素

答案: C

53. (2015 年真题) 属于雌激素受体阻断剂的抗肿瘤药是 ()。

A: 他莫昔芬

B: 丙酸睾酮

C: 炔雌醇

D: 阿那曲唑

答案: A

54. 具有利胆作用的药物是 ()

A: 熊去氧胆酸

- B: 肾上腺素
- C: 甲氧氯普胺
- D: 阿托品

答案：A

55. 可引起肌痛、骨关节病损、跟腱炎症和跟腱断裂

- A: 克霉唑
- B: 环丙沙星
- C: 灰黄霉素
- D: 咪康唑

答案：B

56. 临床常用的巨幼红细胞性贫血治疗药物是

- A: 肝素
- B: 维生素 K
- C: 维生素 B12
- D: 香豆素类

答案：C

57. β -内酰胺类抗生素的抗菌机制是

- A: 影响叶酸代谢
- B: 抑制蛋白质合成的全过程
- C: 影响胞浆膜的通透性
- D: 抑制细菌细胞壁的合成

答案：D

58. 主要作用是抗部分革兰阴性杆菌和抗革兰阳性菌的青霉素是

- A: 替莫西林

- B: 甲氧西林
- C: 哌拉西林
- D: 阿莫西林

答案：D

59. 降低肾素活性最强的药物是

- A: 卡托普利
- B: 普萘洛尔
- C: 硝苯地平
- D: 可乐定

答案：B

60. (2016 年真题) 应用高剂量的 β_2 受体激动剂可导致的严重典型不良反应是

- A: 高钙血症
- B: 低钙血症
- C: 低钾血症
- D: 低镁血症

答案：C

61. 对于万古霉素，描述错误的是()

- A: 对革兰阴性杆菌和真菌有一定作用
- B: 作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成
- C: 口服给药可用于难辨梭杆菌性假膜性肠炎
- D: 可用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染

答案：A

62. 常在用药 1 周后出现刺激性干咳的药物是

- A: 氨氯地平
- B: 卡托普利
- C: 地高辛
- D: 哌唑嗪

答案：B

63. 甲氧苄啶联用利福平使

- A: 半衰期缩短
- B: 肾毒性增加
- C: 抗凝作用增强
- D: 白细胞减少风险增加

答案：A

64. 属于芳香化酶抑制剂，用于治疗乳腺癌

- A: 来曲唑
- B: 卡莫氟
- C: 羟喜树碱
- D: 甲氨蝶呤

答案：A

65. 可导致视神经炎的抗结核药

- A: 吡嗪酰胺
- B: 乙胺丁醇
- C: 利福喷丁
- D: 利福平

答案：B

66. 以下通过增加组织与肝脏对胰岛素的敏感性而降糖的是()

- A: 利拉鲁肽
- B: 二甲双胍
- C: 瑞格列奈
- D: 吡格列酮

答案：D

67. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次；阿卡波糖 0.1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

- A: 呋塞米
- B: 乙酰唑胺
- C: 呋达帕胺
- D: 氨苯蝶啶

答案：A

68. 通过与敏感真菌细胞膜上的甾醇（主要为麦角固醇）相结合，引起细胞膜的通透性改变，导致细胞内重要物质如钾离子、核苷酸和氨基酸等外漏，从而破坏细胞的正常代谢抑制其生长的是

- A: 两性霉素
- B: 氟胞嘧啶
- C: 万古霉素
- D: 伊曲康唑

答案：A

69. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1 / 18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

- A: 对增殖和非增殖细胞均有杀伤作用
- B: 曾用过表柔比星的患者可更换多柔比星
- C: 典型不良反应是骨髓抑制和心脏毒性
- D: 属于蒽环类抗肿瘤药物

答案：B

70. 容易引起球后神经炎的抗结核药物是

- A: 利福平
- B: 链霉素
- C: 乙胺丁醇
- D: 异烟肼

答案：C

71. 临床上用于控制子痫发作的是

- A: 硫酸镁
- B: 卡巴西平
- C: 苯巴比妥
- D: 苯妥英钠

答案：A

72. 抗酸作用较强、快而持久，可引起反跳性胃酸分泌增多

- A: 三硅酸镁
- B: 碳酸钙
- C: 氢氧化铝

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 氢氧化镁

答案：B

73. (2017 年真题) 可能导致牙龈增生的药物是 ()

- A: 普伐他汀
- B: 拉西地平
- C: 依诺肝素
- D: 普萘洛尔

答案: B

74. 与两性霉素 B 合用可减少复发率产生协同作用的药物是 ()

- A: 阿昔洛韦
- B: 氟胞嘧啶
- C: 酮康唑
- D: 灰黄霉素

答案: B

75. 老年人对苯二氮 (卞卓) 类药较为敏感，用药后可致平衡功能失调，觉醒后可发生步履蹒跚、思维迟缓等症状，在临床上称为

- A: 震颤麻痹综合征
- B: “宿醉”现象
- C: 老年期痴呆
- D: 戒断综合征

答案: B

76. (2018 年真题) 可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是 ()

- A: 预混胰岛素注射液
- B: 甘精胰岛素注射液
- C: 普通胰岛素注射液
- D: 精蛋白锌胰岛素注射液

答案：C

77. 影响骨和牙齿生长的是

- A: 氯霉素
- B: 青霉素
- C: 左氧氟沙星
- D: 四环素

答案：D

78. 与其他 NSAID 合用时疗效并不增强，但可增加其他部位出血风险的是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 阿司匹林
- C: 吲哚美辛
- D: 塞来昔布

答案：B

79. （2020 年真题）可以碱化尿液，用于代谢性酸中毒的药物是

- A: 氯化钠
- B: 氯化铵
- C: 硫酸镁
- D: 乳酸钠

答案：D

80. 巨幼细胞贫血可选用

- A: 香豆素类
- B: 肝素
- C: 维生素 B12

D: 维生素 K1

答案：C

81. 下列药物中与酚磺乙胺合用可引起中毒的是()

A: 氨甲苯酸

B: 氨基己酸

C: 维生素 K

D: 维生素 C

答案：B

82. 用于单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的 2 型糖尿病的降糖药物是

A: 阿卡波糖

B: 格列本脲

C: 罗格列酮

D: 二甲双胍

答案：D

83. 属于电解质补充药，可用于低钾血症和洋地黄中毒引起的心律失常的药物是

A: 异甘草酸镁

B: 门冬氨酸钾镁

C: 多烯磷脂酰胆碱

D: 双环醇

答案：B

84. (2015 年真题) 属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是 ()。

A: 氟西汀

B: 阿米替林

C: 吗氯贝胺

D: 文拉法辛

答案: A

85. 抗利尿作用最明显的阿片类镇痛药物是

A: 吗啡

B: 苯巴比妥

C: 地西泮

D: 苯妥英钠

答案: A

86. (2015 年真题) 属于糖皮质激素禁忌症的是 ()。

A: 过敏性皮炎

B: 严重高血压

C: 类风湿性关节炎

D: 再生障碍性贫血

答案: B

87. 体内缺乏维生素 E 会导致

A: 夜盲症

B: 佝偻病

C: 不孕症

D: 脚气病

答案: C

88. 通过抑制胆碱酯酶活性，提高脑内乙酰胆碱含量的药物是

A: 艾地苯醌

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 阿尼西坦

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/178040124051007022>