

安徽省濉溪县 2024《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题王牌题库含答案（培优）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 促使脓性痰中 DNA 分解，使脓痰黏度下降的药物是

- A: 糜蛋白酶
- B: 乙酰半胱氨酸
- C: 氨溴索
- D: 表面活性剂

答案：A

2. （2015 年真题）使用强心苷的心力衰竭患者，不宜选用的药品是（ ）。

- A: 果糖
- B: 氯化钙
- C: 氯化钾
- D: 硫酸镁

答案：B

3. 属于孕激素类的是

- A: 甲地孕酮
- B: 他莫昔芬
- C: 己烯雌酚
- D: 睾酮

答案：A

4. 禁用于妊娠妇女和小儿的药物是()

- A: 氨基糖苷类
- B: 氟喹诺酮类
- C: 头孢菌素类
- D: 大环内酯类

答案：B

5. (2015 年真题) 属于糖皮质激素禁忌症的是 ()。

- A: 严重高血压
- B: 过敏性皮炎
- C: 类风湿性关节炎
- D: 再生障碍性贫血

答案：A

6. 泛昔洛韦口服后代谢为

- A: 喷昔洛韦
- B: 更昔洛韦
- C: 阿昔洛韦
- D: 西多福韦

答案：A

7. 关于青霉素不良反应的说法不正确的是

- A: 可发生过敏性休克、荨麻疹、血管神经性水肿等
- B: 可引起接触性皮炎、血清病样反应等
- C: 局部刺激症状如注射部位疼痛、硬结较常发生
- D: 有明显的肾毒性和耳毒性

答案：D

8. (2019 年真题) 患者，女，13 岁，有哮喘病史，半年前月经初潮，周期 28 天经期持续 4-5 天，月经前两天疼痛明显，影响正常的学习和活动，诊断为原发性痛经，适宜该患者使用的缓解痛经的药物是 ()

- A: 布洛芬片
- B: 对乙酰氨基酚片
- C: 吲哚美辛栓
- D: 塞来昔布胶囊

答案: B

9. 患者女，59 岁，既往高脂血症病史 5 年，心功能 II 级。因发现血压升高 7 天入院。入院查体血压 172/95mmHg，心率 62 次 / 分。该患者目前服用的药物除抗高血压药外有辛伐他汀。

- A: 氢氯噻嗪
- B: 美托洛尔
- C: 特拉唑嗪
- D: 双氯芬酸

答案: A

10. 日晒时有光敏现象的药品是

- A: 头孢哌酮
- B: 多西环素
- C: 庆大霉素
- D: 加替沙星

答案: B

11. 已使用 ACEI / ARB / ARNI、 β 受体阻断剂、醛固酮受体阻断剂， β 受体阻断剂已达到目标剂量或最大耐受剂量，心率仍 ≥ 70 次 / 分钟时，可用

- A: 美托洛尔
- B: 伊伐布雷定
- C: 沙库巴曲缬沙坦
- D: 卡托普利

答案：B

12. 主要经胆汁排泄 (仅有 5% 左右经肾排泄)，可用于肾功能轻中度不全患者的磺酰脲类药物是 ()

- A: 格列喹酮
- B: 格列美脲
- C: 格列齐特
- D: 格列吡嗪

答案：A

13. 丙硫氧嘧啶最严重的不良反应是

- A: 胃肠道反应
- B: 头痛
- C: 关节痛
- D: 粒细胞缺乏症

答案：D

14. 药粉误入眼内可能引起或加重窄角型青光眼、眼睛疼痛或不适、短暂视物模糊、视觉晕轮或彩色影像的是

- A: 氨溴索
- B: 喷托维林

C: 噻托溴铵

D: 沙丁胺醇

答案: C

15. 解热镇痛药的作用机制是

A: 激动 M 受体

B: 抑制尿酸生成

C: 激动中枢阿片受体

D: 抑制前列腺素合成

答案: D

16. 可用于慢性活动性肝炎的治疗()

A: 复方氨基酸注射液(18AA)

B: 赖氨酸

C: 复方氨基酸注射液(3AA)

D: 精氨酸

答案: C

17. 单独应用时止吐作用相对较弱，主要作为辅助药物，用于减轻地塞米松所致焦虑和甲氧氯普胺所致静坐不能，也可用于减少预期性的化疗所致恶心呕吐的是

A: 氯丙嗪

B: 甲氧氯普胺

C: 帕洛诺司琼

D: 劳拉西泮

答案: D

18. 选择性抑制二氢叶酸还原酶，作用于叶酸合成第二步的是

- A: 莫西沙星
- B: 替硝唑
- C: 甲氧苄啶 (TMP)
- D: 磺胺甲噁唑 (SMZ)

答案: C

19. 复方炔诺酮片的主要避孕作用机制是()

- A: 使宫颈黏液变稠，精子不易进入宫腔
- B: 抑制子宫和输卵管活动，改变受精卵的运行速度
- C: 抑制子宫内膜正常增殖，不利于受精卵着床
- D: 通过反馈机制抑制排卵

答案: D

20. 羟甲唑啉滴鼻剂使用期间，可能发生的不良反应是

- A: 心率加快
- B: 鼻衄
- C: 血压下降
- D: 流量

答案: A

21. 长期大量使用可致泌尿系统尿酸盐、半胱氨酸盐或草酸盐结石的维生素是()

- A: 维生素 B6
- B: 维生素 A
- C: 维生素
- D: 维生素 B2

答案: C

22. 熊去氧胆酸的禁忌证不包括

- A: 高血压患者
- B: 哺乳期妇女
- C: 胆道完全梗阻
- D: 严重肝功能不全者

答案：A

23. 避免同时使用“蜡质”脱毛方法的药物()

- A: 维 A 酸
- B: 异维 A 酸
- C: 壬二酸
- D: 阿达帕林

答案：D

24. 角鲨烯环氧酶的非竞争性、可逆性抑制剂是

- A: 环吡酮胺
- B: 制霉菌素
- C: 特比萘芬
- D: 阿莫罗芬

答案：C

25. 作用于 γ -氨基丁酸受体的药物是

- A: 佐匹克隆
- B: 苯妥英钠
- C: 苯巴比妥
- D: 卡马西平

答案：A

26. 下列药物组合混合可减弱抗菌活性的是

- A: 青霉素+红霉素
- B: 青霉素+四环素
- C: 青霉素+阿米卡星
- D: 青霉素+氯霉素

答案：C

27. 天然的雌激素是()

- A: 雌二醇
- B: 黄体酮
- C: 炔雌醚
- D: 戊酸雌二醇

答案：A

28. 抗真菌药与糖皮质激素合用于皮肤病，感染症状消失后，应

- A: 再持续使用 1 个月
- B: 再持续使用 48h
- C: 立即停药，不得再用
- D: 再持续 1~2 周

答案：D

29. 患者，男，38 岁。因“发作性喘息”3 个月入院，发作时憋喘、全身大汗、端坐不能平卧，肺部可闻及哮鸣音。诊断为支气管哮喘，静脉滴注地塞米松。

- A: 吸入噻托溴铵
- B: 吸入沙丁胺醇
- C: 口服孟鲁司特
- D: 吸入沙美特罗

答案：B

30. (2019 年真题) 长期使用可引起听力减退、肾功能下降的抗结核药物是 ()

- A: 链霉素
- B: 利福平
- C: 吡嗪酰胺
- D: 乙胺丁醇

答案：A

31. 关于氨基己酸的描述，错误的是

- A: 不与血浆蛋白结合
- B: 在体内维持时间短，不代谢
- C: 口服吸收缓慢
- D: 在血中以游离状态存在

答案：C

32. 关于他汀类药物降脂特点的描述，错误的是

- A: 较弱的降低三酰甘油(TG)的作用
- B: 降低高密度脂蛋白胆固醇(HDL-ch)
- C: 降低血总胆固醇(TC)
- D: 降低血低密度脂蛋白胆固醇(LDL-ch)

答案：B

33. 与 α_1 受体阻断药无相互作用的药物是 ()

- A: 卡马西平
- B: 第三代头孢菌素
- C: 地尔硫

D: 西咪替丁

答案: B

34. 属于非噻吩并吡啶类二磷酸腺苷 (ADP) P2Y₁₂ 受体阻断剂的是

A: 双嘧达莫

B: 替格瑞洛

C: 替罗非班

D: 阿司匹林

答案: B

35. 哮喘急性发作首选的治疗药物是

A: 磷酸二酯酶抑制剂

B: 吸入性糖皮质激素

C: 白三烯受体阻断剂

D: 短效 B₂ 受体激动剂

答案: D

36. 主要经胆汁排泄的是

A: 头孢哌酮

B: 头孢噻肟

C: 阿莫西林

D: 庆大霉素

答案: A

37. 用于甲型和乙型流感的治疗，应及早在流感开始的第 1 或第 2 天开始治疗的药物是

A: 奥司他韦

B: 两性霉素 B

C: 膦甲酸钠

D: 制霉菌素

答案: A

38. 与呋喃妥因特性不符的叙述是()

A: 主要用于泌尿系感染

B: 碱性尿液中杀菌作用增强

C: 在小肠吸收迅速

D: 有广谱抗菌活性

答案: B

39. 外用糖皮质激素作用强度的比较，正确的是()。

A: 卤米松>地塞米松>氟轻松

B: 地塞米松>卤米松>氯轻松

C: 地塞米松>氟轻松>卤米松

D: 卤米松>氟轻松>地塞米松

答案: D

40. 下列关于氟尿嘧啶的说法，错误的是()

A: 应当先给予氟尿嘧啶，再用四氢叶酸

B: 与甲氨蝶呤合用，两者可产生协同作用

C: 与四氢叶酸合用时，可降低其毒性，提高其疗效

D: 用药期间不宜饮酒或同用阿司匹林类药物

答案: A

41. 属于第四代头孢菌素的药物的是()。

A: 头孢哌酮

B: 头孢吡肟

C: 头孢氨苄

D: 头孢拉定

答案：B

42. 抗生素类抗真菌药()

A: 两性霉素

B: 特比萘芬

C: 氟康唑

D: 阿莫罗芬

答案：A

43. 减少房水生成，治疗青光眼可选用

A: 乙酰唑胺

B: 呋塞米

C: 氢氯噻嗪

D: 螺内酯

答案：A

44. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、茶碱治疗。

A: 心律失常

B: 惊厥

C: 支气管痉挛

D: 血压下降

答案：A

45. 下列说法正确的是

A: 异丙托溴铵口服可提高疗效

- B: 长效 β_2 受体激动剂不适合初始用于快速恶化的急性哮喘发作
C: 氨茶碱可与青霉素合用
D: 沙美特罗适用于缓解支气管痉挛的急性症状

答案：B

46. 下述药物中属于缓解鼻黏膜充血引起的鼻塞、鼻出血的是()

- A: 过氧化氢
B: 盐酸麻黄碱
C: 酚甘油
D: 硼酸

答案：B

47. 用于血氨升高所致精神症状的治疗

- A: 复方氨基酸注射液(3AA)
B: 复方氨基酸(18AA)
C: 精氨酸
D: 赖氨酸

答案：C

48. 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的是

- A: 卡托普利
B: 普萘洛尔
C: 硝苯地平
D: 氯沙坦

答案：D

49. 用药过程中需要监护迟发性腹泻的是()

- A: 长春碱类

B: 多柔比星

C: 伊立替康

D: 紫杉醇

答案: C

50. (2017 年真题) 导致视神经炎的抗结核药的是 ()

A: 利福平

B: 吡嗪酰胺

C: 利福喷丁

D: 乙胺丁醇

答案: D

51. 全身性红斑狼疮宜用

A: 地塞米松

B: 氢化可的松

C: 泼尼松

D: 倍他米松

答案: C

52. 对甲氧西林耐药的葡萄球菌引起的感染有效的抗生素为

A: 万古霉素

B: 氨曲南

C: 哌拉西林

D: 阿莫西林

答案: A

53. 大剂量应用甲氨蝶呤后，可用 () 进行解救

A: 苯溴马隆

B: 亚叶酸钙

C: 别嘌醇

D: 丙磺舒

答案: B

54. 下列属于非选择性 β 受体阻断剂的是

A: 普萘洛尔

B: 比索洛尔

C: 美托洛尔

D: 阿替洛尔

答案: A

55. 异丙托溴铵的作用机制是

A: 阻断 α 受体

B: 阻断白三烯受体

C: 阻断 M 受体

D: 抑制磷酸二酯酶

答案: C

56. 肝素过量可选用的拮抗药是()

A: 氨甲苯酸

B: 鱼精蛋白

C: 维生素 K1

D: 葡萄糖酸钙

答案: B

57. (2015 年真题) 静脉滴注速度过快可能发生“红人综合征”的药品是()。

- A: 莫西沙星
- B: 夫西地酸
- C: 万古霉素
- D: 磷霉素

答案：C

58. 关于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的作用特点描述，不正确的是

- A: 用于餐后高血糖
- B: 口服吸收较少
- C: 易导致低血糖
- D: 适用于老年人

答案：C

59. 阿托品用于全麻前给药的目的是()

- A: 减少呼吸道腺体分泌
- B: 预防心动过缓
- C: 增强麻醉效果
- D: 减少麻醉药的用量

答案：A

60. 氨基糖苷类抗菌药无效的是()

- A: 铜绿假单胞菌
- B: 厌氧菌和肠球菌
- C: 需氧革兰阴性菌
- D: 结核杆菌

答案：B

61. 治疗弥散性血管内凝血(DIC)宜选用()

- A: 肝素
- B: 叶酸
- C: 阿司匹林
- D: 达比加群酯

答案：A

62. 适应证为仅用于治疗失眠的药物是

- A: 卡马西平
- B: 地西泮
- C: 氟西汀
- D: 佐匹克隆

答案：D

63. 长期大量服用维生素 A 会出现

- A: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等
- B: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症
- C: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象
- D: 视物模糊、疲乏、乳腺肿大

答案：C

64. 属于解毒类保肝药的是

- A: 还原型谷胱甘肽
- B: 多烯磷脂酰胆碱
- C: 双环醇
- D: 异甘草酸镁

答案：A

65. 促进微管的装配，抑制其解聚，从而使纺锤体失去正常功能，细胞有丝分裂停止的药物是

- A: 紫杉醇
- B: 吲哚美辛
- C: 长春碱类
- D: 他莫昔芬

答案：A

66. 对多巴胺描述正确的是()

- A: 是磷酸二酯酶抑制剂
- B: 可用于充血性心力衰竭等引起的休克综合征
- C: 对洋地黄和利尿药无效的心功能不全，多巴胺也无效
- D: 对其他拟交感胺类药物高度敏感的患者应该使用多巴胺

答案：B

67. 促消化的药物应()

- A: 定时内服
- B: 饭前内服
- C: 睡前内服
- D: 空腹内服

答案：B

68. 不可逆地抑制血小板 I 相和 II 相聚集的药物是

- A: 噻氯匹定
- B: 肝素
- C: 华法林
- D: 尿激酶

答案：A

69. 治疗轻度尿崩症可选用

- A: 呋塞米
- B: 氢氯噻嗪
- C: 螺内酯
- D: 乙酰唑胺

答案：B

70. 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

- A: 梭状芽孢杆菌
- B: 双歧杆菌
- C: 粪肠球菌
- D: 嗜酸乳杆菌

答案：A

71. （2019 年真题）育龄女性在无防护的性生活或避孕失败 72 小时内，宜使用的口服紧急避孕药是（）

- A: 复方醋酸环内孕酮（35 μ g/2mg）
- B: 炔雌醇去氧孕烯（30 μ g/150 μ g）
- C: 十一酸睾酮（40mg）
- D: 左炔诺孕酮（1

答案：D

72. （2021 年真题）舌下给药吸收迅速、起效最快，作为心绞痛急性发作首选的治疗药物是（）

- A: 硝酸甘油

- B: 硝酸异山梨酯
- C: 美托洛尔
- D: 单硝酸异山梨酯

答案：A

73. 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是()。

- A: 那格列奈
- B: 阿卡波糖
- C: 艾塞那肽
- D: 二甲双胍

答案：B

74. 患者，女，46 岁。以"口角歪斜 3 天"之主诉入院。3 天前洗澡冲凉后次日晨起刷牙时发现右口角漏水，右侧闭眼不紧，口角歪斜，伴右眼流泪。查体：大致正常。诊断：面神经麻痹(右侧)。医嘱：

- A: 苯妥英钠
- B: 卡马西平
- C: 伊曲康唑
- D: 苯巴比妥

答案：C

75. 能松弛前列腺和膀胱括约肌，很少发生低血压的抗前列腺增生症药为

- A: 乙酰唑胺
- B: 酚苄明
- C: 特拉唑嗪
- D: 坦洛辛

答案：D

76. 不属于升白细胞药物的是

- A: 非格司亭
- B: 粒细胞集落刺激因子
- C: 重组人促红素
- D: 肌苷

答案：C

77. （2016 年真题）华法林起效缓慢，深静脉栓塞治疗的初期，需同时联合使用的是

- A: 维生素 B2
- B: 维生素 B1
- C: 依诺肝素
- D: 维生素 B12

答案：C

78. （2015 年真题）下列药品中，属于酰胺类的脑功能改善及抗记忆障碍主要是（）。

- A: 胞磷胆碱
- B: 利斯的明
- C: 多奈哌齐
- D: 吡拉西坦

答案：D

79. 可导致新生儿的戒断症状和呼吸抑制的是

- A: 布地奈德
- B: 沙丁胺醇
- C: 可待因

D: 氨茶碱

答案: C

80. 体内代谢迅速,严重过量导致出血时,可用鱼精蛋白拮抗的药物是

A: 氯吡格雷

B: 肝素

C: 依诺肝素

D: 阿司匹林

答案: B

81. 袢利尿药主要作用于髓袢升支粗段,利尿作用强,其代表药物是()

A: 布美他尼

B: 托拉塞米

C: 呋塞米

D: 依他尼酸

答案: C

82. 门冬酰胺酶能抑制蛋白质的合成,使细胞停止于(),从而降低其对甲氨蝶呤的敏感性,限制甲氨蝶呤的骨髓毒性

A: G

B: G

C: M 期

D: G

答案: D

83. 对非磺酰脲类胰岛素促泌剂的描述正确的是

A: 此类药物不能单独服用

B: 此类药物需在餐前即刻服用

C: 格列美脲属于本类药物

D: 此类药物可降低 2 型糖尿病者的餐前血糖

答案: B

84. 不可用于降低眼压的药物是()

A: 毛果芸香碱滴眼液

B: 利福平滴眼剂

C: 拉坦前列素滴眼剂

D: 卡替洛尔滴眼剂

答案: B

85. 地高辛的主要适应证不包括

A: 慢性室性心律失常

B: 室上性心动过速

C: 急性心力衰竭

D: 慢性心力衰竭

答案: A

86. 可用作鼻黏膜保护的药物是

A: 复方薄荷油

B: 桃金娘油

C: 西地碘

D: 羟甲唑啉

答案: A

87. 与第二代溶栓酶相比，瑞替普酶的作用优势不包括()

A: 血浆半衰期长，栓塞开通率高，给药方便

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 给药较方便，可以为抢救患者赢得时间

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/178100066005007024>