

# 基层卫生人员适宜技术理论考核

基层卫生人员适宜技术理论考核.....	1
抗菌药物合理使用及多重耐药菌防控、微生物基础、突发公共卫生事.....	1
创伤救护四项技术、缝合拆线、清创换药.....	4
心肺复苏和海姆立克技术.....	6
预防接种、安全注射技术、生命体征监测（物理降温）技术.....	9
清洁、消毒及无菌、医院废物正确处置.....	11
职业防护、留置/更换导尿管.....	14
标本采集、鼻饲.....	16
胰岛素、快速血糖仪、防护用品.....	19
其他.....	24

## 抗菌药物合理使用及多重耐药菌防控、微生物基础、突发公共卫生事

1、下列不属于 $\beta$ -内酰胺类抗生素的是（ ）[单选题]。

- A、阿莫西林
- B、头孢克洛
- C、氨曲南
- D、链霉素✓

2、下列不属于四环素类的是（ ）[单选题]。

- A、替考拉宁✓
- B、四环素

C、多西环素

D、替加环素

3、下列不属于厌氧菌的是 ( ) [单选题]。

A、脆弱拟杆菌

B、金葡菌✓

C、艰难梭菌

D、产气荚膜梭菌

4、抗菌药物合理应用，不包括 ( ) [单选题]。

A、安全

B、便宜✓

C、有效

D、经济

5、下列抗菌药物使用频次不规范的是 ( ) [单选题]。

A、哌拉西林钠他唑巴坦钠 2.5gq12h

B、莫西沙星 0.4gqd

C、头孢唑肟 2.0gbid✓

D、苄星青霉素 120 万 Uqow

6、下列抗生素属于时间依赖性的是 ( ) [多选题]。

A、 $\beta$  - 内酰胺类✓

B、林可霉素类✓

C、红霉素✓

D、万古霉素✓

7、下列抗生素属于浓度依赖性的是 ( ) [多选题]。

A、氨基糖甙类✓

B、氟喹诺酮类✓

C、甲硝唑✓

D、阿齐霉素✓

8、下列属于多重耐药菌的是 ( ) [多选题]。

A、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 ( MRSA ) ✓

B、耐万古霉素肠球菌 ( VRE ) ✓

C、耐碳青霉烯类抗菌药物的肠杆菌科细菌 ( CRE ) ✓

D、产超广谱 $\beta$ -内酰胺酶 ( ESBLs ) 的细菌✓

E、多重/泛耐药的铜绿假单胞菌 ( MDR/PDR-PA ) ✓

9、抗菌药物分级原则 ( ) [多选题]。

A、一般使用级

B、非限制使用级✓

C、限制使用级✓

D、特殊使用级✓

10、下列属于突发公共卫生事件的是 ( ) [多选题]。

A、重大传染病疫情✓

B、危害严重的中毒事件✓

C、影响公共安全的放射性物质泄漏事件✓

D、群体性不明原因疾病✓

## 创伤救护四项技术、缝合拆线、清创换药

- 1、全身血量约等于自身体重的（ ）[单选题]。
  - A、5-6%
  - B、7-8%✓
  - C、8-10%
  - D、10-15%
- 2、下列关于创伤救护四项技术中“固定”技术说法错误的是（ ）[单选题]。
  - A、先救命、再治伤
  - B、应超关节固定、功能位
  - C、可以先整复骨折、脱位✓
  - D、止痛、保温、衬垫
- 3、现场搬运伤员的基本原则不包括下列哪项（ ）[单选题]。
  - A、及时
  - B、迅速
  - C、安全
  - D、便捷✓
- 4、下列关于换药的描述错误的是（ ）[单选题]。
  - A、手术后无菌的伤口，如无特殊反应，3~5天后第一次换药
  - B、感染伤口，分泌物较多，应隔日换药1次✓
  - C、新鲜肉芽创面，隔1~2天换药1次
  - D、烟卷引流伤口，每日换药1~2次，并在术后12~24小时转动烟卷，并适时拔除引流。
- 5、常见外伤的理想清创时间（ ）[单选题]。

A、伤后 8h 以内，手部伤口伤后 12h 以内✓

B、伤后 8h 以内，手部伤口伤后 24h 以内

C、伤后 12h 以内，手部伤口伤后 24h 以内

D、伤后 24h 以内，手部伤口伤后 48h 以内

6、创伤救护四项技术包括（ ）[多选题]。

A、止血✓

B、包扎✓

C、固定✓

D、搬运✓

7、止血方法（ ）[多选题]。

A、指压止血法✓

B、填塞止血法✓

C、加压包扎法✓

D、止血带法✓

8、下列关于创伤救护四项技术中“包扎”技术目的说法正确的是（ ）[多选题]。

A、压迫止血✓

B、保护伤口✓

C、减轻疼痛✓

D、减少污染✓

E、固定敷料、夹板✓

9、清创缝合的基本原则（ ）[多选题]。

A、无菌原则✓

B、尽量去除坏死、无功能的组织✓

C、保留正常、有功能的组织✓

D、争取达到组织的最完美对合✓

10、遇有下列情况，应延迟拆线（ ）[多选题]。

A、严重贫血、消瘦，轻度恶病质者✓

B、严重失水或水电解质紊乱尚未纠正者✓

C、老年患者及婴幼儿✓

D、咳嗽没有控制时，胸、腹部切口应延迟拆线。✓

## 心肺复苏和海姆立克技术

1、心脏骤停患者最佳抢救黄金时间是（ ）[单选题]。

A、2分钟

B、4分钟✓

C、6分钟

D、10分钟

2、心肺复苏指南中胸外按压的频率为（ ）[单选题]。

A、80-100次/分

B、100次/分

C、120次/分

D、100-120次/分✓

3、成人心肺复苏时胸外按压的深度为（ ）[单选题]。

A、至少胸廓前后径的一半

B、至少 3cm

C、5-6cm✓

D、4-5cm

4、海姆立克急救法施救者施救时着力点位于患者的（ ）[单选题]。

A、肚脐上两横指✓

B、肚脐下两横指

C、胸骨上两横指

D、胸骨下两横指

5、引起成人心脏骤停的最主要的原因是（ ）[单选题]。

A、冠心病✓

B、高血压

C、心肌炎

D、药物中毒

6、心肺复苏的有效指标有（ ）[多选题]。

A、颈动脉（大动脉）搏动恢复✓

B、自主呼吸恢复✓

C、散大瞳孔缩小✓

D、面色、口唇转为红润✓

E、意识丧失转为清晰✓

7、心脏骤停的临床表现（ ）[多选题]。

A、心音消失✓

B、瞳孔散大✓

C、意识丧失✓

D、面色苍白兼有青紫✓

E、脉搏消失✓

8、严重气道异物梗阻患者的典型特征有（ ）[多选题]。

A、口面色涨红✓

B、双手呈 V 字形掐脖✓

C、口大喊大叫

D、剧烈咳嗽

E、呕吐

9、室颤病人电除颤能量选择正确的是（ ）[多选题]。

A、单相波 360J✓

B、双相波 120-200J✓

C、单相波 480J

D、双相波 360J

E、单向波 200J

10、院外心肺复苏生存链包括（ ）[多选题]。

A、启动应急反应系统✓

B、高质量 CPR 和除颤✓

C、高级心肺复苏✓

D、心脏骤停恢复自主循环后治疗✓

E、康复✓



## 预防接种、安全注射技术、生命体征监测（物理降温）技术

1、我国推荐的新生儿乙肝疫苗免疫程序是“0、1、6”程序，第一剂和第二剂的间隔应（ ）天，第二剂和第三剂的间隔应（ ）天[单选题]。

- A、 $\geq 15 \geq 28$
- B、 $\geq 15 \geq 45$
- C、 $\geq 28 \geq 60$  ✓
- D、 $\geq 28 \geq 90$

2、坐位测血压时肱动脉应平于（ ）[单选题]。

- A、第二肋骨
- B、第三肋骨
- C、第四肋骨 ✓
- D、第五肋骨

3、皮下注射进针的深度为针梗的（ ）[单选题]。

- A、 $1/2 \sim 2/3$  ✓
- B、 $1/4 \sim 1/3$
- C、 $1/5 \sim 1/4$
- D、 $3/4 \sim 3/5$

4、测量肛温时，护士应将肛表插入肛门（ ）[单选题]。

- A、1~2cm
- B、2~3cm
- C、3~4cm ✓
- D、4~5cm

5、以下不是冷疗禁忌部位的是 ( ) [单选题]。

- A、枕后
- B、腹部
- C、腹股沟✓
- D、足底

6、发热病人的初步病情评估和生命体征的检测 ( 物理降温 ) 操作流程 ( ) [多选题]。

- A、获取病人相关病史✓
- B、基本生命体征评估✓
- C、体温正确判断✓
- D、正确选择物理降温方式✓

7、脉搏测量的位置有 ( ) [多选题]。

- A、颈动脉✓
- B、肱动脉✓
- C、桡动脉✓
- D、足背动脉✓
- E、尺动脉

8、预防接种后要注意 ( ) [多选题]。

- A、不要急着回家，在接种门诊休息 10 分钟
- B、严格遵照医生的相关嘱咐✓
- C、保证打针部位的清洁，以免发生感染✓
- D、不要剧烈运动✓
- E、不要泡澡✓

9、影响血压的因素有 ( ) [多选题]。

- A、心输出量✓
- B、心率✓
- C、动脉管壁的弹性✓
- D、血量/容量比积✓
- E、外周阻力✓

10、静脉输液操作需要 ( ) [多选题]。

- A、操作前后手卫生✓
- B、第二助手配合
- C、戴无菌手套
- D、触摸确认后再穿刺
- E、不应用手触摸消毒后的穿刺点✓

## 清洁、消毒及无菌、医院废物正确处置

1、地面和物体表面的清洁与消毒的方法错误的是 ( ) [单选题]。

- A、地面有明显污染时，采用湿式清洁✓
- B、物体表面受到明显污染时先用吸湿材料去除可见污染物，然后再清洁消毒
- C、感染高危险的部门其地面和物表有明显污染随时去污、清洁与消毒
- D、新生儿室物体表面受到明显污染时采用 1000mg/L ~ 2000mg/L 季铵盐类消毒液

2、消毒是指杀灭或清除传播媒介上的 ( ) [单选题]。

- A、细菌
- B、真菌

C、病毒

D、病原微生物✓

3、患者，女性，48岁，30分钟前因骑电动车不慎撞伤左侧膝盖，伤口约5cm×3cm，为其伤口进行消毒，方法正确的是（ ）[单选题]。

A、使用含有效碘500mg/L的碘伏擦拭，作用到规定时间

B、采用有效含量≥2g/L氯己定溶液局部擦拭2-3遍✓

C、采用500季铵盐，作用到规定时间

D、采用含有效碘2000mg/L的消毒液冲洗，作用到规定时间

4、《医疗废物管理条例》中所称的医疗废物是指（ ）[单选题]。

A、医疗卫生机构在医疗、预防、保健活动中产生的危害性的废物

B、医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物✓

C、在医疗、预防、保健活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害性的废物

D、在日常生活中产生的废物

5、医疗机构收治的传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾属于（ ）[单选题]。

A、病理性废物

B、严重污染性废物

C、生活垃圾

D、感染性废物✓

6、执行无菌技术操作时，应遵循的原则为（ ）[多选题]。

A、洗手、衣帽整齐、戴口罩✓

B、使用无菌持物钳夹取无菌物品✓

C、从无菌容器内取出的无菌物品未用完立即放回

D、无菌持物钳应保持在使用者腰部以上，视线范围内✓

E、一次性物品外包装标签模糊，或已过有效期、或包装破损均不可使用✓

7、关于无菌物品的使用和保管，正确的是（ ）[多选题]。

A、不可暴露在空气中应存放于无菌容器内✓

B、取出后未污染应立即放回

C、取用无菌物品时应使用无菌钳✓

D、应存放在温度 10°C ~ 24°C，相对湿度 35% ~ 70%的环境中✓

8、医疗卫生机构应为机构内从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存与处置等工作的人员与管理人员

采取的职业卫生防护措施有（ ）[多选题]。

A、配备必要的防护用品✓

B、定期进行健康检查✓

C、健康教育✓

D、必要时进行免疫接种✓

9、包装物或者容器的外表面一旦被感染性废物污染,可对污染进行的处理（ ）[多选题]。

A、用清水冲洗

B、增加一层包装✓

C、消毒处理✓

D、擦拭处理

10、《医疗废物管理条例》中对医疗卫生机构与医疗废物集中处置单位的要求（ ）[多选题]。

A、禁止任何单位与个人转让、买卖医疗废物✓

B、禁止邮寄医疗废物✓

C、禁止在运送过程中丢弃医疗废物✓

D、禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物✓

## 职业防护、留置/更换导尿管

1、近距离接触经空气传播或飞沫传播的呼吸道传染病患者时应佩戴的口罩是（ ）[单选题]。

A、纱布口罩

B、一次性医用口罩

C、外科口罩

D、医用防护口罩✓

2、飞沫传播的隔离标识颜色是（ ）[单选题]。

A、黄色

B、蓝色

C、粉红色✓

D、红色

3、对尿失禁患者的护理哪项是错误的（ ）[单选题]。

A、指导患者行盆底肌锻炼

B、对长期尿失禁患者可行导尿术✓

C、嘱病员多饮水，促进排尿反射恢复

D、多用温水冲洗会阴部

4、被 HBV 阳性病人血液、体液污染的锐器刺伤，应在（ ）注射乙肝疫苗[单选题]。

A、12 小时内

B、24 小时内✓

C、48 小时内

D、7 日内

5、发生锐器伤后应在 ( ) 内报告上级并填写报表[单选题]。

A、立即

B、12h

C、24h

D、48h✓

6、男性尿道三个生理性狭窄是 ( ) [多选题]。

A、尿道内口✓

B、尿道膜部✓

C、尿道外口✓

D、球部

7、留置尿管后常见问题有 ( ) [多选题]。

A、疼痛✓

B、漏尿堵管✓

C、血尿✓

D、感染✓

8、医院感染暴发处置原则包括 ( ) [多选题]。

A、控制并积极治疗感染源✓

B、切断传播途径✓

C、对易感人群实施保护措施✓

D、积极查找病原体✓

E、制定预防措施✓

9、标准预防应包括 ( ) [多选题]。

A、手卫生✓

B、根据预期可能的暴露选用 PPE✓

C、安全注射✓

D、处理患者环境中污染的物品与医疗器械✓

E、做好隔离措施

10、进行诊疗护理操作时，可能发生血液、分泌物喷溅时，执行标准预防措施时使用到的防护用品包括 ( ) [多选题]。

A、口罩✓

B、帽子✓

C、手套✓

D、防护面罩✓

E、隔离衣✓

## 标本采集、鼻饲

1、为了保证化验标本的质量、采集标本时应避免 ( ) [单选题]。

A、方法正确

B、采集准确

C、放置时间过久✓

D、特殊标本注明时间

2、以下说法正确的是 ( ) [单选题]。



A、若患者正在进行输液治疗，可在同侧肢体采血。

B、应在安静状态下采集血标本✓

C、采血时尽可能延长止血带的结扎时间

D、标本采集后尽快送检

3、为昏迷患者鼻饲采取的最佳体位（ ）[单选题]。

A、平卧位

B、半坐卧位

C、左侧卧位

D、去枕平卧位✓

4、鼻饲液适宜的温度（ ）°C[单选题]。

A、38-40✓

B、37-41

C、36-37

D、38-42

5、胃管插入长度一般为（ ）cm[单选题]。

A、40-45

B、45-55✓

C、50-55

D、45-60

6、鼻饲法适用于（ ）[多选题]。

A、口腔手术后✓

B、昏迷患者✓

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/185043334134011102>