

2024 年陕西省三原县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库带答案下载

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 药师在接受护士用药咨询时，应重点关注的内容是

- A: 药品的生产厂商和批号
- B: 注射剂的配制和滴注速度等
- C: 药物制剂的等效性
- D: 药品经济学知识

答案：B

2. 肾功能重度损害时，抗菌药减低至正常剂量的

- A: $3/4 \sim 3/5$
- B: $1/5 \sim 1/10$
- C: $1/5 \sim 1/7$
- D: $1/2 \sim 1/5$

答案：B

3. 阿昔洛韦可导致药源性肾病的机制是

- A: 前列腺素合成障碍
- B: 肾间质纤维化
- C: 阻塞肾小管、肾小球
- D: 不可逆性肾小管坏死

答案：C

4. 老年人应用下列药物可引起何种不良反应，利尿药如氢氯噻嗪等可导致

- A: 青光眼，甚至致盲
- B: 嗜睡及头晕
- C: 室性期前收缩、房室传导阻滞及低钾血症
- D: 脱水、低钾血症

答案：D

5. 头孢曲松

- A: 与丙戊酸钠合用可导致血药浓度过低而引发癫痫
- B: 与多种药物存在配伍禁忌，一般应单独给药
- C: 与氯霉素合用因竞争药物的结合位点而产生拮抗作用
- D: 与呋塞米合用可加重肾功能损害

答案：B

6. 以下临床用药中，药物相互作用主要是药效学的影响是

- A: 利福平同服异烟肼致肝毒性增加
- B: 四环素同服硫酸亚铁减效
- C: 维生素 C 与多潘立酮同服吸收减少
- D: 氯噻嗪减弱甲苯磺丁脲的降糖作用

答案：D

7. 以下药物中，可以导致血钾升高的药物不包括（）

- A: 卡托普利
- B: 螺内酯
- C: 阿米洛利
- D: 呋达帕胺

答案：D

8. 容易氧化的药物是

- A: 胃蛋白酶
- B: 牛痘菌苗
- C: 青霉素类
- D: 阿扑吗啡

答案：D

9. 服后不宜立刻饮水，以免冲淡药物

- A: 包衣片
- B: 糖浆剂
- C: 粉剂
- D: 胶囊剂

答案：B

10. 仅用于解热、镇痛的非处方药是

- A: 西咪替丁
- B: 布洛芬
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 氢化可的松

答案：C

11. 以快速、准确地获得问题的答案是指

- A: 对文献进行评价、分析和整理
- B: 确立有效的检索方法、查阅文献
- C: 形成答案并以口头形式提供给询问者
- D: 对问题进行确定并归类

答案：B

12. 药物不良反应胶体果胶铋（）

- A: 睡眠障碍
- B: 黑便
- C: 溢乳现象
- D: 性功能障碍

答案：B

13. 某患者，女，14 岁，尿频、尿急、尿痛 3 天，伴腰痛。肾区叩击痛，血分析见白细胞及中性粒细胞百分比升高，尿分析见尿液浑浊，尿白细胞+++，临床诊断为急性肾盂肾炎。

- A: 林可霉素
- B: 头孢噻肟
- C: 左氧氟沙星
- D: 阿奇霉素

答案：B

14. 庆大霉素可引起

- A: 癫痫发作
- B: 再生障碍性贫血
- C: 听神经障碍
- D: 锥体外系反应

答案：C

15. 乳母服用青霉素，乳汁中青霉素的量低于总用药量 1% 的机制是其

- A: 在母体血浆中处于结合状态
- B: 呈弱碱性
- C: 解离度大

D: 呈弱酸性

答案: D

16. 流行性感感冒发病后 48 小时内使用效果最好的抗病毒药是

A: 对乙酰氨基酚

B: 布洛芬

C: 金刚烷胺

D: 奥司他韦

答案: D

17. 以下论述哪项是错误的 ()

A: 氢氯噻嗪作为基础降压药可单用于轻度高血压，也可与其他降压药合用，以提高疗效、减少不良反应

B: 硝普钠可用于高血压危象和慢性心功能不全

C: 普萘洛尔可抑制肾素的分泌

D: 氢氯噻嗪不可与普萘洛尔合用于治疗高血压

答案: D

18. 对沙眼衣原体有强大抗菌作用的药品是

A: 硫酸锌滴眼液

B: 磺胺醋酰钠滴眼液

C: 红霉素眼膏

D: 酞丁安滴眼液

答案: C

19. 应告知患者用药后宜多饮水的药物是

A: 止咳糖浆

B: 氨茶碱

C: 苦味健胃药

D: 甘草合剂

答案: B

20. 下述“质子泵抑制剂的合理应用与治疗监护点”中，不正确的是（
）

A: 肝功能障碍患者慎用

B: 多数为肠溶制剂，服药时不宜嚼碎

C: 高龄患者慎用

D: 妊娠及哺乳期妇女、儿童禁用

答案: D

21. I 期新药临床试验样本数要求查看材料

A: 20~30 例

B: 常见病 ≥ 12000 例

C: ≥ 300 例

D: 主要病种 ≥ 300 例

答案: A

22. 微粒型非诺贝特的用量是（）

A: 0.2g, tid

B: 0.6g, bid

C: 0.1g, tid

D: 0.2g, qd

答案: D

23. (毒物及药物中毒解救)，二巯丙醇用于解救

A: 有机磷中毒

B: 氰化物中毒

C: 吗啡中毒

D: 水银中毒

答案: D

24. 下列药物中，有效治疗浓度范围与中毒浓度范围相接近的是

A: 氯噻嗪

B: 地高辛

C: 四环素

D: 阿托品

答案: B

25. 慢性荨麻疹的治疗首选药物是

A: 第一代抗组胺药

B: 肾上腺糖皮质激素

C: 第二代非镇静抗组胺药

D: 1: 1000 肾上腺素注射液

答案: C

26. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别头孢曲松属于药物妊娠毒性分级

A: B 级

B: A 级

C: C 级

D: D 级

答案: A

27. 处方调配差错的内容

- A: 通过药剂师双人复核制
- B: 加强药品货位管理
- C: 确认差错发生的过程、细节
- D: 药品名称出现差错

答案：D

28. 患者，女，55 岁，因"反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸，胃灼热，间断积食"而就诊。食管测压提示食管下括约肌(LES)压力<6mmHg，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病，医师处方：奥美拉唑肠溶片 20mgbid 强化抑酸治疗。

- A: 应正片吞服
- B: 用药后可能出现口干，便秘等不良反应
- C: 长期用药后可能会出现维生素 K 缺乏
- D: 适宜餐前 30 分钟服用

答案：C

29. 药品质量缺陷，包括

- A: 须冷藏药品
- B: 片剂药品受潮裂片
- C: 药品名称形似
- D: 药品名称音似

答案：B

30. 女性，59 岁，间断咳嗽、咳痰 5 年，加重伴咯血 2 个月。患者表现为低热、乏力、食欲减退、咳白色黏痰、体重逐渐下降。

- A: 特布他林?
- B: 布地奈德?
- C: 异烟肼?

D: 青霉素？

答案：C

31. 治疗癌痛患者因服用阿片类镇痛剂导致的便秘，宜选择的药物是()

A: 东莨菪碱

B: 硫酸镁

C: 乳果糖

D: 比沙可啶

答案：C

32. 就餐时随第一、二口食物给药的是

A: 阿卡波糖

B: 胰岛素

C: 二甲双胍

D: 瑞格列奈

答案：A

33. 患者，女，53 岁，因“冠状动脉粥样硬化性心脏病、急性心肌梗死”住院治疗。医师处方：硝酸甘油片、比索洛尔片、注射用重组链激酶冻干粉针剂、依那普利片、肝素钠注射液、辛伐他汀片比索洛尔的主要不良反应是

A: 出血

B: 心动过缓、二至三度房室传导阻滞

C: 横纹肌溶解症

D: 高钾血症

答案：B

34. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 氯吡格雷
- B: 肝素
- C: 利伐沙班
- D: 华法林

答案：A

35. 考察药品在广泛使用条件下的疗效和不良反应试验阶段，属于

- A: II 期临床试验
- B: I 期临床试验
- C: IV 期临床试验
- D: III 期临床试验

答案：C

36. 可引起 A/G 比值 <1 的是

- A: 慢性肝炎、肝硬化、肝实质性损害
- B: 各种原因脱水所致的血液浓缩
- C: 自身免疫性疾病如风湿热、红斑狼疮等
- D: 摄入不足、消化不良时

答案：A

37. 成本-效果分析

- A: 治疗结果采用临床指标表示，如治愈率
- B: 药物利用指数 (DUI)
- C: 成本和治疗结果均用货币表示
- D: 是成本-效果分析的一种特例

答案：A

38. 应用胆碱酯酶复活剂应注意

- A: 复活剂对毒蕈碱样作用较强
- B: 切勿两种或三种复活剂同时使用，以免毒性增加
- C: 复活剂不需稀释，直接注射
- D: 中毒已超过 3 日使用复活剂仍然有效

答案：B

39. 为解热或镇痛，有心功能不全史的患者应慎用布洛芬。因为用药后可能发生

- A: 尿潴留和水肿
- B: 急性肾衰竭
- C: 过敏反应
- D: 重度肝损伤

答案：A

40. 对于围手术期抗菌药物的预防性应用原则，说法错误的是

- A: 针对革兰阴性杆菌可用氨曲南、磷霉素或氨基糖苷类
- B: 对于清洁手术（I 类切口），通常不需预防用抗菌药物
- C: 若术前发现有耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）定植的可能或者该医疗机构 MRSA 发生率高，可选用氨曲南预防感染
- D: 应尽量选择单一抗菌药物预防用药，避免不必要的联合使用

答案：C

41. 用白色处方纸书写，右上角无标注的是

- A: 第二类精神药品处方
- B: 第一类精神药品处方
- C: 普通处方

D: 急诊处方

答案：C

42. 影响维生素 B12 吸收的药物是

A: 甲氨蝶呤

B: 苯巴比妥

C: 苯妥英钠

D: 二甲双胍

答案：D

43. 因不良反应很小，可在老年人群中使用的治疗失眠症的药物为

A: 雷关尔通

B: 佐匹克隆

C: 米氮平

D: 艾司唑仑

答案：A

44. ADR 报告表应填写具体；如患卵巢囊肿合并肺部感染。因注射头孢曲松引起不良反应，应填写“肺部感染”；所对应的项目是

A: 不良反应 / 事件的结果

B: 用药原因

C: ADR / ADE 过程描述

D: 用药起止时间

答案：B

45. 作用于 DNA 化学结构的药物

A: 培美曲塞

B: 依托泊苷

C: 顺铂

D: 放线菌

答案: C

46. (2017 年真题) 患者，男 52 岁，身高 168cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L (正常值: 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 14.8mmol/L (正常值: <7.8mmol/L)，血尿酸 580 $\mu\text{mol/L}$ (正常值: 男性 180~440 $\mu\text{mol/L}$)，LDL-c 3.7mmol/L (正常值: 2.1~3.1mmol/L) 肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示: 动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

A: 格列齐特

B: 二甲双胍

C: 甘精胰岛素

D: 阿卡波糖

答案: D

47. 可引起儿童良性颅内压增高、囟门隆起的药物是

A: 抗组胺药

B: 氯霉素

C: 维生素 A

D: 苯妥英钠

答案: C

48. 成本-效益分析

A: 成本和治疗结果均用货币表示

B: 药物利用指数 (DUI)

C: 治疗结果采用临床指标表示，如治愈率

D: 是成本-效果分析的一种特例

答案: A

49. 应用格列本脲时，应注意的事项是

- A: 用药期间宜吃高蛋白食物
- B: 服药期间不宜饮酒
- C: 用药期间不宜食用富含组胺类的食物
- D: 服药期间不宜饮茶

答案: B

50. 医生开具处方，必须使用药品的名称是

- A: 药品通用名
- B: 药品化学名
- C: 药品习用名
- D: 药品商标名

答案: A

51. 怕热的药品

- A: 用棕色或黑色纸包裹的玻璃器包装
- B: 可用玻璃瓶软木塞塞紧、蜡封、外加螺旋盖盖紧
- C: 可贮存于严密的药箱内
- D: 根据不同性质要求，分别存放在阴凉处、凉暗处或冷处

答案: D

52. 药物信息按照其最初来源通常分为三级，即以期刊发表的原创性论著为主的一级信息源、引文和摘要服务为主的二级信息源以及参考书和数据库为主的三级信息源。

- A: 查阅时需要利用所提供参考文献去验证

- B: 提供的信息最新
- C: 内容广泛、使用方便
- D: 很方便地对所需要的信息资料进行筛选

答案：B

53. 患者，男，57 岁，因出现全身酸痛、乏力、高热等症状就诊。经流行病学调查及相关实验室检查，诊断为 H1N1 甲型流感。该患者可选用的神经氨酸酶抑制剂是

- A: 利巴韦林
- B: 奥司他韦
- C: 金刚乙胺
- D: 金刚烷胺

答案：B

54. ADR 报表内容填写不齐全、等待补充，或因果关系难以定论，缺乏文献资料佐证；可评价为

- A: 待评价
- B: 可能
- C: 可能无关
- D: 很可能

答案：A

55. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见 WBC $15 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 85%，尿分析见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

- A: 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高
- B: 如该患者为妊娠期，可选用氨苄青霉素
- C: 首选针对革兰氏阳性菌的药物

D: 选用肾毒性小、副作用少的抗菌药物

答案：C

56. 影响核酸转录的药物

A: 顺铂

B: 依托泊苷

C: 培美曲塞

D: 放线菌

答案：D

57. 患者女,55 岁,因持续性中上腹疼痛 2 日入院。查体:体温 38℃中上及左上腹有压痛。化验结果:白细胞计数 $18.7 \times 10^9/L$,血清淀粉酶 1993U/L,血脂肪酶 6116U/L。其诊断可考虑是 ()

A: 急性胰腺炎

B: 急性胃炎

C: 急性胆囊炎

D: 急性阑尾炎

答案：A

58. 药源性疾病是由药物诱发的疾病,是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A: 月经期服用常规剂量的避孕药和地西泮,药理效应增强

B: 假胆碱酯酶遗传性缺陷者应用琥珀胆碱出现呼吸暂停

C: 慢乙酰化者服异烟肼半衰期延长至 2~4.5h

D: 肝硬化患者应用利多卡因,可引起严重中枢神经系统疾病

答案：D

59. 预激综合征伴房颤患者，控制心室率时慎用的药物为

- A: 去乙酰毛花苷
- B: 胺碘酮
- C: 硝苯地平
- D: 利伐沙班

答案：A

60. 服用后容易引起结晶尿，药师在指导用药时应告知患者多饮水的药物是

- A: 红霉素
- B: 阿奇霉素
- C: 磺胺甲噁唑
- D: 头孢呋辛

答案：C

61. （2017 年真题）高蛋白饮食在肠内产生氨基酸会影响其吸收、降低疗效的药物是（）

- A: 左旋多巴片
- B: 维 A 酸片
- C: 地衣芽孢杆菌活菌胶囊
- D: 非洛地平片

答案：A

62. 用于有机磷中毒早期解除胆碱酯酶与有机磷结合的药物是

- A: 碘解磷定
- B: 阿托品
- C: 毛果芸香碱

D: 亚甲蓝

答案：A

63. 阿托品解救有机磷中毒时，用量过大所致的谵妄、幻觉、心率过快和昏迷可选用的解救药品是

A: 毛果芸香碱

B: 毒扁豆碱

C: 东莨菪碱

D: 伪麻黄碱

答案：A

64. 两种药物配伍容易形成白色沉淀的是()

A: 胰岛素与 0.9%氯化钠注射液

B: 头孢曲松与复方氯化钠注射液

C: 青霉素与 5%葡萄糖注射液

D: 头孢唑林钠与 0.9%氯化钠注射液

答案：B

65. 治疗指数低者静脉滴注给药；治疗指数高者分次给药，以保证血药浓度始终高于最低有效浓度针对

A: 半衰期大于 30 小时

B: 半衰期 8~24 小时

C: 半衰期小于 30 分钟

D: 半衰期大于 24 小时

答案：C

66. 属于雄激素受体阻断剂的是

A: 黄酮哌酯

B: 雌三醇

C: 依立雄胺

D: 氟他胺

答案：D

67. (2015 年真题) 下列中药、化学药联合应用，不存在重复用药的是 ()。

A: 曲克芦丁片+维生素 C 片

B: 消渴丸+格列本脲片

C: 新癬片+吡哆美辛胶囊

D: 脉君安片+氢氯噻嗪片

答案：A

68. 以"保证贮存和发出的药品质量合格"为职责的技能是

A: 自主学习能力

B: 药品管理技能

C: 调剂技能

D: 沟通技能

答案：B

69. 受精后 3 周至 3 个月 (12 周末之前)

A: 中枢神经系统发育迟缓

B: 可产生形态或功能的异常而造成畸形

C: 几乎见不到药物的致畸作用

D: 女性生殖系统发育迟缓

答案：B

70. 能保护药品免受破坏的联合是

- A: 维生素 C 与铁剂同服
- B: 普萘洛尔联用硝苯地平降血压
- C: 亚胺培南-西司他汀复方制剂
- D: 磷霉素联用其他抗菌药物

答案：C

71. 患者，女，56 岁，诊断为高血压伴快速型心律失常，首选的药物是

- A: 维拉帕米
- B: 螺内酯
- C: 美托洛尔
- D: 氯沙坦

答案：C

72. 下列不良事件中，属于假劣药事件是()

- A: 康泰克 PPA 事件
- B: 万洛(罗非昔布)事件
- C: 亮菌甲素事件
- D: 拜斯亭(西立伐他汀)事件

答案：C

73. 抗抑郁药物的合理使用既无兴奋、镇静作用，又无抗胆碱、抗组胺作用的药物是

- A: 帕罗西汀
- B: 丙米嗪
- C: 氟伏沙明
- D: 阿米替林

答案：C

74. 降钙素属于

- A: 骨吸收抑制剂
- B: 激素替代剂
- C: 骨形成刺激剂
- D: 促进骨矿化剂

答案：A

75. 某女性，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发发生喘憋。体检：端坐体位，BP190/110mmHg，R30 次/分，Bp108 次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 阵发性室上性心动过速
- B: 室性期前收缩
- C: 心房颤动
- D: 心室颤动

答案：C

76. 伴有 Q—T 间期延长的过敏性鼻炎患者不宜使用的治疗药物是

- A: 口服抗组胺药
- B: 口服糖皮质激素
- C: 白三烯受体阻断剂
- D: 鼻用抗组胺药

答案：A

77. （2015 年真题）阿卡波糖片的适宜服药时间是（ ）。

- A: 清晨
- B: 餐中
- C: 餐前

D: 餐后

答案：B

78. 效果以主观指标表示，如患者对治疗结果的满意程度、舒适程度和生命质量

A: 成本-效益分析

B: 最小效果分析

C: 最小效益分析

D: 成本-效用分析

答案：D

79. 给药时间、给药途径或剂型错误，归属于

A: 患者经济拮据

B: 操作失误

C: 产品缺陷

D: 管理缺失

答案：B

80. 蒽环类抗肿瘤药可引起

A: 出血性膀胱炎

B: 末梢神经炎

C: 溶血性尿毒症

D: 心脏毒性

答案：D

81. 提示有潜在的风险，需要继续密切监测的信号属于

A: 确认的信号

B: 驳倒的信号

C: 部分确认信号

D: 尚不确定的信号

答案: D

82. 患者，女，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190 / 110mmHg，R30 次 / 分，Bp108 次 / 分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

A: 硝普钠

B: 西地兰

C: 多索茶碱

D: 硝苯地平

答案: B

83. 门诊处方一般不超过几日

A: 1 日常用量

B: 15 日常用量

C: 7 日常用量

D: 3 日常用量

答案: C

84. 可引起尿液碱度增高的疾病是

A: 痛风

B: 糖尿病

C: 代谢性碱中毒

D: 呼吸性酸中毒

答案: C

85. 患者，女，55 岁，诊断为混合型血脂异常，需联合应用他汀类和贝特类，最佳的给药方法是

- A: 晚上联合服用他汀类和贝特类
- B: 早晨服用贝特类，晚上服用他汀类
- C: 早晨服用他汀类，晚上服用贝特类
- D: 早晚联合服用他汀和贝特类

答案：B

86. 脑梗死的分期，恢复期

- A: 1 个月内
- B: 2~3 个月
- C: 1~6 个月
- D: 15 天

答案：C

87. 青蒿素与乙胺嘧啶联用增效的机制是

- A: 延缓或降低抗药性
- B: 作用于不同的靶点
- C: 促进机体的利用
- D: 竞争性拮抗作用

答案：A

88. 服用地西洋等苯二氮

- A: 咖啡
- B: 浓茶
- C: 烟
- D: 酒

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/185121322302012033>