专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024河南省郾城区《执业药师之西药学专业二》考试完整题库附参考答案（培优B卷）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)应避免与()联合应用。

A: 留钾利尿剂

B: β 受体阻断剂

C: 人促红素

D: 噻嗪类利尿剂

答案：A

2.下列哪项不是血管紧张素转换酶抑制药的主要临床应用

A: 充血性心力衰竭

B: 心肌梗死

C: 心律失常

D: 高血压

答案：C

3.用维生素B

A: 钠

B: 钙

C: 锂

D: 钾

答案：D

4.下述药物中不属于助消化药的是

A：胰酶

B：乳酶生

C：兰索拉唑

D：乳酸菌素

答案：C

5.（2017年真题）关于糖皮质激素外用制剂使用注意事项的说法,错误的是（）

A：面部、阴部和皱褶部位的湿疹,需长期使用强效制剂

B：为控制的细菌或真菌感染不宜使用

C：可用于过敏性皮炎的治疗

D：若继发细菌或真菌感染,可与抗菌药或抗真菌药联合使用

答案：A

6.可用于降低眼压的药物是()

A：利福平

B：阿托品

C：左氧氟沙星

D：卡替洛尔

答案：D

7.属于第四代喹诺酮类药物的是

A：萘啶酸

B：莫西沙星

C：诺氟沙星

D：吡哌酸

答案：B

8.属于第二代喹诺酮类药物的是

A：莫西沙星

B：吡哌酸

C：诺氟沙星

D：萘啶酸

答案：B

9.关于肝素和低分子肝素作用特点的说法，错误的是

A：皮下给药，低分子肝素的生物利用度接近 100%

B：肝素与低分子肝素均可使用硫酸鱼精蛋白迅速逆转抗凝作用

C：低分子肝素抗凝作用维持时间较长，可以一日 1 次或 2 次给药

D：肝素与低分子肝素相比，起效快失效也快德收育

答案：B

10.下列药物可用于治疗小细胞肺癌首选的是

A：依托泊苷

B：奥沙利铂

C：长春新碱

D：替尼泊苷

答案：A

11.（2019 年真题）若无禁忌，冠心病或缺血性脑卒中患者均应长期使用的药物是（）

A：氯吡格雷

B：阿司匹林

C：肝素

D：依诺肝素

答案：B

12.急性缺血性脑卒中发作，应用溶栓药治疗时间窗是在发病后

A: 24 小时内

B: 3 小时内

C: 8 小时内

D: 12 小时内

答案：B

13.风湿性心脏病重度二尖瓣狭窄宜

A: 不宜使用洋地黄

B: 停用洋地黄

C: 常规剂量的洋地黄

D: 快速洋地黄化

答案：A

14.仅作为吸入给药的平喘药是()

A: 特布他林

B: 布地奈德

C: 沙美特罗

D: 沙丁胺醇

答案：C

15.可用于治疗重度痤疮，但妊娠期妇女避免使用的药物是

A: 克拉霉素

B: 特比萘芬

C: 异维 A 酸

D: 克罗米通

答案：C

16.（2017年真题）可导致新生儿药物性黄疸的是（）

A：阿莫西林

B：磺胺嘧啶

C：林可霉素

D：兴孢他啶

答案：B

17.外耳道红肿局部治疗可选用()

A：伪麻黄碱

B：3%硼酸乙醇

C：赛洛唑啉

D：2%酚甘油

答案：D

18.下述不属于质子泵抑制剂的是

A：泮托拉唑

B：奥美拉唑

C：法莫替丁

D：雷贝拉唑

答案：C

19.长期合用下列哪个药物能使口服避孕药的主要成分炔诺酮和炔雌醇的代谢加快，血液中的药物浓度降低而导致避孕失败()

A：四环素

B：利福平

C：复方磺胺甲噁唑

D：氨苄西林

答案：B

20.患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38．9℃，P90 次／分，R21 次／分，BP110／70mmHg，血常规：白细胞 16．9×109／L，中性粒细胞百分比 84．6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A: 血栓性静脉炎

B: 听力损害

C: 红人综合征

D: 视神经损害

答案：D

21.双嘧达莫最主要的抗凝作用机制是()

A: 抑制磷酸二酯酶，使 cAMP 浓度增高

B: 抑制凝血酶

C: 激活纤溶酶

D: 激活腺苷酸环化酶，使 cAMP 生成增多

答案：A

22.患者，男，35 岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

A: 输血+注射右旋糖酐铁

B: 驱钩虫+口服铁剂

C: 驱钩虫+亚叶酸钙

D: 驱钩虫+注射右旋糖酐铁

答案：B

23.肾上腺糖皮质激素类药物的共同药理作用不包括

A：抗休克

B：抗病毒

C：抗炎

D：免疫抑制

答案：B

24.使用氢化可的松大剂量冲击治疗时，用药时间一般不超过

A：5日

B：3日

C：7日

D：1日

答案：B

25.眼部病毒感染宜选用

A：托吡卡胺滴眼剂

B：氯霉素滴眼剂

C：拉坦前列素滴眼剂

D：碘苷滴眼剂

答案：D

26.氟胞嘧啶为

A：抗血吸虫病药

B：抗滴虫病药

C：抗真菌药

D：抗病毒药

答案：C

27.对其他药物不能控制的顽固性癫痫仍有效的是

A：卡马西平
B：丙戊酸钠
C：乙琥胺
D：苯妥英钠
答案：B

28.患者，男性，26岁，因“咳嗽伴间断发热1周”入院，查体：T38．9℃，P90次／分，R21次／分，BP110／70mmHg，血常规：白细胞16．9×109／L，中性粒细胞百分比84．6%；胸部CT示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。
A：老年人
B：肾功能不全者
C：肝功能不全者
D：推荐应用大剂量万古霉素来维持其血药浓度在15～20mg／L并且长疗程的患者
答案：C

29.抑制脱氧胸苷酸合成酶
A：氟尿嘧啶
B：甲氨蝶呤
C：阿糖胞苷
D：羟基脲
答案：A

30.眼底检查时的快速短效扩瞳药
A：去甲肾上腺素
B：异丙肾上腺素
C：多巴胺

D: 去氧肾上腺素

答案：D

31.呋塞米利尿的主要作用部位是()

A: 集合管

B: 远曲小管近端

C: 远曲小管远端

D: 肾小管髓袢升支粗段

答案：D

32.抑制细菌核酸合成的抗菌药物是

A: 利福喷丁

B: 头孢米诺

C: 磺胺甲噁唑甲氧苄啶

D: 头孢吡肟

答案：A

33.对红霉素的描述，下列不正确的是()

A: 抗菌谱与青霉素相似但略广

B: 具有肝脏毒性

C: 对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌有效

D: 属繁殖期杀菌剂

答案：D

34.庚酸炔诺酮()

A: 抑制排卵作用

B: 促进蛋白质合成

C: 减少精子数目

D: 抗着床

答案：A

35.复方氨基酸注射液（6AA）与等量10%葡萄糖注射液稀释后缓慢静脉滴注，滴速为

A: 滴速20～30滴/分

B: 不超过15滴/分

C: 不超过40滴/分

D: 滴速80～100滴/分

答案：C

36.对浅部真菌和深部真菌均有抗菌作用的是()

A: 庆大霉素

B: 阿昔洛韦

C: 咪康唑

D: 红霉素

答案：C

37.既能增加糖分解和减少糖生成，又能改善对胰岛素的敏感性的药物是

A: 二甲双胍

B: 氢氧化镁

C: 罗格列酮

D: 胰岛素

答案：A

38.关于替加环素的使用，错误的是

A: 替加环素是P—gp的底物

B：肾功能不全或接受血液透析患者无需对替加环素进行剂量调整

C：替加环素抑制CYP1A2、2C8、2C9、2C19、2D6和3A4介导的药物代谢

D：8岁以下儿童禁用替加环素

答案：C

39.()用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的轻、中度感染或青霉素过敏者

A：克林霉素

B：红霉素

C：万古霉素

D：克拉霉素

答案：B

40.药粉误入眼内可能引起或加重窄角型青光眼、眼睛疼痛或不适、短暂视物模糊、视觉晕轮或彩色影像的是

A：沙丁胺醇

B：喷托维林

C：噻托溴铵

D：氨溴索

答案：C

41.（2019年真题）患者，女，55岁，诊断为“甲癣”，宜使用的药物是（）

A：氟康唑

B：特比萘芬

C：卡泊芬净

D：氟胞嘧啶

答案：B

42.（2021 年真题）患者，男，65 岁。患有 2 型糖尿病，长期服用降糖药，同时长期服用阿司匹林肠溶片（100mg/d）预防心脑血管疾病。近期拟行髋关节置换手术，为减少出血风险，宜采取的措施是（）。

A: 停用阿司匹林 7-10 天后，再行手术

B: 停用阿司匹林 3 天后，再行手术

C: 无需停用阿司匹林，也无需加用其他药物预防出血

D: 无需停用阿司匹林，在手术日加用维生素 K1 预防出血

答案：A

43.关于糖皮质激素外用制剂使用注意事项的错误的是

A: 可用于过敏性皮炎的治疗

B: 面部、阴部和皱褶部分的湿疹，需长期使用强效制剂

C: 若继发细菌或真菌感染，可与抗菌药或抗真菌药联合使用

D: 未控制的细菌或真菌感染不宜使用

答案：B

44.（2021 年真题）兼有抑菌作用的鼻用减充血剂是（）

A: 麻黄碱滴鼻液

B: 赛洛唑啉滴鼻液

C: 羟甲唑啉鼻喷剂

D: 呋麻滴鼻液

答案：D

45.氨基酸的主要作用不包括

A: 合成蛋白质

B: 维持氮平衡

C：转变为糖或脂肪

D：调节体内酸碱平衡

答案：D

46.（2016 年真题）具有抑制 5-羟色胺及去甲肾上腺素再摄取作用，用于难治性抑郁症且疗效明显的抗抑郁药是

A：阿米替林

B：西酞普林

C：文拉法辛

D：马普替林

答案：C

47.适用于各型高血压，对原发性或肾性高血压均有效的是

A：氢氯噻嗪

B：肼屈嗪

C：卡托普利

D：拉贝洛尔

答案：C

48.双香豆素与保泰松合用可

A：产生协同作用

B：诱导肝药酶加速灭活，作用减弱

C：竞争性对抗

D：与其竞争结合血浆蛋白

答案：D

49.亲脂性较强，易通过血一脑屏障

A：环磷酰胺

B: 卡莫司汀

C: 巯嘌呤

D: 氟尿嘧啶

答案：B

50.普通肝素的作用靶点是

A: 因子Ⅸa

B: 凝血酶Ⅲ（AT—Ⅲ）

C: 因子Ⅱa

D: 因子Ⅹa

答案：B

51.治疗慢性心力衰竭，ACEI 和其联合有协同作用的是()

A: 噻嗪类利尿药

B: 人促红素

C: 留钾利尿药

D: β 受体阻断药

答案：D

52.下列哪种药物可使关闭的房角重新开放，从而降低眼内压

A: 拉坦前列素

B: 地匹福林

C: 毛果芸香碱

D: 噻吗洛尔

答案：C

53.葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏者应禁用

A: 替硝唑

B: 哌嗪

C: 伯氨喹

D: 奎宁

答案：C

54.关于唑吡坦作用特点的说法,错误的是()

A: 唑吡坦血浆蛋白结合率高

B: 唑吡坦属于 γ-氨基丁酸 A 型受体激动剂

C: 唑吡坦具有镇静催眠作用，抗焦虑作用

D: 口服唑吡坦后消化道吸收迅速

答案：C

55.以下药物中，易被胃酸破坏的是

A: 克拉霉素

B: 罗红霉素

C: 阿奇霉素

D: 红霉素

答案：D

56.患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌Ⅱ级，同侧腋下淋巴结 1／18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+)。肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

A: 腰椎间盘突出

B: 骨髓功能抑制

C: 妊娠及哺乳期妇女

D: 严重心脏病

答案：A

57.奎尼丁对心肌细胞膜的作用主要是()

A: 抑制 Na

B: 促进 Ca

C: 抑制 Ca

D: 促进 K

答案：A

58.用于缺血性心脏病、血栓栓塞性疾病、心肌缺血的诊断试验的药物是

A: 硝苯地平

B: 普萘洛尔

C: 双嘧达莫

D: 硝酸甘油

答案：C

59.患者，男，45 岁。以"间断巩膜黄染伴腹胀 2 年，加重 1 周"之主诉入院。患者 2 年前无明显诱因出现巩膜黄染，伴有腹胀，在当地医院诊断为酒精性肝硬化。1 周前患者上述症状加重，胃镜检查：胃溃疡(A

A: 复方甘草酸苷

B: 氢化可的松琥珀酸钠

C: 水飞蓟宾

D: 还原型谷胱甘肽

答案：A

60.维生素 A 缺乏时引起

A: 成人佝偻病

B: 角膜软化症

C：脚气病

D：坏血病

答案：B

61.（2020年真题）用于散瞳的眼用药物是

A：噻吗洛尔

B：溴莫尼定

C：毛果芸香碱

D：复方托吡卡胺

答案：D

62.西酞普兰抗抑郁的药理作用机制是

A：抑制神经末梢突触前膜α

B：抑制5-羟色胺再摄取

C：抑制5-羟色胺及去甲肾上腺素再摄取

D：抑制单胺氧化酶

答案：B

63.延长动作电位时程的广谱抗心律失常药物是()

A：胺碘酮

B：美西律

C：维拉帕米

D：奎尼丁

答案：A

64.周某，男，31岁，胃溃疡伴有慢性出血，大便潜血(+)，患者近日感无力、心悸，诊断：慢性失血性贫血。

A：注意预防铁负荷过重

B：对胃酸缺乏者，宜与稀盐酸并用，有利于铁剂的解离

C：尽量选择三价铁

D：选择适宜的病期、疗程和监测

答案：C

65.以下选项中，不属于沙美特罗的适应证的是()

A：慢性支气管炎伴气道痉挛的治疗

B：夜间哮喘的预防和维持治疗

C：肺气肿伴气道痉挛的治疗

D：缓解支气管痉挛的急性症状

答案：D

66.大剂量碘剂

A：使甲状腺组织退化、血管减少、腺体缩小变韧

B：使甲状腺腺泡上皮萎缩、减少分泌

C：抑制甲状腺过氧化物酶，从而抑制甲状腺激素的生物合成

D：对甲状腺激素代谢无作用，仅能改善甲状腺功能亢进症的症状

答案：A

67.患者，男，56岁，有高血压病史4年。体检：血压156／96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利控制血压。

A：氨氯地平

B：美托洛尔

C：吲达帕胺

D：缬沙坦

答案：D

68.患者男性，29岁，阴茎头部出现下疳两个月就诊。有不洁性接触史。临床诊断为梅毒。立即给予青霉素注射治疗，十分钟后患者出现胸闷，全身瘙痒、面部发麻，查体：血压85/60mmHg，脉率110次/分。

A: 给予糖皮质激素

B: 吸氧，给予普萘洛尔

C: 减少药物剂量

D: 给予肾上腺素

答案：D

69.有指南推荐，为减少手术中和手术后出血风险，择期手术前需提前停用阿司匹林

A: 4～6日

B: 11～15日

C: 1～3日

D: 7～10日

答案：D

70.用于治疗低磷血症的药物是()

A: 三磷酸腺苷

B: 二磷酸果糖

C: 葡萄糖

D: 碳酸钙

答案：B

71.（2017年真题）患者,男,57岁,肾功能正常,既往有动脉粥样硬化,高血压合并2型糖尿病,服用下列药物后出现踝关节肿胀,到药房问询,药师提示有可能引起不良反应的药物是（）

A: 硝苯地平缓释片

B: 阿司匹林肠溶片

C: 赖诺普利片

D: 格列吡嗪肠溶片

答案：A

72.（2019年真题）起效缓慢，可增加心力衰竭和女性骨折风险的口服抗糖尿病药物是（）

A: 西格列汀

B: 利拉鲁肽

C: 罗格列酮

D: 艾塞那肽

答案：C

73.孟鲁司特的作用机制是

A: 阻断M受体

B: 抑制磷酸二酯酶

C: 阻断 α 受体

D: 阻断白三烯受体

答案：D

74.噻嗪类利尿药可用于治疗肾性尿崩症及加压素无效的垂体性尿崩症，是因为其可以抑制

A: 磷酸二酯酶

B: Na+-Cl-共转运子

C: 远曲小管近端

D: Na+-K+-2Cl-同向转运子

答案：A

75.阿莫罗芬属于

A：丙烯胺类

B：抗生素类

C：吗啉类

D：唑类

答案：C

76.可使前者作用加强或延长的是

A：红霉素

B：氯丙嗪

C：维生素C

D：他莫昔芬

答案：B

77.对多巴胺描述正确的是()

A：可用于充血性心力衰竭等引起的休克综合征

B：是磷酸二酯酶抑制剂

C：对其他拟交感胺类药物高度敏感的患者应该使用多巴胺

D：对洋地黄和利尿药无效的心功能不全，多巴胺也无效

答案：A

78.用药过程中需注意监护心脏毒性的是()

A：甲氨蝶呤

B：丝裂霉素

C：伊立替康

D：多柔比星

答案：D

79.（2018年真题）可与PPI、铋剂联合使用治疗幽门螺杆菌感染的药物是（）

A：克拉霉素

B：美罗培南

C：替考拉宁

D：大观霉素

答案：A

80.吸收后代谢成活性产物而发挥抗甲型和乙型流感病毒的前体药物是（）

A：金刚乙胺

B：扎那米韦

C：金刚烷胺

D：奥司他韦

答案：D

81.羟甲唑啉滴鼻剂使用期间，可能发生的不良反应是

A：流量

B：血压下降

C：鼻衄

D：心率加快

答案：D

82.治疗高脂血症达到中等强度（每日剂量可降低LDL30%～50%），所需药物剂量最小的是

A：辛伐他汀

B：氟伐他汀

C：匹伐他汀

D：洛伐他汀

答案：C

83.氨苄西林()

A：对G

B：对G

C：特别对铜绿假单胞菌有效

D：抗菌作用强，对厌氧菌有效

答案：B

84.对铜绿假单胞菌作用强()

A：青霉素V

B：青霉素G

C：氟氯西林

D：羧苄西林

答案：D

85.中度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选

A：5-HT3受体阻断剂+口服地塞米松

B：奥美拉唑+口服地塞米松

C：5-HT3受体阻断剂+口服地塞米松+阿瑞吡坦

D：每日化疗前，应用5-HT3受体阻断剂或口服地塞米松

答案：A

86.属于延长动作电位时程的抗心律失常药是()。

A：利多卡因

B：硝酸甘油

C：美托洛尔

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/185230313114012033