


The background features several overlapping, semi-transparent purple circles of varying sizes. On the right side, there is a thin vertical purple line that starts with a small solid purple circle at the top and extends downwards.

PICC深静脉置管并发症预防 处理护理课件

- 
- PICC深静脉置管介绍
 - PICC深静脉置管并发症预防
 - PICC深静脉置管并发症处理
 - PICC深静脉置管护理
 - 案例分享与经验总结
- 

01


PICC深静脉置管介绍



PICC深静脉置管定义



PICC深静脉置管是一种经外周静脉插入中心静脉的导管，通常用于长期输液、肿瘤化疗、肠外营养等治疗。



PICC导管材料一般选用聚氨酯或硅胶等生物相容性好的材料，具有良好的弹性和柔软性，可长时间留置在血管内。



PICC深静脉置管的留置时间一般为数月至一年左右，具体时间取决于患者的治疗需求和护理情况。



PICC深静脉置管的应用范围

长期输液治疗

对于需要长期输液治疗的患者，如肿瘤患者，PICC深静脉置管可以减少频繁穿刺带来的痛苦和血管损伤。



肠外营养

对于不能进食或肠道功能受损的患者，PICC深静脉置管可以提供肠外营养支持，保证患者的基本营养需求。



肿瘤化疗

肿瘤患者需要接受多疗程化疗，使用PICC深静脉置管可以减轻化疗药物对血管的刺激，提高患者的生存质量。





PICC深静脉置管的优势与局限性



优势

PICC深静脉置管操作简便、留置时间长、对血管损伤小、并发症少，能够减轻患者痛苦和提高生活质量。



局限性

PICC深静脉置管可能存在感染、血栓形成等并发症，需要定期维护和护理，同时对于某些特殊情况可能不适用。

02

PICC深静脉置管并发症预防



预防感染



严格执行无菌操作



在置管、换药、封管等操作时，应严格遵守无菌原则，避免细菌侵入。



定期换药



置管后应定期更换敷料，保持穿刺部位的清洁干燥，防止感染。



合理使用抗生素



如有必要，遵医嘱合理使用抗生素，预防感染。




预防血栓形成



定期检查

定期对导管及周围血管进行检查，及时发现血栓形成的迹象。



适度活动

鼓励患者适度活动，促进血液循环，降低血栓形成的风险。



抗凝治疗

如有需要，进行抗凝治疗，预防血栓形成。



预防导管脱落

固定导管

采用适当的固定方法，确保导管牢固，防止脱落。



宣教指导

向患者及家属宣教导管维护知识，避免因不当护理导致导管脱落。



观察与记录

定期观察导管位置及固定情况，并做好记录，及时发现并处理问题。



预防其他并发症

1

控制高血压、糖尿病等基础疾病

控制好基础疾病，降低并发症发生的风险。

2

注意观察

密切观察患者情况，及时发现并处理异常情况。

3

健康宣教

向患者及家属提供全面的健康宣教，提高他们的自我防护意识。



03

PICC深静脉置管并发症处理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/185340121013011324>