

2023-24 年广东省江城区《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库及参考答案 (研优卷)

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. 下列选项中，属于四环素禁用的人群有()

- A: 精神病患者
- B: 月经期妇女
- C: 中、老年人
- D: 妊娠期妇女

答案: D

2. 因抑制血管内皮的前列腺素的生成,使血管内的前列腺素和血小板中的血栓素动态平衡失调而致血栓形成风险增加的非甾体抗炎药是()

- A: 双氯芬酸
- B: 阿司匹林
- C: 塞来昔布
- D: 吲哚美辛

答案: C

3. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔后可使用

- A: 2%过氧化氢溶液
- B: 3%过氧化氢溶液
- C: 2%酚甘油滴耳液
- D: 3%酚甘油滴耳液

答案: B

4. 对血小板聚集及凝血机制无影响的药品是（）。

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 罗非昔布
- C: 吲哚美辛
- D: 阿司匹林

答案：A

5. 患儿。女，14 岁。因出现尿频、尿急、尿痛症状 2 天就诊，诊断为急性膀胱炎，患儿既往有癫痫病史，宜选用的治疗药物是（）。

- A: 青霉素 G
- B: 阿奇霉素
- C: 环丙沙星
- D: 呋喃妥因

答案：D

6. 下列属于吗氯贝胺作用机制的表述是

- A: 抑制突触前膜去甲肾上腺素的再摄取
- B: 抑制 A 型单胺氧化酶，减少 5-HT、去甲肾上腺素的降解
- C: 选择性抑制 5-HT 的再摄取，增加突触间隙 5-HT 浓度
- D: 抑制突触前膜 5-HT、去甲肾上腺素的再摄取

答案：B

7. 能治疗强心苷中毒引起的窦性心动过缓的是

- A: 阿托品
- B: 利血平
- C: 哌替啶
- D: 苯妥英钠

答案：A

8. 与两性霉素 B 合用可减少复发率产生协同作用的药物是()

- A: 氟胞嘧啶
- B: 阿昔洛韦
- C: 灰黄霉素
- D: 酮康唑

答案：A

9. 对于丝裂霉素注意事项的描述，错误的是

- A: 只需要在用药期间密切监测血常规、肾功能
- B: 老年患者及肾功能不全者慎用
- C: 溶解后尽快使用，尽量避免同低 pH 的注射液配伍
- D: 长期应用可抑制卵巢及睾丸功能，造成闭经或精子缺乏

答案：A

10. 冠状动脉支架置入术前一日起开始口服阿司匹林，剂量为每日

- A: 25~50mg
- B: 75~150mg
- C: 150~300mg
- D: 10~25mg

答案：A

11. 深部真菌感染首选药，静脉滴注用于真菌性肺炎、心内膜炎的药物是

- A: 膦甲酸钠
- B: 两性霉素 B
- C: 奥司他韦

D: 制霉菌素

答案：B

12. 镇静作用明显的 H

A: 组胺

B: 阿司咪唑

C: 苯海拉明

D: 西咪替丁

答案：C

13. 选择性沉积在牙齿和骨骼中,不可用于 8 岁以下患儿的药物是

A: 氟喹诺酮类

B: 大环内酯类

C: 四环素类

D: 氨基糖苷类

答案：C

14. (2019 年真题) 对磺胺类药物有严重过敏史的患者应避免使用的药物是 ()

A: 西地那非

B: 十一酸睾酮

C: 特拉唑嗪

D: 坦洛新

答案：D

15. 患者女,孕 8 周,诊断为“甲状腺功能减退症”给予左甲状腺素钠片治疗对该患者的用药指导,错误的是 ()

A: 孕期甲减可能对胎儿造成不良影响,服药期间应监测甲功

B: 服用左甲状腺素钠片期间如出现心悸、多汗或体重下降,应及时就诊

C: 左甲状腺素钠极少通过胎盘治疗剂量下对胎儿无不良影响

D: 应于早餐后将一日剂量左甲状腺素钠片一次性用温水送服

答案: D

16. 新生儿和早产儿使用可能会出现致命性的“喘息综合征”的药物是

A: 双环醇

B: 甘草酸二铵注射剂

C: 多烯磷脂酰胆碱注射剂

D: 硫普罗宁注射剂

答案: C

17. 关于乙酰半胱氨酸的说法,错误的是()

A: 乙酰半胱氨酸能减弱青霉素类、头孢菌素类四环素类药物的抗菌活性

B: 乙酰半胱氨酸可用于对乙酰氨基酚中毒解救

C: 乙酰半胱氨酸能裂解脓痰中糖蛋白多肽链中的二硫键,使浓痰易于咳出

D: 对痰液较多的患者,乙酰半胱氨酸可与中枢性镇咳药合用增强疗效

答案: D

18. 治疗膀胱过度活动症宜选用

A: 尼莫地平

B: 坦洛新

C: 利血平

D: 托特罗定

答案: D

19. 患儿，男，7 岁。长期偏食。近 1 个月面色渐苍白，自诉全身无力。体检：肝肋下 4cm，脾肋下 1cm。血常规：Hb70g / L，RBC 3.0×10^{12} / L，Ret2. 0%，WBC、Plt 均正常，MCV74fl，MCH26pg，MCHC30%，考虑为缺铁性贫血。

- A: 口服型铁剂服用时间还根据个体反应而定
- B: 维生素 C 与本品同服，有利于吸收
- C: 进食促进铁剂的吸收
- D: 服用铁剂时可以喝果汁，但不能喝牛奶

答案：C

20. （2018 年真题）普通感冒患者，有打喷嚏、流鼻涕的症状，宜选用的药物是（）

- A: 对乙酰氨基酚滴剂
- B: 右美沙芬片
- C: 茶碱缓释片
- D: 氯苯那敏片

答案：D

21. 下列有关奎尼丁的叙述，不正确的是

- A: 可用于强心苷中毒
- B: 抑制 Na⁺内流和 K⁺外流
- C: 具有抗胆碱和仅受体阻断作用
- D: 可用于治疗心房扑动和心房颤动

答案：A

22. 下列不属于胃肠解痉药的是

- A: 多潘立酮

B: 颠茄

C: 山莨菪碱

D: 阿托品

答案：A

23. 格列本脲的作用特点是

A: 增强胰岛素的作用

B: 提高靶细胞对胰岛素的敏感性

C: 抑制胰高血糖素的分泌

D: 直接抑制肝糖原分解和糖原异生

答案：D

24. 关于米力农使用的叙述，错误的是

A: 不宜用于严重瓣膜狭窄病变，肥厚型梗阻性心肌痛

B: 对心房扑动、心房颤动患者，宜先用强心苷制剂控制心室率

C: 用药期间应监测心率、血压，必要时调整剂量

D: 长期使用可降低死亡率

答案：D

25. 甲地孕酮与利福平合用()

A: 子宫内膜突破性出血

B: 抑制排酸作用

C: 代谢加快而失效

D: 代谢加速而导致意外怀孕

答案：A

26. 关于奥司他韦作用特点的说法，错误的是()

A: 应严格掌握奥司他韦适应证，不能用于流感的预防

B: 1 岁以上儿童可以使用奥司他韦

C: 奥司他韦可用于甲型和乙型流感的治疗

D: 治疗流感时,首次使用奥司他韦应当在流感症状出现后的 48 小时以内

答案: A

27. 属于环氧酶抑制剂的是

A: 双嘧达莫

B: 乙酰唑胺

C: 替格瑞洛

D: 阿司匹林

答案: D

28. (2016 年真题) 可使血小板内环磷腺苷 (cAMP) 浓度增高而产生抗血小板作用的药品是

A: 替罗非班

B: 氯吡格雷

C: 双嘧达莫

D: 阿司匹林

答案: C

29. 腺苷蛋氨酸作为保护肝细胞药的作用机制是

A: 作为细胞膜的重要组分, 特异性地与肝细胞膜结合, 促进肝细胞膜再生, 协调磷脂和细胞膜功能, 降低脂肪浸润, 增强细胞膜的防御能力, 起到稳定、保护、修复细胞膜的作用

B: 降低血清丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 水平

C: 通过各种机制发挥抗炎作用, 有类似激素的作用

D: 促进胆汁分泌, 减轻胆汁淤滞

答案：D

30. 属于糖皮质激素引起的隐匿或延迟不良反应与并发症的是

- A: 青光眼
- B: Cushing 综合征体型
- C: 骨质疏松症
- D: 胰腺炎

答案：C

31. 下列对皮肤真菌感染治疗药叙述错误的是()

- A: 环吡酮胺为吡啶酮类抗真菌药
- B: 酮康唑为咪唑类抗真菌药
- C: 阿莫罗芬为唑类的局部抗真菌药
- D: 奈替芬是丙烯胺类抗真菌药

答案：C

32. 下列药物中属于抗纤维蛋白溶解药的是

- A: 维生素 K
- B: 卡巴克络
- C: 酚磺乙胺
- D: 氨甲环酸

答案：D

33. 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下, 请结合问题作答

。

- A: 贝那普利
- B: 呋塞米
- C: 螺内酯

D: 比索洛尔

答案：A

34. 静脉溶栓首选的药物是

A: 达比加群酯

B: 重组人促红素

C: 维生素 K

D: 阿替普酶

答案：D

35. 可增强吗啡对平滑肌的松弛作用的药物是

A: 纳洛酮

B: 苯甲酸钠咖啡因

C: 氟马西尼

D: 阿托品

答案：D

36. 通过促进或恢复凝血过程而止血的药物是

A: 氨基己酸

B: 卡巴洛克

C: 氨甲苯酸

D: 酚磺乙胺

答案：D

37. 华法林应用过量可选用的拮抗药是

A: 氨基己酸

B: 维生素 K1

C: 鱼精蛋白

D: 葡萄糖酸钙

答案：B

38. 抗病毒药阿昔洛韦在静脉滴注时滴速必须缓慢，否则可能引起的不良反是()。

A: 急性肾衰竭

B: 胰腺坏死

C: 急性肝衰竭

D: 肺部纹理加重

答案：A

39. 抑制质子泵而减少胃酸分泌的药物是

A: 奥美拉唑

B: 谷丙胺

C: 法莫替丁

D: 枸橼酸铋钾

答案：A

40. 在体内不经细胞色素 P450 酶代谢的药物是()

A: 阿托伐他汀

B: 普伐他汀

C: 瑞舒伐他汀

D: 氟伐他汀

答案：B

41. 仅在体内有抗凝血作用的药物是

A: 噻氯匹定

B: 华法林

C: 肝素

D: 尿激酶

答案：B

42. 可引起前庭功能失调（眩晕）的抗菌药物是

A: 左氧氟沙星

B: 米诺环素

C: 甲硝唑

D: 哌拉西林

答案：B

43. 抑制蛋白质合成与功能的药物是()

A: 顺铂

B: 多柔比星

C: 高三尖杉酯碱

D: 氟尿嘧啶

答案：C

44. （2019 年真题）患者，女，13 岁，有哮喘病史，半年前月经初潮，周期 28 天经期持续 4-5 天，月经前两天疼痛明显，影响正常的学习和活动，诊断为原发性痛经，适宜该患者使用的缓解痛经的药物是（）

A: 塞来昔布胶囊

B: 布洛芬片

C: 吲哚美辛栓

D: 对乙酰氨基酚片

答案：D

45. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1 / 18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

- A: 属于半合成紫杉类抗肿瘤药物
- B: 抗肿瘤作用比紫杉醇强
- C: 多西他赛抗肿瘤谱和紫杉醇相同
- D: 作用机制是影响微管蛋白装配、干扰有丝分裂中纺锤体的形成

答案：C

46. 应用硝普钠时的注意事项及用药监护不包括()

- A: 血硫氰酸盐水平
- B: 监测血压
- C: 避光使用
- D: 缓慢静脉注射

答案：D

47. (2016 年真题) 属于 β 受体阻断剂的降低眼压药是

- A: 甘露醇
- B: 乙酰唑胺
- C: 毛果芸香碱
- D: 噻吗洛尔

答案：D

48. 氟尿嘧啶的前体药物，对结肠和直肠癌疗效较高

- A: 卡莫氟
- B: 来曲唑
- C: 喜树碱

D: 甲氨蝶呤

答案：A

49. 可阻断钠通道，用于治疗室性心律失常的药品是

A: 硝酸甘油

B: 氨氯地平

C: 氯沙坦

D: 利多卡因

答案：D

50. 作用机制是竞争雌激素受体的是

A: 巯嘌呤

B: 吉非替尼

C: 紫杉醇

D: 枸橼酸他莫昔芬

答案：D

51. 庚酸炔诺酮()

A: 抗着床

B: 减少精子数目

C: 抑制排卵作用

D: 促进蛋白质合成

答案：C

52. 口服呋喃妥因可用于治疗()

A: 肠道感染

B: 肺感染

C: 尿路感染

D: 呼吸道感染

答案：C

53. 对大多数肠杆菌科细菌和厌氧菌有活性，但对铜绿假单胞菌、不动杆菌及革兰阳性菌（尤其是肠球菌和耐青霉素肺炎球菌）的活性不及其他碳青霉烯类药物的是

A: 西司他丁

B: 厄他培南

C: 美罗培南

D: 亚胺培南

答案：B

54. （2015 年真题）长期使用可使血钾水平升高的药品是（ ）。

A: 乙酰唑胺

B: 氨苯蝶啶

C: 呋达帕胺

D: 呋塞米

答案：B

55. 下列主要用于防治遗传性血管神经水肿的药物是

A: 米非司酮

B: 司坦唑醇

C: 黄体酮

D: 环孢素

答案：B

56. 使淋巴细胞溶解，致淋巴细胞耗竭

A: 亚叶酸钙

B: 地塞米松

C: 氟他胺

D: 昂丹司琼

答案：B

57. 属于 5a 还原酶抑制剂的是

A: 西地那非

B: 坦洛新

C: 他达拉非

D: 度他雄胺

答案：D

58. 容易引起视神经炎的抗结核药物是

A: 异烟肼

B: 利福平

C: 链霉素

D: 乙胺丁醇

答案：D

59. 促进微管的装配，抑制其解聚，从而使纺锤体失去正常功能，细胞有丝分裂停止的药物是

A: 长春碱类

B: 吲哚美辛

C: 紫杉醇

D: 他莫昔芬

答案：C

60. 治疗危重深部真菌感染的唯一有效药是()

- A: 青霉素
- B: 两性霉素 B
- C: 氟康唑
- D: 克林霉素

答案：B

61. 术后复发的甲状腺功能亢进症选用

- A: 格列齐特
- B: 放射性碘
- C: 大剂量碘剂
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：B

62. (2018 年真题) 可抑制粒细胞浸润和白细胞趋化, 用于痛风急性发作的药物是 ()

- A: 别嘌醇
- B: 非布索坦
- C: 秋水仙碱
- D: 苯溴马隆

答案：C

63. 改善心肌收缩功能, 抑制血管肥厚, 可以降低血管僵硬程度, 改善动脉顺应性抗高血压药是

- A: 血管紧张素转换酶抑制药
- B: 钙离子通道阻滞药
- C: α 受体激动药
- D: 利尿降压药

答案：A

64. 毒性低，但胃肠刺激症状较常见的药物是()

- A: 利福平
- B: 吡嗪酰胺
- C: 异烟肼
- D: 对氨基水杨酸

答案：D

65. 可引起肺间质纤维化的抗心律失常药物是

- A: 维拉帕米
- B: 美托洛尔
- C: 胺碘酮
- D: 地尔硫革

答案：C

66. 治疗各种人类血吸虫病的首选药物是

- A: 酒石酸锑钾
- B: 乙胺嗪
- C: 左旋咪唑
- D: 吡喹酮

答案：D

67. 与胆汁酸结合而降血脂的药物是

- A: 氯贝丁酯
- B: 考来烯胺
- C: 烟酸
- D: 洛伐他汀

答案：B

68. (2018 年真题) 高致吐性化疗药物所引起的恶心、呕吐, 宜选用的止吐治疗方案是 ()

- A: 化疗前使用昂丹司琼, 化疗后不需要继续使用止吐药
- B: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦, 化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松
- C: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺
- D: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松, 化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼

答案: B

69. 严重低钾血症、高钠血症、高血压、心力衰竭、肾功能衰竭者禁用的药物是

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 雷尼替丁
- C: 甘草酸二铵
- D: 甲氧氯普胺

答案: C

70. (2017 年真题) 急性缺血性脑卒中发作, 应用溶栓药阿替普酶治疗时间窗是在发病后 ()

- A: 24 小时内
- B: 3 小时内
- C: 12 小时内
- D: 8 小时内

答案: B

71. 下列关于袢利尿药使用的描述中, 不正确的是 ()

- A: 出现利尿药抵抗时，可使用低效利尿药增大剂量
- B: 单独使用可能会使利尿作用降低
- C: 可多次应用最小有效剂量
- D: 可联用作用部位不同的利尿药

答案：A

72. 骨髓抑制较严重的是

- A: 奥沙利铂
- B: 顺铂
- C: 亚叶酸钙
- D: 卡铂

答案：D

73. 一般补钾速度不超过

- A: $10\text{mol} / \text{min}$
- B: $10\text{mmol} / \text{min}$
- C: $10\text{mmol} / \text{h}$
- D: $10\text{mol} / \text{h}$

答案：C

74. 氯霉素抗菌谱广，而最主要的不良反应是()

- A: 胃肠道反应
- B: 二重感染
- C: 对造血系统的毒性
- D: 对肝脏严重损害

答案：C

75. 肝功能不全者应禁用氯化铵，是因为氯化铵

- A: 可降低血氨浓度，诱发肝性脑病
- B: 可升高门脉压力，诱发出血
- C: 可增加血氨浓度，诱发肝性脑病
- D: 可降低门脉压力，诱发出血

答案：C

76. 可作为气道痉挛的应急缓解药物的长效 β 受体激动剂是

- A: 沙丁胺醇
- B: 沙美特罗
- C: 福莫特罗
- D: 丙卡特罗

答案：C

77. 成人应用 0.1% 溶液，儿童应用 0.05% 溶液，这种药物是

- A: 赛洛唑啉滴鼻液
- B: 酚甘油滴耳液
- C: 羟甲唑啉滴鼻液
- D: 麻黄碱滴鼻液

答案：A

78. 患者，男，60 岁诊断为房性心律失常，医生给予胺碘酮治疗。近日，因胃溃疡开始用西咪替丁，出现窦性心动过缓症状。合用西咪替丁，出现窦性心动过缓，原因（）

- A: 西咪替丁诱导 CYP2C9，升高胺碘酮血浆药物浓度
- B: 西咪替丁抑制 CYP1A2，升高胺碘酮血浆药物浓度
- C: 胺碘酮与西咪替丁竞争 CYP2C19，减慢胺碘酮的代谢
- D: 西咪替丁抑制 CYP3A4，升高胺碘酮血浆药物浓度

答案：D

79. 增加肌肉和脂肪组织对胰岛素的敏感性而降低血糖的是()

- A: 瑞格列奈
- B: 罗格列酮
- C: 阿卡波糖
- D: 那格列奈

答案: B

80. 四环素联用抗凝药需要

- A: 口服吸收减少
- B: 增加麦角中毒的风险
- C: 肝毒性增加
- D: 调整抗凝血药的剂量

答案: D

81. 青光眼患者应该慎用

- A: 沙丁胺醇
- B: 孟鲁司特
- C: 沙美特罗
- D: 噻托溴铵

答案: D

82. 患者，男，60 岁，诊断为冠心病，经皮冠状动脉介入术置入支架。医生给予氯吡格雷、阿司匹林抗血小板治疗。

- A: 单次负荷量 300mg 开始，然后以 75mg，每日 1 次连续服药
- B: 在常规服药时间的 12 小时内漏服，应立即补服一次标准剂量，并按照常规服药时间服用下一次剂量
- C: 发现氯吡格雷抗血小板作用不足者可进行代谢酶基因型检测

D: 超过常规服药时间的 12 小时后漏服，应在下次常规服药时间服用加倍剂量

答案：D

83. 下述关于留钾利尿药作用特点的描述，正确的是()

- A: 利尿作用强，药效持久
- B: 对肝硬化者无效
- C: 其利尿作用与体内的醛固酮浓度无关
- D: 具有抑制心肌纤维化的功能

答案：D

84. 主要经胆汁排泄的是

- A: 头孢哌酮
- B: 阿莫西林
- C: 头孢噻肟
- D: 庆大霉素

答案：A

85. 对滴虫、阿米巴和兰氏贾第鞭毛虫等原虫，以及脆弱拟杆菌等厌氧菌具有强大抗菌活性，为治疗阴道滴虫病的首选药物是

- A: 甲硝唑
- B: 克林霉素
- C: 呋喃妥因
- D: 多黏菌素

答案：A

86. 对择期手术者，且无需抗血小板治疗者，应于术前多久考虑停用抗血小板药、抗凝血药

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/185342304132012033>