[单选题]1.病人突然昏迷，颈动脉摸不到搏动，处（江南博哥）理时下列哪项是错误的？()
A.输液及吸氧
B.立即胸外心脏按压
C.心内注射心脏三联针
D.心脏按压的同时行口对口人工呼吸
E.心电图检查确诊后再处理
参考答案：E
[单选题]2.心脏骤停抢救时，病人平卧后应立即()。
A.快速心脏按压
B.快速人工呼吸
C.打开气道
D.抬高病人的头部
E.抬高病人的腿部
参考答案：A
参考解析：CPR的顺序以由“ABC”更改为“CAB”。“C”即指循环。
[单选题]3.心脏按压配合人工呼吸时，在建立气道前，单人或双人操作的按压/通气比均为()。
A.15：2
B.30：2
C.10：1
D.5：2
E.5：1
参考答案：B
[单选题]4.男性，40岁，可疑原发性肝癌，最有助于诊断的化验是()。
A.碱性磷酸酶测定
B.甲胎蛋白测定
C.酸性磷酸酶测定
D.癌胚抗原测定
E.血肌酐测定
参考答案：B
参考解析：甲胎蛋白测定对原发性肝癌的诊断有重要意义，虽然，其他恶性肿瘤和肝脏良性疾病有时也有增加，但毕竟是极少数，况且以上其他各项对于肝癌的诊断基本无意义。
[单选题]5.女性，37岁，半年来每当月经来潮前双乳疼痛，检查双侧乳房可触及大小不等，边界不清的结节样，条索样肿物，肿物与深浅组织均无粘连，初步诊断为()。
A.乳癌

B.乳管内乳头状瘤
C.乳房囊性增生病
D.乳房纤维腺瘤
E.急性乳房炎
参考答案：C
参考解析：乳房囊性增生病的特点是中年女性，周期性乳痛，乳房内多数大小不等，界线不清的肿物，本例属于此病。
[单选题]6.社区卫生服务属于何种基层卫生服务？()
A.有效、经济、简便、综合、阶段
B.有效、经济、方便、综合、连续
C.有效、经济、方便、综合、阶段
D.有效、经济、简便、综合、连续
E.有效、广泛、方便、综合、连续
参考答案：B
参考解析：社区卫生服务是有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。
[单选题]7.低血糖反应，急救措施是()。
A.立即食含糖食品
B.就地休息
C.立即输入氯化钠
D.加大饭量
E.减少胰岛素用量
参考答案：A
参考解析：低血糖的主要反应是因为血糖低于正常水平，最好的解决办法是补充糖。
[单选题]8.对严重挤压伤患者，护理时观察下列哪项最重要？()
A.尿量和尿色
B.肢端温度
C.伤口肿胀程度
D.精神状态
E.局部疼痛情况
参考答案：A
参考解析：严重挤压伤是身体，特别是肌肉丰富部位较长时间受压，引起肌肉缺血坏死，大量的肌红蛋白和血红蛋白引起肾小管堵塞或坏死，发生急性肾衰。而尿量和尿色正是反映肾脏情况的，因此，护理时观察尿量和尿色最重要。
[单选题]9.肾移植术后最常见和最严重的并发症是()。
A.骨髓抑制
B.肺不张

C.泌尿系感染
D.胃十二指肠溃疡出血
E.排斥反应
参考答案：E
参考解析：器官移植最常见和最严重的并发症是排斥反应，肾移植也不例外，其它几项虽然也是肾移植的并发症，但并非是最常见和最严重的。
[单选题]10.康复护理心理疗法不包括()。
A.认知疗法
B.暗示疗法
C.松弛疗法
D.精神支持疗法
E.修养疗法
参考答案：E
[单选题]11.社区卫生服务评价指标错误的说法是()。
A.社区卫生服务需求评价指标--总人口健康者百分率
B.社区卫生服务数量和质量的评价指标--传染病的发病率
C.社区卫生资源的评价指标--人力、物力、财力
D.态度评价指标--社区居民正性和负性认知率
E.效果和结果评价指标--死亡、丧失劳动力、不满意
参考答案：B
[单选题]12.按以下哪种社区分类方式，可将癌症病人协会视为一个社区？()
A.根据人群的共同地理位置划分的社区
B.根据人群的共同兴趣或目标划分的社区
C.根据人群的共同生活制度划分的社区
D.根据人群的共同问题划分的社区
E.根据人群的共同文化背景划分的社区
参考答案：D
[单选题]13.社区护士对健康人群进行的健康教育主要内容是()。
A.卫生保健知识
B.康复知识
C.死亡教育
D.自我监测技能
E.家庭护理技能
参考答案：A
[单选题]14.不符合急性黄疸型肝炎表现的是()。
A.食欲减退
B.疲乏无力
C.恶心、呕吐

D.尿色深黄
E.淋巴结肿大
参考答案：E
[单选题]15.学龄期儿童主要活动之一是学习，对他们学习的要求是()。
A.学习时间不宜过长，学习内容要具体生动并激发其好学动机
B.课上及课下的学习时间尽量多些
C.所学内容尽量多些
D.通过限制其业余活动保证学业优良
E.批评管教学习动机差的学生
参考答案：A
[单选题]16.以下不属于社区健康护理特点的是()。
A.侧重于社区环境健康
B.侧重于居家病人的护理
C.需要政府相关部门的参与
D.侧重社区和群体的健康
E.运用护理程序的五个步骤
参考答案：B
[单选题]17.与教会抑郁症的病人掌握心理自助方法不符的是()。
A.与家人和朋友保持紧密的联系
B.允许自己去感受自己的情绪
C.与他人共同分享自己的感受，可减轻10%的心理压力
D.改变认识，让其意识到接受有痛苦的感觉是正常的事情
E.引导病人正确地面对自己的生活和自我
参考答案：C
[单选题]18.按病原体划分，由寄生虫传播的传染病是()。
A.肺结核
B.麻疹
C.阿米巴痢疾
D.斑疹伤寒
E.霍乱
参考答案：C
[单选题]19.甲类传染病包括()。
A.鼠疫
B.肺结核
C.脊髓灰质炎
D.伤寒
E.艾滋病
参考答案：A

[单选题]20.对于传染病的初访要求错误的是()。
A.填写相关表格以分析、总结
B.调查传染病的来源
C.采取防疫措施
D.核实诊断
E.了解病人病情、防疫措施的实施情况
参考答案：E
[单选题]21.社区护士在家访遇到危险情况时，措施不当的是()。
A.立即离开现场
B.要求更换访视时间
C.留下以保护家庭成员的安全
D.向所在卫生服务机构通报此事
E.如有人受伤，立即通知急救中心
参考答案：C
参考解析：社区护士在家访时若遇到危险情况，为保护自身安全，可立即离开，同时可要求更换家访时间，并向所在卫生服务机构通报此事；为保护家庭成员的安全，如有人受伤，应立即通知急救中心。
[单选题]22.采用食醋熏蒸进行家庭居室空气消毒时，每立方米空间应用食醋量为()。
A.3～5ml
B.5～10ml
C.10～15ml
D.15～20ml
E.20～25ml
参考答案：B
[单选题]23.下列可用于排泄物消毒的方法是()。
A.日光照射
B.煮沸消毒
C.过氧乙酸喷雾
D.过氧乙酸浸泡
E.乙醇倒于盆内燃烧
参考答案：D
参考解析：排泄物消毒可采用漂白粉或过氧乙酸浸泡。
[单选题]24.濒死患者最后消失的感觉是()。
A.视觉
B.听觉
C.嗅觉
D.味觉

E.触觉

参考答案：B

参考解析：临终前患者语言逐渐困难、混乱，视觉逐渐减退，开始只能视近物，以后只存光感，最后什么也看不见。但听力往往存在，许多人到死亡最后一刻仍有听觉。

[单选题]25.患者男性，63岁。肺癌晚期。患者承认已患绝症的现实，面对死亡的来临，表现为稳定、平静、少言寡语。此患者处于心理反应的()。

A.否认阶段

B.愤怒阶段

C.协议阶段

D.抑郁阶段

E.接受阶段

参考答案：E

参考解析：当临终患者心理反应处于接受阶段时，其突出表现是 接受事实，面对死亡的来临表现为稳定、平静、少言寡语 。

[单选题]26.慢性病社区管理需要团队的合作，其中团队的核心是()。

A.全科医生

B.社区护士

C.患者和家属

D.康复师

E.社会工作者

参考答案：B

参考解析：慢性病管理需要团队的合作，团队包括全科医生、社区护士、患者和家属、康复师、心理咨询师、社会工作者以及志愿者等，其中社区护士是团队的核心，起着协调作用。

[单选题]27.不属于乙类传染病的是()。

A.SARS

B.艾滋病

C.乙肝

D.霍乱

E.脊髓灰质炎

参考答案：D

参考解析：霍乱属于甲类传染病。

[单选题]28.属于乙肝传播途径的是()。

A.呼吸道

B.消化道

C.虫媒传播

D.血液传播

E.一般生活接触

参考答案：D

参考解析：乙肝是通过血液传播的，可以是性传播，母婴垂直传播。

[单选题]29.社区护士指导社区内有乳腺癌家族史的40岁以上女性进行乳房自检，这是()。

A.一级预防

B.二级预防

C.三级预防

D.临床期预防

E.病因预防

参考答案：B

参考解析：疾病三级预防的具体内容包括：第一级预防亦称为病因预防；第二级预防亦称 三早 预防，三早即早期发现、早期诊断、早期治疗；第三级预防亦称康复治疗。

[单选题]30.某社区护士将60名痴呆患者家属随机分为干预组和对照组，对干预组通过定期家访，进行为期3个月的家庭护理技能指导，而对照组仅提供电话咨询。在干预前和干预后，采用抑郁自评量表分别评定两组家属的抑郁情绪。该研究设计的类型属于()。

A.描述性研究

B.相关性研究

C.回顾性研究

D.实验性研究

E.类实验性研究

参考答案：D

参考解析：实验性研究应具备三项内容：干预、设对照组、随机化，该项研究具备以上3个条件。

[单选题]31.患者李某，女性，69岁，患高血压病8年，近3个月来间断胸骨后或心前区疼痛，持续3～5分钟，经入院检查确诊为冠心病心绞痛。医生医嘱用硝酸甘油，护士在为患者讲解用药知识中，下列不正确的一项是()。

A.应坐位或卧位服药，以免发生体位性低血压

B.该药应舌下含服，不可吞服或嚼服

C.该药可扩张外周血管，减轻心脏负担

D.一旦出现不良反应，需立即停药不可再服用

E.该药的不良反应有头面部皮肤潮红、搏动性头疼等

参考答案：D

参考解析：硝酸甘油可明显扩张周围血管，具有一定的降压作用，因此个别人在用药后可出现眩晕、摇晃等体位性低血压症状；还可引起头痛，常呈搏动性跳痛；皮肤潮红，以头面部最为明显；由于反射性心动过速所致的心慌等副作

用。为了防止上述副作用，因此舌下含服宜从小剂量(0.3mg) 开始，尽量采取坐卧位，以避免和减轻副作用。头痛一般在连续用药过程中能自行消失，严重时应减少用量；出现头晕时让患者应立即采取脚高头低卧位，去枕仰卧，以利静脉回流增加心脑供血，只要平卧数分钟即可恢复正常。而不是一出现不良反应，就立即停药不再服用。

[单选题]32. 患者，女，75 岁，胃癌晚期，病人承认已患绝症的现实，乞求治疗，延长生命。则此病人处于心理反应的()。

A.否认阶段

B.抑郁阶段

C.协议阶段

D.愤怒阶段

E.接受阶段

参考答案：C

[单选题]33. 儿童心理发育上的一个重大转折时期是()。

A.婴儿期

B.幼儿期

C.学龄前期

D.学龄期

E.青春期

参考答案：D

参考解析：从入小学起（6～7 岁）到进入青春期（12～14 岁）前为止称学龄期（相当于小学学龄期）。学龄期是长知识、接受科学文化教育的重要时期，也是儿童心理发展上的一个重大转折时期。

[单选题]34. 对中年期的生活习惯保健说法，正确的是()。

A.形成健康生活习惯，促进自我保健

B.紧张的工作中注意压力管理及精神保健

C.适当安排娱乐及闲暇

D.增进组织内成员问的有效沟通

E.增进夫妻间的交流及理解，加深感情

参考答案：A

[单选题]35. 以下在原发性高血压发病过程中占主导地位的是()。

A.高级神经中枢功能失调

B.内分泌失调

C.水钠潴留，血容量增多

D.小血管痉挛

E.遗传

参考答案：A

[单选题]36. 2 型糖尿病患者，体态肥胖， 三多一少 症状不太明显，血糖偏

高，长期采用饮食控制、休息、口服降血糖药，但血糖仍高，对此处理最恰当的是()。
A.改用胰岛素治疗
B.增加运动疗法
C.住院进一步检查
D.用抗生素控制感染
E.加大降糖药剂量
参考答案：B
[单选题]37.构成社区的最基本要素是()。
A.规章制度
B.管理机构
C.人群和地域
D.服务设施
E.生活背景
参考答案：C
参考解析：社区是指聚居在一定地域范围内的人们所组成的社会生活共同体，目前城市社区的范围，一般的指经过社区体制改革后作了规模调整的居民委员会辖区。社区的基本要素中，人群是主体，而地域是构成社区的不可缺少的物质条件。
[单选题]38.家庭访视的准备内容不包括()。
A.确立访视对象
B.家属图
C.确定访视目的
D.安排访视路线
E.预防
参考答案：B
[单选题]39.男孩，8个月。呕吐腹泻1周，哭而无泪，无尿、嗜睡，皮肤弹性极差，前囟及眼窝凹陷，脉细数，四肢冰凉，血清钠125ml/L。考虑为()。
A.中度等渗性脱水
B.中度低渗性脱水
C.中度高渗性脱水
D.重度低渗性脱水
E.重度等渗性脱水
参考答案：D
[单选题]40.子宫痉挛性狭窄环是指()。
A.破膜后，环可自行消失
B.此环可自腹部扪清
C.环可随子宫收缩上升

不阻碍胎儿先露下降

E.子宫环形肌肉不协调性过强收缩形成的环状狭窄，可发生于胎儿较小部位

参考答案：E

参考解析：子宫壁局部肌肉呈痉挛性不协调性收缩形成的环状狭窄，持续不放松，称为子宫痉挛性狭窄环。狭窄环可发生在宫颈、宫体的任何部分，多在子宫上下段交界处，也可在胎体某一狭窄部，以胎颈、胎腰处常见。

[单选题]41.妊娠期合并重症肝炎的护理措施，错误的是()。

A.每日蛋白质的摄人量小于0.5g/kg

B.口服新霉素或甲硝唑抑制大肠杆菌，减少毒素的产生及吸收

C.每日肥泉水灌肠，减少游离氨的产生

D.严密观察有无肝性脑病前驱症状

E.每日入液量为前日尿量加500ml液体量

参考答案：C

参考解析：妊娠合并重症肝炎时为预防肝昏迷的发生，应控制血氨，蛋白质的摄入量每日应小于0.5g/kg ，增加碳水化合物，保持大便通畅，减少氨及毒素的吸收，但不宜肥泉水灌肠，因为肥皂水呈碱性，使产氨增加，加重肝性脑病。口服新霉素或甲硝唑抑制大肠杆菌，可减少毒素的产生及吸收，肾功能衰竭者应严格限制人液量，每日人液量为前日尿量加500ml液体量；严密观察有无肝性脑病前驱症状。

[单选题]42.小儿添加辅食不正确的做法是()。

A.4个月小儿应及时添加辅食

B.在小儿消化功能正常时添加辅食

C.4个月时可添加蛋黄

D.2个月时可添加果汁

E.早产儿宜早添辅食，以加快生长

参考答案：E

参考解析：早产儿消化系统发育不完善，应根据生长发育情况4个月以后逐渐添加辅食。

[单选题]43.充血性心力衰竭早期的代偿表现为()。

A.心肌收缩力增加

B.心搏出量增加

C.射血分数增加

D.心率增快

E.回心血量增加

参考答案：D

参考解析：在早期心功能代偿期，机体通过加快心率、心肌肥厚和心脏扩大进行代偿，以调整心排血量来满足机体需要。

[单选题]44.先天性甲状腺功能减低症患儿应用药物治疗症状好转后，最应注意

()。
A.补充营养
B.补充水分
C.预防感染
D.增加活动
E.补充碘盐
参考答案：A
参考解析：当先天性甲状腺功能减低症患儿应用药物治疗症状好转后，其代谢增强，生长发育加速，因此必须要选择高蛋白、高维生素、富含钙及铁剂的易消化饮食。
[单选题]45.流行性腮腺炎常见的并发症为()。
A.脑膜脑炎
B.支气管肺炎
C.眼结膜炎
D.中耳炎
E.肾小球肾炎
参考答案：A
参考解析：流行性腮腺炎的常见并发症由脑膜脑炎、睾丸炎、胰腺炎等。
[单选题]46.支气管肺癌病人最常见的早期症状是()。
A.刺激性呛咳
B.痰中带血
C.胸痛气急
D.发热消瘦
E.副癌综合征
参考答案：A
参考解析：咳嗽为肺癌早期常见症状，常为刺激性干咳，可有持续性高音调金属音。
[单选题]47.一肥厚型心肌病病人发生心前区疼痛，下列护理措施中错误的是()。
A.立即停止活动，卧床休息
B.安慰病人，解除紧张情绪
C.硝酸甘油舌下含服
D.吸氧
E.密切观察病情变化
参考答案：C
参考解析：肥厚型心肌病病人护理措施：①休息。良好的身心休息能延缓心力衰竭发生，可根据心功能情况安排休息与活动。②饮食。给予低热量、易消化、低盐、高纤维素和维生素食物，少食多餐。③病情观察和对症护理。为病

厥等征象，并给予对症护理，同时备好抢救药品和用物。肥厚型心肌病患者应禁用硝酸酯类药物，以避免加重左室流出梗阻；也应避免使用强心苷类药物如洋地黄等以及减轻心脏负荷的药物；建议使用β受体阻滞剂和钙通道阻滞剂。

[单选题]48.关于母乳喂养错误的指导是()。

A.多吸、频吸可减少母乳分泌

B.婴儿4个月后可停止夜间喂奶

C.夜间哺乳催乳素分泌是白天的10倍

D.纯母乳喂养儿，乳母应适当补充维生素K

E.纯母乳喂养儿出生2周后应服用维生素D400IU/d

参考答案：A

[单选题]49.新生儿期特有现象中错误的是()。

A.胸围略大于头围1～2cm

B.生理性体重下降

C.新生儿黄疸

D.呼吸40～60次/分，心率90～160次/分

E.新生儿初期体温波动较大

参考答案：A

[单选题]50.传染病疫情报告的方法，哪项不妥？()

A.发现传染病病人立即填写传染病报告卡

B.紧急情况下不用填写报告卡，直接用电话方式报告

C.对可疑传染病病人，如经确诊应作订正报告

D.对病人治愈或死亡时，作转归报告

E.若发现漏报传染病病人，应立即作补充报告

参考答案：B

[单选题]51.正常情况下每小时胎动约()。

A.0～2次

B.3～5次

C.6～8次

D.7～9次

E.15次

参考答案：B

[单选题]52.学龄前儿童的主要活动应该是()。

A.与父母游园

B.看电视

C.合作游戏(有组织的集体游戏)

D.听家中大人讲故事

E.与邻居小朋友玩耍

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/186000105005010101