

2024 年广东省阳东区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试大全【精选题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 关于尿蛋白和尿葡萄糖的叙述正确的是

- A: 出现蛋白尿时即表明机体出现病理性变化
- B: 当人体肾脏的肾小球通透能力下降时会出现蛋白尿
- C: 尿液中出现葡萄糖只取决于血糖水平的高低
- D: 正常情况下，人体尿液中的尿蛋白含最和尿葡萄糖含量都极微

答案：D

2. 判别“大三阳”区别于“小三阳”的主要检查项目为

- A: 抗-HBe(+)
- B: 抗-HBc(+)
- C: 抗-HBs(+)
- D: HBeAg(+)

答案：D

3. 患者，女，39 岁，有哮喘病史。1 天前因发热服用阿司匹林 250mg，用药后 30 分钟哮喘严重发作，大汗、发绀、强迫坐位。

- A: 这是由于发热引发了哮喘
- B: 这是由于阿司匹林诱发了哮喘
- C: 可用肾上腺素治疗
- D: 这是阿司匹林中毒的表现

答案：B

4. 患者，女，27 岁，妊娠 5 个月，确诊为单纯性外阴阴道假丝酵母菌病，首选用药方案是

- A: 1: 2 服克林霉素 300mg，每日 2 次，连用 7 日
- B: 咪康唑栓，阴道给药，每晚 1 粒（200mg），连用 7 日
- C: 口服甲硝唑 400mg，每日 2 次，连服 7 日
- D: 甲硝唑阴道栓（片）200mg，阴道用药，每晚 1 次. 连用 7 日

答案：B

5. 下述“药物治疗慢性阻塞性肺疾病的目的”中，不正确的是

- A: 排痰化痰
- B: 减少病死率
- C: 预防疾病进展
- D: 缓解呼吸道症状

答案：A

6. 超常处方

- A: 无正当理由不首选国家基本药物
- B: 黄连素用于细菌性腹泻
- C: 二甲双胍用于糖尿病患者
- D: 无适应证用药

答案：D

7. 1%硫酸铜溶液催吐用于解救

- A: 丙咪嗪中毒
- B: 三唑仑中毒
- C: 巴比妥中毒
- D: 磷化锌中毒

答案：D

8. 属于核苷酸类 HIV 逆转录酶抑制剂的是（）

- A: 阿巴卡韦
- B: 洛匹那韦
- C: 奈韦拉平
- D: 多替拉韦

答案：A

9. （2016 年真题）患者接受顺铂化疗时，药师应重点监测的不良反是（）。

- A: 肺纤维化
- B: 肾脏毒性
- C: 心脏毒性
- D: 肝脏毒性

答案：B

10. 患者，男，60 岁，呈典型的“面具脸”、“慌张步态”及“小字征”表现，确诊为帕金森病，患者同时患有闭角型青光眼，不宜选用的治疗帕金森病药物是（）

- A: 多奈哌齐
- B: 左旋多巴
- C: 司来吉兰
- D: 普拉克索

答案：B

11. 艾滋病抗病毒治疗强调须多种药物联合治疗，俗称“鸡尾酒疗法”，目前国内免费治疗的一线方案是（）

- A: 拉米夫定+替诺福韦+齐多夫定

- B: 替诺福韦+依非韦伦+雷特格韦
- C: 齐多夫定+依非韦伦+利托那韦
- D: 拉米夫定+司他夫定+奈韦拉平

答案: D

12. 第二代抗组胺药氯雷他定治疗过敏性鼻炎的用法、用量是

- A: 一次 10mg，每日 1 次
- B: 一次 4mg，每日 1 次
- C: 一次 4mg，每日 3 次
- D: 一次 2mg，每日 3 次

答案: A

13. 患者，男，50 岁，主诉咳嗽，症状持续 8 天，现在每次咳嗽都伴有黄痰，由于咳嗽感到疲劳和睡眠困难，近期末患其他疾病。患者 14 岁的儿子最近患轻度感冒，无恶心、呕吐、发热及畏寒。既往史：服用赖诺普利控制高血压、服用阿托伐他汀治疗高脂血症、服用小剂量阿司匹林预防脑卒中。查体：体温 37.1℃、心率 70 次/分、血压 130/70mmHg、呼吸 18 次/分，动脉血氧饱和度为 98%，肺部可闻及喘鸣音。

- A: 社区获得性肺炎
- B: 急性支气管炎
- C: 肺气肿
- D: 肺结核

答案: B

14. 患者，男，50 岁，临床诊断为“焦虑障碍”，给予氟西汀 20mgqd 治疗。对该患者的用药指导，错误的是

- A: 服用氟西汀期间不能饮酒

B: 不能突然停止服用氟西汀

C: 不得随意自行调整氟西汀剂量

D: 氟西汀应于睡前服用

答案: D

15. 不宜与 5-羟色胺再摄取抑制剂合用的抗震颤麻痹药是

A: 司来吉兰

B: 金刚烷胺

C: 复方左旋多巴

D: 苯海索

答案: A

16. 受精后半个月以内

A: 几乎见不到药物的致畸作用

B: 中枢神经系统发育迟缓

C: 女性生殖系统发育迟缓

D: 可产生形态或功能的异常而造成畸形

答案: A

17. (2019 年真题) 患者，男，50 岁，临床诊断为焦虑症，给予氟西汀 20mgqd 治疗。对该患者用药教育的说法错误的是

A: 服用氟西汀期间不能饮酒

B: 不能突然停止服用氟西汀

C: 不得随意自行调整氟西汀剂量

D: 氟西汀应于睡前服用

答案: D

18. 女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体格检查面色较苍白。血红蛋白 80g / L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 $7 \times 10^9 / L$ ，血小板 $120 \times 10^9 / L$ ，血清铁 300 $\mu g / L$ 。

- A: 硫酸亚铁口服
- B: 输血
- C: 右旋糖酐铁肌注
- D: 维生素 B12 肌肉注射

答案：A

19. 下列药物中，不属于三环类抗抑郁药的是（）

- A: 氯米帕明
- B: 丙米嗪
- C: 阿米替林
- D: 氟伏沙明

答案：D

20. 患者，女，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190 / 110mmHg，R30 次 / 分，Bp108 次 / 分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 室性期前收缩
- B: 心室颤动
- C: 阵发性室上性心动过速
- D: 心房颤动

答案：D

21. 临终关怀是对于预期寿命少于几个月的慢病终末期患者的一项特殊疗护项目（）

A: 10

B: 5

C: 6

D: 12

答案：C

22. (2016 年真题) 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mgtidpo，阿托伐他汀钙片 20mgqdpo 等药物治疗。

A: 二甲双胍肠溶片应于餐后服用

B: 阿托伐他汀钙片可在一天中任何时候固定时间给药

C: 瑞格列奈片应于餐前服用

D: 一旦出现低血糖症状，应立即口服葡萄糖水、糖块、巧克力等

答案：A

23. 以下属于急性肾盂肾炎的表现的是

A: 可出现排尿不适、下腹痛和排尿困难

B: 约 30%可出现血尿

C: 尿液常浑浊，有异味

D: 老年人表现不典型，可仅表现为纳差、淡漠、谵妄等

答案：D

24. 痛风缓解期宜选用的治疗药物是()

A: 泼尼松

B: 秋水仙碱

C: 阿司匹林

D: 苯溴马隆

答案：D

25. 通常用于妊娠高血压患者紧急降压的药物是

- A: 呋塞米
- B: 缬沙坦
- C: 硝苯地平
- D: 赖诺普利

答案：C

26. 治疗咳嗽应依据咳嗽的频率和程度选药，剧咳者宜首选的止咳非处方药是

- A: 可待因
- B: 右美沙芬
- C: 苯丙哌林
- D: 吗啡

答案：C

27. 可能导致 γ -谷氨酰转移酶升高的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 苯妥英钠
- C: 氯氮平
- D: 胰岛素

答案：B

28. 应贮存在凉暗处的药物是

- A: 硫酸亚铁片
- B: 头孢拉定
- C: 重组人促红细胞生成素
- D: 托烷司琼注射剂

答案：D

29. (2019 年真题) 下列药物中，适宜在餐前服用的是

- A: 双氯芬酸钠片
- B: 头孢辛酯片
- C: 莫沙必利片
- D: 伊马替尼片

答案：C

30. 降纤治疗

- A: 低分子肝素
- B: 阿替普酶
- C: 阿司匹林
- D: 巴曲酶

答案：D

31. 理论效价的表示中，以其特定的“盐” $1\mu\text{g}$ 作为 1IU 抗生素是

- A: 土霉素
- B: 链霉素
- C: 盐酸四环素
- D: 红霉素

答案：C

32. 根据体重计算婴幼儿的剂量时注

- A: 不可调整
- B: 选用剂量的上限
- C: 可适当调整
- D: 应减少用量

答案：B

33. MHT 具体治疗方案,已切除子宫的妇女宜选用

- A: 雌孕激素连续联合用药
- B: 单纯孕激素补充治疗
- C: 雌孕激素间隔用药
- D: 单纯雌激素补充治疗

答案：D

34. 患者，女，44 岁，半年前诊断为支气管哮喘，间断服用沙丁胺醇 4mg tid 治疗，没有规律用药治疗。因秋冬季交替出现明显喘憋，话不成句，被紧急送医预防治疗。

- A: 布地奈德气雾剂
- B: 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂
- C: 沙丁胺醇气雾剂
- D: 沙丁胺醇片

答案：C

35. 饮酒可使其代谢加快、药效减弱的药物是

- A: 维生素 B
- B: 苯妥英钠
- C: 卡马西平
- D: 利血平

答案：B

36. 溃疡或胃酸过多的人不宜饮用

- A: 咖啡
- B: 高盐饮食

C: 饮茶

D: 吸烟

答案: A

37. 患儿男, 2 岁, 误服水银后应选用的洗胃液是 ()

A: 1:5000 高锰酸钾溶液

B: 淀粉溶液

C: 鸡蛋清

D: 牛奶与水等量混合

答案: C

38. 归属于药历“患者基本情况”内容的是

A: 主要实验室检查数据

B: 联合用药

C: 临床诊断

D: 医保和费用支付情况

答案: D

39. 粪外观所对应的疾病, 阻塞性黄疸

A: 暗红果酱色

B: 米泔水样

C: 柏油便, 黑色有光泽

D: 白陶土便

答案: D

40. 导致血糖异常、糖尿病的是

A: 加替沙星

B: 己烯雌酚

C: 罗非昔布

D: 阿托伐他汀

答案: A

41. 氯化钾注射液的正确给药方法是

A: 鞘内注射给药

B: 稀释后静脉滴注

C: 直接肌内注射

D: 直接静脉注射

答案: B

42. 美金刚的主要不良反应是

A: 心律不齐

B: 幻觉

C: 呼吸抑制

D: 血脂升高

答案: B

43. 常见的患者用药咨询内容不包括

A: 药品名称

B: 国外新药动态

C: 药物相互作用

D: 药品适应证

答案: B

44. (2017 年真题) 药师在工作中预防用药错误可以采取的行为不包括
()

A: 进行用药指导

- B: 自行修改错误处方
- C: 仔细核对药品
- D: 严格审核处方

答案: B

45. PDR 是由美国医学经济公司和 ThomsonHealthcare 公司编辑出版的药品集，每年综合汇编 1 册，主要介绍

- A: 美国市场上的药品
- B: 美国市场上的常用处方药
- C: 美国临床常用的药品
- D: 各国市场上的常用处方药

答案: B

46. 可以迅速缓解哮喘症状，起效快的药品是

- A: β -受体阻断剂
- B: 吸入型糖皮质激素
- C: 短效 β_2 -受体激动剂
- D: 非甾体抗炎药

答案: C

47. 杨某，女，19 岁，咳嗽，有脓性痰，并伴有胸痛；发热 39℃；肺闻及湿性啰音；WBC $>13 \times 10^9/L$

- A: 链霉素
- B: 红霉素
- C: 利福霉素
- D: 左氧氟沙星

答案: D

48. 患者，女，55 岁，诊断为混合型血脂异常，需联合应用他汀类和贝特类，最佳的给药方法是

- A: 早晚联合服用他汀和贝特类
- B: 晚上联合服用他汀类和贝特类
- C: 早晨服用他汀类，晚上服用贝特类
- D: 早晨服用贝特类，晚上服用他汀类

答案：D

49. “-巴坦”的药名词干缩写是

- A: eef-
- B: #NAME?
- C: #NAME?
- D: #NAME?

答案：D

50. 中成药血脂康中含有的化学药物成分是

- A: 阿托伐他汀钙
- B: 洛伐他汀
- C: 依折麦布
- D: 辛伐他汀

答案：B

51. 服用抗结核药异烟肼时，不

- A: 喝茶
- B: 吃鱼
- C: 吸烟
- D: 饮酒

答案：B

52. 审核处方的合法性、规范性与用药的适宜性，归属于

- A: 治疗药物监测
- B: 处方点评
- C: 处方审核
- D: 静脉药物配置

答案：C

53. 外阴阴道假丝酵母菌病宜选用

- A: 制霉菌素
- B: 林可霉素
- C: 甲硝唑
- D: 庆大霉素

答案：A

54. 某溶液的浓度为 1：100，其含义为

- A: 1L 溶液中含有的溶质为 0.1mol
- B: 100ml 溶液中含有 1g 溶质
- C: 100ml 溶液中含有 1ml 溶质
- D: 100g 溶液中含有 1g 溶质

答案：B

55. 治疗需用 10%葡萄糖注射液 1000ml，现仅有 50%和 5%浓度的葡萄糖注射液，分别取 50%和 5%浓度的葡萄糖注射液多少毫升进行配制

- A: 111ml，889ml
- B: 500ml，500ml
- C: 200ml，800ml

D: 889ml, 111ml

答案：A

56. 患者，男，59 岁，因多尿，下肢浮肿就诊。体征和实验室检查：
BMI28.3kg / m²，餐前血糖 7.8mmol / L，餐后血糖 13.6mmol / L，糖化
血红蛋白 7.9%，血清 C 肽 0.2 μg / L，三酰甘油 2.8mmol / L。建议服
用

A: 二甲双胍

B: 吡格列酮

C: 格列吡嗪

D: 格列本脲

答案：A

57. 下列哪种药物是 WHO 规定的第一阶梯镇痛药物

A: 芬太尼

B: 吗啡

C: 可待因

D: 阿司匹林

答案：D

58. 患者，男，65 岁，诊断为持续性心房纤颤，医生处方胺碘酮和华法林治
疗。患者既往有高血压、糖尿病、冠心病和高脂血症，目前正在服用贝
那普利、美托洛尔、二甲双胍、阿卡波糖、辛伐他汀等药物治疗。根
据患者用药情况，药师提出的合理化药物治疗建议，不包括()

A: 胺碘酮能增加华法林的抗凝活性，在逐渐降低胺碘酮剂量的时候，注
意随时根据 INR 值调整华法林的剂量

B: 因为胺碘酮和贝那普利存在临床意义的相互作用，建议换成氨氯地
平等 CCB 降压药

C: 患者在复律成功后,尽可能以最小的胺碘酮剂量维持治疗

D: 胺碘酮可以显著抑制 CYP2D6,减慢美托洛尔的代谢,应该根据患者心率和血压调整美托洛尔剂量

答案: B

59. 患者,男,48岁。十二指肠溃疡病史2年,近感头痛、眩晕而就诊。查体:血压160/100mmHg。经一段时间观察及定期检查后,医师诊断为高血压病。

A: 胍屈嗪

B: 利血平

C: 氢氯噻嗪

D: 可乐定

答案: B

60. 患者,男,72岁既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。一个月前因出现哮喘症状就诊医师布地奈德气雾剂200 μ g bid吸入沙丁胺醇气雾剂100 μ g prn吸入,氨氯地平片5mg qd口服及硝酸甘油片0.5mg prn舌下含服治疗。

A: 非洛地平

B: 缬沙坦

C: 维拉帕米

D: 普萘洛尔

答案: B

61. 患者女45岁,既往有心律失常(Q-T间期延长)、低钾血症近日因发热、咳嗽、咳痰就诊,诊断为社区获得性肺炎。该患者不宜选用的药物是()

A: 阿莫西林

- B: 莫西沙星
- C: 头孢呋辛酯
- D: 氨溴索

答案：B

62. 用于晚期不宜手术或复发的局限性肿瘤

- A: 腔内注射
- B: 静脉注射
- C: 肌肉注射
- D: 动脉注药

答案：D

63. (2019 年真题) 患者，男，25 岁，有癫痫病史 2 年，一直服用丙戊酸钠和左乙拉西坦，癫痫控制良好，近期因社区获得性肺炎入院。下列药物中最可能影响患者基础疾病控制的是

- A: 莫西沙星
- B: 头孢曲松
- C: 阿莫西林
- D: 阿奇霉素

答案：A

64. 高血压伴低钾血症患者慎用的药物是()

- A: 氨氯地平
- B: 美托洛尔
- C: 依那普利
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

65. 处方中“餐后给药”的外文缩写是

A: po

B: pc

C: Ac

D: qn

答案：B

66. 沿静脉出现迂回线状色素沉着

A: 氟尿嘧啶

B: 白消安

C: 柔红霉素

D: 博来霉素

答案：A

67. 高血压合并心力衰竭不宜用下哪种药物

A: 普萘洛尔

B: 哌唑嗪

C: 卡托普利

D: 氢氯噻嗪

答案：A

68. 诊断为输尿管结石，给予黄体酮，应评判为

A: 有禁忌证用药

B: 过度治疗用药

C: 无正当理由超适应证用药

D: 联合用药不适宜

答案：C

69. 口服奥司他韦(达菲)治疗流感宜及早用药，较为有效的用药时间是症状出现的

- A: 72 小时内
- B: 108 小时内
- C: 96 小时内
- D: 48 小时内

答案：D

70. 下列关于肾功能不全患者给药方案调整方法，错误的是：

- A: 肾功能不全而肝功能正常者，可选用双通道(肝肾)消除的药物
- B: 肾功能不全者首选肝胆代谢和排泄的药物
- C: 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以延长给药间隔或减少给药剂量
- D: 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以同时服用碳酸氢钠来碱化尿液，以促进药物排泄，防止药源性疾病

答案：D

71. 指明其资料来源通过超链接指向其材料来源

- A: 权威性
- B: 合理性
- C: 新颖性
- D: 归因性

答案：D

72. 所有的 UA/NSTEMI 患者均应尽早使用阿司匹林，首次服用剂量为（ ）

- A: 300mg
- B: 100mg

C: 75mg

D: 150mg

答案：A

73. 下列药学服务的重要的人群中，特殊人群是指

A: 需要重新选择药品或调整用药方案者

B: 药物治疗窗窄、需要做监测者

C: 应用特殊剂型者

D: 肝肾功能不全者

答案：D

74. 发热的判断标准是指人体昼夜体温波动超过 1°C ，腋下温度超过

A: 37.6°C

B: 36.7°C

C: 37.3°C

D: 37.0°C

答案：D

75. 临床急需 70%乙醇 400ml，问需取 95%乙醇的体积是

A: 280ml

B: 290ml

C: 285ml

D: 295ml

答案：D

76. 肖爷爷家的保姆来社区药店咨询购买治疗腹泻药品。询问后得知：肖爷爷 72 岁，独居，平日由保姆照顾起居。2 天前开始腹泻，水样便，患者看上去虚弱乏力，身上长了红疹，但能正常饮食。有心衰和背痛病史，平常服用的药品有地高辛、呋塞米、对乙酰氨基酚；5 天前因“咽炎”，医生处方“阿莫西林胶囊，500mg tid，连续服用 7 天”，还未吃完。药师应给予的正确建议是

- A: 停用阿莫西林，并立即就医
- B: 继续服用原有药物
- C: 停用地高辛
- D: 停用呋塞米

答案：A

77. 用药期间禁止饮酒则可出现面部潮红、头痛、眩晕等“双硫仑样反应”的药品是

- A: 庆大霉素？
- B: 青霉素钾？
- C: 替硝唑？
- D: 克林霉素？

答案：C

78. 下列药物中，属于可逆性、选择性单胺氧化酶 A 抑制剂的是（）

- A: 阿米替林
- B: 氯米帕明
- C: 吗氯贝胺
- D: 氟伏沙明

答案：C

79. 老年糖尿病患者不建议使用

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 长效磺脲类
- B: α -葡萄糖苷酶抑制剂
- C: 噻唑烷二酮类

D: 双胍类

答案：A

80. 抑制胃酸分泌作用的药物是

A: 莫沙必利

B: 奥美拉唑

C: 碳酸氢钠

D: 西沙必利

答案：B

81. 他汀类药物引起的典型药源性疾病是

A: 肌病

B: 血液系统疾病

C: 胃肠道反应

D: 神经系统疾病

答案：A

82. 5%葡萄糖注射液 500ml 含有葡萄糖的克数是()

A: 10

B: 25

C: 30

D: 33.3

答案：B

83. 特异体质者应当慎用解热镇痛药，其机制是用药后可能发生

A: 出血

B: 惊厥

C: 虚脱

D: 过敏反应

答案：D

84. (新生儿期的药动学特点)肾脏的有效循环血量与肾小球滤过率较成人低 30%~40%可影响

A: 药物吸收

B: 药物代谢

C: 药物中毒

D: 药物排泄

答案：D

85. 治疗反复性偏头痛推荐应用的处方药是

A: 阿司匹林

B: 苯妥英钠

C: 谷维素

D: 麦角胺咖啡因

答案：D

86. 医师用药咨询的内容是

A: 不宜选用氯化钠注射液溶解的药品

B: 减肥、补钙、补充营养素

C: 抗菌药物的合理使用

D: 栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法

答案：C

87. 以下咨询问题的分类属于用药方法的是

A: 这药能治我这种病吗

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 这次拿的"×××"(商品名)是我以前一直服用的"格列齐特"吗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/186201042101011030>