

2023-24 年山东省淄川区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库大全（历年真题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2018 年真题）患者，女，34 岁，因易疲劳、体重增加、反应迟钝、肌肉痉挛就诊，化验结果显示 TSH 增高 FT3、FT4 减低，临床诊断为甲状腺功能减退使用左甲状腺素钠 100 μ gqd 治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是（）

- A: 睡前顿服
- B: 早餐前半小时，顿服
- C: 晚餐后顿服
- D: 早餐后半小时，顿服

答案：B

2. 患者，女，45 岁，关节痛半年，临床诊断为类风湿关节炎，既往有十二指肠溃疡病史，应首选的 NSAID 是

- A: 布洛芬
- B: 双氯芬酸
- C: 塞来昔布
- D: 吲哚美辛

答案：C

3. II 期临床试验很难发现“低于 1% 发生频率”的不良反应，缘于

- A: 考察不全面
- B: 管理漏洞

C: 病例数目少

D: 观察时间短

答案: C

4. 肾或膀胱结石

A: 尿酸盐结晶

B: 磷酸盐结晶

C: 酪氨酸和亮氨酸结晶

D: 草酸盐结晶

答案: D

5. 提示"每次用药前检查药品外观有无变化，发现异常立即停用"，是针对

A: 特殊剂型用法

B: 特殊装置药品

C: 药品有效期

D: 药品贮存

答案: D

6. 患者，男，72 岁，在晨练中突然感觉胸痛，倒地不起，周围伙伴急忙拨打 120。医务人员赶到现场后，初步诊断是心绞痛急性发作。经简单急救后，将病人送至医院治疗。并为患者开具了下列药物：阿司匹林肠溶片、洛伐他汀、硝苯地平、硝酸甘油。

A: 比索洛尔

B: 硝酸异山梨酯舌下片

C: 氯吡格雷

D: 普伐他汀

答案: B

7. 不需要睡前服用的他汀类药物为

- A: 洛伐他汀
- B: 辛伐他汀
- C: 阿托伐他汀
- D: 普伐他汀

答案：C

8. 应用格列本脲时，应注意的事项是

- A: 服药期间不宜饮酒
- B: 服药期间不宜饮茶
- C: 用药期间宜吃高蛋白食物
- D: 用药期间不宜食用富含组胺类的食物

答案：A

9. 静脉注射两性霉素 B 的适宜溶媒是

- A: 5%葡萄糖注射液
- B: 50%葡萄糖注射液
- C: 0.9%氯化钠注射液
- D: 复方氨基酸注射液

答案：A

10. 若空腹服药，则胃排空快，药物在短时间内进入十二指肠与小肠；餐后服用可延缓胃排空，使药物在胃中较充分地吸收，且能够减少或避免药物对胃粘膜的刺激。因此，一般药品适宜餐后服用。

- A: 餐前服用
- B: 餐后服用
- C: 餐中服用

D: 清晨服用

答案: A

11. 患者,男,38 岁,因腹部受寒胃痉挛疼痛,应选用的药物是()

A: 卡马西平

B: 麦角胺咖啡因

C: 山莨菪碱

D: 布洛芬

答案: C

12. (2016 年真题) 患者到药店购买“扑尔敏片”,药师应给予()。

A: 氯苯那敏片

B: 更昔洛韦片

C: 奥司他韦片

D: 阿昔洛韦片

答案: A

13. 交代患者药品未开启包装时应置于 2℃~8℃保存,开始使用后不要存放于冰箱中,可在室温下(不超过 25℃)存放 4 周的是

A: 米索前列醇

B: 枸橼酸铋钾

C: 胰岛素注射剂

D: 氟西汀

答案: C

14. 药师在进行药学服务时,经常查阅一些相关网站,获取一些有用信息}中国药学会的网址是

A: www. cm

B: org. cn

C: org. cn

D: www. cp

答案：C

15. 引起视网膜变性而致失明，服药半年左右应查眼底 DMARDs 是

A: 环孢素

B: 利妥昔单抗

C: 氯喹

D: 硫唑嘌呤

答案：C

16. 对有过敏倾向和特异体质以及有 ADR 家族史的患者，最重要的是

A: 注意特殊人群用药

B: 了解患者及家族的过敏史

C: 注意定期监测器官功能

D: 注意药物的迟发反应

答案：B

17. 增加患者出现高血糖或低血糖症隐患的药品是

A: 拉氧头孢

B: 利巴韦林

C: 头孢哌酮

D: 加替沙星

答案：D

18. 不属于用药错误在药师发药环节技术层面的防范措施是

A: 良好的服务态度和服务语言标准化

- B: 交代正确的给药时间
- C: 保持清新、整齐、干净和安静的环境
- D: 正确交代药物用量

答案：C

19. 审核发现严重滥用药品的处方，药师应该

- A: 修改、调配此处方并发出药品
- B: 拒绝调配此处方，并依照有关规定报告
- C: 依照此处方调配药品、发出药品
- D: 拒绝调配此处方

答案：B

20. 血液净化疗法可使重症毒物中毒者愈后大为改观，血液净化的方法不包括

- A: 血液置换
- B: 血液透析
- C: 腹膜透析
- D: 血液滤过

答案：A

21. 夏季用前宜在冰箱冷藏室放置 15 分钟的剂型是（）

- A: 含漱剂
- B: 软膏剂
- C: 滴眼剂
- D: 直肠栓剂

答案：D

22. β 受体阻断剂的主要不良反应是

- A: 直立性低血压
- B: 足踝部水肿
- C: 血尿酸升高
- D: 支气管痉挛

答案：D

23. 妊娠期妇女用药应该格外谨慎，在不同孕期药物对胚胎和胎儿的影响不同，一般情况下，用药后不会出现畸形胎儿的时间是在受精后

- A: 21 天之内
- B: 3 个月之后
- C: 28 天之内
- D: 18 天之内

答案：D

24. 欲用 95%乙醇和蒸馏水配置 70%乙醇 1000ml，所取 95%乙醇体积约为：

- A: 665ml
- B: 700ml
- C: 500ml
- D: 737ml

答案：D

25. （2016 年真题）关于癌症疼痛患者止痛药使用原则的说法，错误的是（）。

- A: 应个体化用药
- B: 按阶梯给药
- C: 疼痛时用药，不痛时不需用药
- D: 提倡无创给药方式，尽量口服

答案：C

26. 消化不良很常见，半数以上人群在生命过程中曾因此病症而就诊，其主要症状有上腹饱胀、食欲缺乏等表现。

- A: 复方阿嗝米特肠溶片
- B: 胃蛋白酶合剂
- C: 莫沙必利
- D: 胰酶片

答案：B

27. 抑郁症患者的核心症状为（）

- A: 意志活动减退
- B: 心境低落
- C: 思维迟缓
- D: 认知功能损害

答案：B

28. (抗癫痫药物的选择)，癫痫部分发作的一线用药是

- A: 扑米酮
- B: 加巴喷丁
- C: 卡马西平
- D: 乙琥胺

答案：C

29. (2018 年真题) 患者,女,71 岁,2 型糖尿病史 10 年。化验结果糖化血红蛋白 (HbA1c) 9.2%,空腹血糖 10.5mmol/L,餐后血糖 15.5mmo/L。目前服用二甲双胍片 0.5gtidpo,格列美脲片 2mgtidpo,罗格列酮片 2mgbidpo,甲钴胺片 0.5mgtidpo,羟苯磺酸钙胶囊 250mgbidpo。

- A: 甲钴胺片 0.5mg tid po
- B: 二甲双胍片 0.5g tid po
- C: 罗格列酮片 2mg bid po
- D: 格列美脲片 2mg tid po

答案：D

30. 主要用于抗真菌的药物是

- A: 阿糖腺苷
- B: 氟尿嘧啶
- C: 阿糖胞苷
- D: 氟胞嘧啶

答案：D

31. 不能用于治疗缺铁性贫血的药物是

- A: 硫酸亚铁
- B: 去铁胺
- C: 葡萄糖酸亚铁
- D: 乳酸亚铁

答案：B

32. 临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径, 半衰期小于 30min 且治疗指数低的药物通常选择()

- A: 每个半衰期给药 1 次
- B: 静脉滴注给药
- C: 2~3 个半衰期给药 1 次
- D: 每日给药 1 次

答案：B

33. 药品不良反应 (ADR) 的机制和影响因素错综复杂，遇到可疑 ADR 时，需要进行因果关系评价患者，男，32 岁，因细菌性扁桃体炎口服阿莫西林胶囊，出现全身瘙痒，立即停药，无特殊治疗，患者症状逐渐好转，未再服用阿莫西林。该 ADR 的因果关系评价结果是

- A: 很可能
- B: 肯定
- C: 可能
- D: 可能无关

答案：A

34. 服用地西泮等苯二氮

- A: 烟
- B: 咖啡
- C: 浓茶
- D: 酒

答案：A

35. 人的体重指数 (BMI) = 体重 (kg) / 身高的平方 (m²)，中国人根据 BMI 值判断肥胖的标准是

- A: ≥ 28
- B: < 18.5
- C: ≥ 26
- D: $18.5 \sim 23.9$

答案：A

36. 自我药疗时，初治滴虫性阴道炎，每日口服甲硝唑 800mg 连续用药时间为

- A: 7 天

B: 3 天

C: 5 天

D: 1 天

答案：A

37. 患者，男，69 岁，BMI27.8kg/m²，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

A: 注意关节保暖

B: 疼痛加重时，可将止痛药嚼碎服用

C: 遵医嘱，不得自行增加剂量

D: 应适当减轻体重

答案：B

38. 以下对 ADR 监测的目的和意义的叙述中，不正确的是

A: 促进新药的研制开发

B: 简化或缩短新药临床试验

C: 促进临床合理用药

D: 减少 ADR 的危害

答案：B

39. 属于整合酶抑制剂(II)进入抑制剂的是

A: 恩夫韦替

B: 沙奎那韦

C: 扎西他滨

D: 奈韦拉平

答案：A

40. 一日一次用药的外文规范缩写是

- A: q. o. d
- B: q. h
- C: q. n
- D: q. d

答案：D

41. 患者，女，31 岁，因丙型病毒性肝炎使用 α 干扰素联合利巴韦林治疗。下列关于用药期间避孕和备孕措施的说法，正确的是()

- A: 干扰素、利巴韦林易引起畸胎或者胚胎致死效应，治疗期间和治疗后 6 个月内，必须采取避孕措施
- B: 干扰素、利巴韦林较为安全，停药后即可备孕
- C: 干扰素、利巴韦林较为安全，停药 3 个月后可备孕
- D: 干扰素、利巴韦林较为安全，不必停药，即可备孕

答案：A

42. 患者，男，21 岁因过敏性鼻炎就诊。关于过敏性鼻炎药物治疗及用药教育的说法，错误的是()

- A: 治疗过敏性鼻炎使用口服糖皮质激素，首选地塞米松
- B: 过敏性鼻炎患者应尽量避免接触已知的过敏原
- C: 治疗过敏性鼻炎可局部使用糖皮质激素鼻喷剂
- D: 过敏性鼻炎的典型症状和感冒症状相似，应注意鉴别

答案：A

43. 患者，男，1 岁，近期出现乏力、下肢步态不稳、行走困难、嗜睡。经临床检查，各项血细胞均偏低；血涂片中可见多数大卵圆形的红细胞，中性粒细胞分叶过多，可见 5 叶或 6 叶以上的分叶，偶可见巨大血小板。确诊为巨幼细胞贫血，应给予的治疗药物是

- A: 输入新鲜血浆
- B: 叶酸片、维生素 B12 片
- C: 硫酸亚铁片
- D: 促红细胞生成素注射剂

答案：B

44. 患者,男,65 岁因咳嗽、咳大量脓痰、呼吸困难入院,诊断为慢性阻塞性肺病急性加重。该患者临床治疗不应选用的药物是 ()

- A: 右美沙芬
- B: 氨溴索
- C: 羧甲司坦
- D: 乙酰半胱氨酸

答案：A

45. 中度贫血的评价指标是血红蛋白 (Hb) 含量为 (g / L)

- A: 60~90
- B: 90~120
- C: <30
- D: 30~60

答案：A

46. 某患者，诊断为抑郁症，服用帕罗西汀 6 周，无明显效果，现考虑更换 MAOIs 类药物，必须先停用帕罗西汀

- A: 3 天
- B: 1 周
- C: 2 周
- D: 5 天

答案：C

47. 患尿路感染，在无病原学结果前，一般首选（）

- A: 针对革兰阳性杆菌有效的抗菌药物
- B: 针对革兰阳性球菌有效的抗菌药物
- C: 针对革兰阴性球菌有效的抗菌药物
- D: 针对革兰阴性杆菌有效的抗菌药物

答案：D

48. 下述“质子泵抑制剂的合理应用与治疗监护点”中，不正确的是（）

- A: 肝功能障碍患者慎用
- B: 妊娠及哺乳期妇女、儿童禁用
- C: 多数为肠溶制剂，服药时不宜嚼碎
- D: 高龄患者慎用

答案：B

49. （2017 年真题）下列关于甲状腺功能亢进症患者教育的说法错误的是（）

- A: 避免使用含碘药物
- B: 禁食富含碘的食物
- C: 妊娠伴甲状腺功能亢进症患者宜选甲巯咪唑
- D: 避免饮用咖啡等兴奋性饮料

答案：C

50. 下列药物中服用后不影响驾驶行为的是（）

- A: 左甲状腺素钠片
- B: 东莨菪碱片
- C: 阿米洛利片

D: 氟桂利嗪胶囊

答案: A

51. 胃食管反流病患者应避免服用的药物是

A: 关托洛尔

B: 阿司匹林

C: 阿仑膦酸钠

D: 特拉唑嗪

答案: C

52. (2021 年真题) 患者, 男, 69 岁, BMI27. 8kg/mr, 既往有骨性关节炎病史。近期爬山后, 再次出现膝关节疼痛, 患者热敷后疼痛未缓解, 前来咨询如何选用“止痛药”。

A: 口干

B: 肾损害

C: 便秘

D: 共济失调

答案: B

53. 嗜酸性粒细胞增多可能提示的疾患是

A: 病毒感染性腹泻

B: 铅、铋中毒

C: 感染性疾病如肺结核

D: 过敏性疾病如荨麻疹

答案: D

54. 给幼儿患者选用糖浆、水剂、冲剂等较合适, 显示儿童用药原则是

A: 避免食物的影响

- B: 严格掌握用药剂量
- C: 根据儿童特点选择适宜的给药方案
- D: 密切监护

答案：C

55. 救治磷化锌中毒，不能应用的催吐药是

- A: 阿扑吗啡
- B: 硫酸铜
- C: 硫酸钠
- D: 硫酸镁

答案：A

56. 有关尿酸及尿淀粉酶的叙述正确的是

- A: 尿酸增高即代表有病理性病变
- B: 急性胰腺炎发作期可引起尿淀粉酶增高
- C: 尿酸为体内嘧啶类代谢分解的产物
- D: 人体尿酸主要来自于食物的分解代谢

答案：B

57. (2018 年真题) 药师应掌握处方中常用的外文缩写，“每晚”用药的缩写是 ()

- A: qid
- B: qd
- C: prn
- D: qn

答案：D

58. (孕妇用药注意事项) 孕妇使用可导致胎儿甲状腺功能低下的药品是

- A: 胰岛素
- B: 甲巯咪唑
- C: 青霉素类
- D: 氮芥类

答案：B

59. 下列药物中使用前无需皮试的是

- A: 苄星青霉素注射剂
- B: 紫杉醇注射剂
- C: 抗狂犬病病毒血清注射剂
- D: 抑肽酶注射剂

答案：B

60. 须在冷处保存，且避免冻结的常用药品是

- A: 多巴胺
- B: 复方甘草合剂
- C: 硫酸阿托品
- D: 双歧三联活菌制剂

答案：D

61. 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的抗高血压药是

- A: 比索洛尔
- B: 厄贝沙坦
- C: 氨氯地平
- D: 卡托普利

答案：B

62. 下面属于消化性溃疡发病机制中胃、十二指肠黏膜的攻击因素的是

- A: 胃黏液
- B: HCO_3^- 的分泌
- C: 非甾体抗炎药
- D: 胃黏膜屏障

答案：C

63. 治疗三叉神经痛者首选的药物是

- A: 谷维素
- B: 地西泮
- C: 卡马西平
- D: 布洛芬

答案：C

64. 治疗胆囊炎的药物需选用

- A: H_2 受体阻断剂
- B: M 受体激动剂
- C: 消炎利胆片
- D: 质子泵抑制剂

答案：C

65. 属于单胺氧化酶抑制剂的药品是

- A: 雷尼替丁
- B: 度洛西汀
- C: 吗氯贝胺
- D: 奥美拉唑

答案：C

66. 服药期间饮酒可致药效增强、引发风险的药物是

- A: 泼尼松
- B: 维生素
- C: 格列本脲
- D: 维生素

答案：C

67. 患者女,32 岁,一天前发热体温 39.8℃全身乏力,四肢疼痛近日有流感患者接触史。查体见咽部轻度充血,血常规检查白细胞计数偏低,中性粒细胞比例低,该患者最适宜选用的药物是()

- A: 利巴韦林片
- B: 奥司他韦胶囊
- C: 金刚烷胺片
- D: 阿昔洛韦片

答案：B

68. 可引起良性颅压增高、囟门隆起

- A: 抗组胺药
- B: 氯霉素
- C: 苯妥英钠
- D: 维生素 A

答案：D

69. (2017 年真题) 半衰期大于 24h 的药物通常选择 ()

- A: 每日给药 1 次
- B: 每个半衰期给药 1 次
- C: 静脉滴注给药
- D: 2~3 个半衰期给药 1 次

答案：A

70. 哺乳期妇女应用下列药物会对乳婴产生何种不良影响, 过量维生素 D

- A: 可能引起乳婴视神经损害、智力障碍
- B: 可能致胎儿畸形
- C: 可引起过期妊娠、产程过长和产后出血
- D: 导致新生儿血钙过高

答案: D

71. 将药物治疗的成本与所产生的效益归化为以货币为单位的数字, 用以评估药物治疗方案的经济性是指

- A: 最小成本分析
- B: 最大效果分析
- C: 成本-效益分析
- D: 成本-效用分析

答案: C

72. 老年人服用可能出现认知功能受损、谵妄、跌倒的药物是

- A: 苯二氮䓬类药
- B: 双嘧达莫
- C: 哌替啶
- D: 甲氧氯普胺

答案: A

73. 根据药物对胎儿的危害, 美国 FDA 将妊娠用药毒性分为 A、B、C、D、X 五个级别, 正常剂量维生素 D 的妊娠毒性分级是()

- A: X 级
- B: D 级
- C: A 级

D: C 级

答案: C

74. 非甾体抗炎药的不良反应,偶可致无菌性脑膜炎

A: 保泰松

B: 美洛昔康

C: 布洛芬

D: 塞来昔布

答案: C

75. 过敏性疾病、皮肤病与寄生虫病可呈现

A: 淋巴细胞增多

B: 中性粒细胞增多

C: 嗜酸性粒细胞增多

D: 单核细胞增多

答案: C

76. IV期临床试验是在广泛使用的条件下考察药品疗效和不良反应,样本数常见病不少于

A: 300 例

B: 2000 例

C: 100 例

D: 1000 例

答案: B

77. 头孢菌素注射剂作为皮肤过敏试验的浓度是

A: 500 μ g/ml

B: 250 μ g/ml

C: 100 $\mu\text{g} / \text{ml}$

D: 750 μ / ml

答案：A

78. 患者，女，24 岁，患有缺铁性贫血并伴有慢性腹泻，实验室检查：Hb55g / L，血清铁 12 $\mu\text{g} / \text{L}$ ，首选的治疗方案是（）

A: 静脉滴注铁剂

B: 注射维生素 B12

C: 口服铁剂及维生素 C

D: 雄性激素治疗

答案：A

79. （2019 年真题）患者，男，62 岁，无吸烟饮酒史，患高血压、高脂血症数年，未治疗。半年前就诊，查肝肾功能正常，按医嘱服用阿托伐他汀、氨氯地平。服药一个月后复查肝功能结果显示：AST145U/L，ALT134U/L，排除了其他疾病因素后，停用阿托伐他汀，肝功能逐步恢复正常。一个月后改用普伐他汀，再次出现肝功能异常。肝功能异常的不良反应用与他汀类药物之间的因果关系应评价为

A: 可能

B: 可能无关

C: 肯定

D: 很可能

答案：C

80. 患者，女，36 岁。患支气管哮喘，以上哪种药物能够最有效地控制哮喘呼吸道炎症

A: 短效 β_2 受体激动剂

B: β_2 受体阻断剂

C: 白三烯受体阻断剂

D: 糖皮质激素

答案: D

81. 癫痫持续状态的好发年龄段是

A: 1 岁以内及 65 岁以上

B: 55 岁以上

C: 65 岁以上

D: 6 岁以内

答案: A

82. 根据中国营养学会推荐，老年人在每日饮食之外，应补充的元素钙剂量为 (??)

A: 2000—4000mg

B: 50mg

C: 100mg

D: 500—600mg

答案: D

83. 可引起血红蛋白减少的疾病为

A: 胃溃疡

B: 糖尿病

C: 肾移植术后发生排斥反应

D: 过敏性疾病如支气管哮喘、荨麻疹等

答案: A

84. 应用华法林抗凝治疗时，INR 安全有效范围为血栓性疾病患者实施抗凝治疗，应该控制国际标准化比值为

A: 2.0~3.0

B: >3.0

C: 2.0~2.5

D: <2.0

答案：A

85. 对小动脉、小静脉和微静脉均有扩张作用，用于高血压危象、高血压脑病、恶性高血压等高血压急症的是

A: 氨力农

B: 硝普钠

C: 地高辛

D: 多巴酚丁胺

答案：B

86. 药物对孕妇的不良影响中，摄入过量泻药、利尿药可能引起()。

A: 死胎

B: 畸形

C: 流产

D: 溶血

答案：C

87. 对乙酰氨基酚的妊娠毒性分级是（）

A: C 级

B: X 级

C: A 级

D: B 级

答案：D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/186205213105011030>