

高级卫生专业资格（正高副高）麻醉学专业资格(正高副高)

模拟题2025 年(101)

(总分 83.XX01,考试时间 120 分钟)

不定项选择

1. 女，50 岁，农民，平时下地干活。诊断为嗜铬细胞瘤。探查肿瘤时血压骤升至 220/140mmHg，心率 120 次份，采取何种措施最合适
- A. 吸入恩氟烷 2.0MAC
- B. ATP 2mg/kg 缓慢静注
- C. 乌拉地尔 20mg 缓慢静注
- D. 酚妥拉明 1~2mg 静注，必要时追加
- E. 加深麻醉，减少输液量，操作轻柔
2. 患者，男，25 岁，既往体健，急进高原后第三天，突然出现头痛、心悸、呼吸困难、发绀，频繁干咳，后咳出大量粉红色泡沫痰。该患者初步诊断为
- A. 急性高原病
- B. 混合型慢性高原病
- C. 高原肺水肿
- D. 高原脑水肿
- E. 高原心脏病
3. 患者，男，29 岁。被打伤头部住院 4 天，意识清楚，伤后有短暂脑脊液鼻漏，已停，现头痛剧烈。该患者意识无障碍，生命体征平稳，只有头痛，而无其他特殊症状。下一步的处理方案为（ ）。
- A. 应用哌替啶肌内注射
- B. 口服镇痛药曲马多
- C. 继续应用脱水剂
- D. 停用脱水剂治疗，增加相关升颅压的治疗
- E. 应用咪达唑仑镇静调整
4. 患者，男，因左下肢干性坏疽，拟行截肢术。入院后体温 39℃，呼吸 32 次 1 分，昏迷，面色苍白，呼出气有“烂苹果”味。下列选项中，比较合适的治疗措施是（ ）。
- A. 神经外科手术
- B. 给予碳酸氢钠
- C. 给予 10%葡萄糖
- D. 不做处理而行截肢术
- E. 给予胰岛素、碳酸氢钠及氯化钾
5. 患者，男，饱胃，后脑外伤清醒，拟行急诊手术。该患者麻醉前最重要的准备是（ ）。
- A. 血常规检查

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

- B. 补液
 - C. 插粗胃管排空胃内容物
 - D. 血气分析
 - E. 心电图检查
6. 患者，男，烟龄 40 年，伴有慢性支气管炎。该患者伴有高血压，对其进行麻醉诱导时不恰当的是（ ）。
- A. 诱导中保持呼吸道通畅
 - B. 避免呛咳
 - C. 半清醒插管
 - D. 充分给氧去氮
 - E. 采用对循环抑制较轻的药物
7. 患者，男，28 岁。突发右侧胸痛 2 小时入院，术前诊断：右侧肺大疱破裂、气胸，拟行胸腔镜探查、右侧肺大疱切除术。术后如果患者不能发声，持久不愈，应当考虑的并发症是（ ）。
- A. 咽炎
 - B. 声带麻痹
 - C. 声门下水肿
 - D. 喉水肿
 - E. 勺状软骨脱臼
8. 患者，男，37 岁。实质性脏器破裂，急行剖腹探查。查体：一般情况较差，贫血面貌，心率 120 次/分，律齐，两肺呼吸音清，血压 80/60mmHg。患者曾患乙肝、肝硬化腹水。术中输液暂不需（ ）。
- A. 胶体液
 - B. 10%葡萄糖液
 - C. 5%碳酸氢钠
 - D. 新鲜血
 - E. 平衡盐液
9. 患者，男，55 岁。因完全性肠梗阻、感染性休克伴肾功能衰竭急诊行剖腹探查术，因是饱胃患者拟行快速诱导后气管插管。麻醉维持中最适合的肌松药是（ ）。
- A. 阿曲库铵
 - B. 维库溴铵
 - C. 泮库溴铵
 - D. 罗库溴铵
 - E. 琥珀胆碱
10. 患者，女，28 岁。车祸致骨盆骨折，右股骨干开放性骨折。体温 39.1℃，血压 55/25mmHg，脉搏 135 次/分，呼吸 23 次/分。术前未置胃肠减压管，拟行急症股骨干骨折切开复位内固定术。术前抗胆碱药宜选用（ ）。
- A. 阿托品
 - B. 东莨菪碱
 - C. 胃长宁
 - D. 长托宁
 - E. 山莨菪碱
11. 患儿，3 岁。右颈胸肿物 1 个月余，诊断为右中纵隔、右颈淋巴管肿物，择期行肿物切除术。选择哪种麻醉最为合理（ ）。

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

- A. 全麻+颈丛阻滞
- B. 颈丛阻滞
- C. 全麻气管插管
- D. 硬膜外
- E. 局麻

12. 患者，男，36岁。车床操作工，因铁屑引起眼贯穿伤，为取出铁屑，要求施行全身麻醉。从眼科医师的角度，该患者全麻诱导时应特别注意（ ）。

- A. 眼内压升高
- B. 眼心反射
- C. 颅内压升高
- D. 血压升高
- E. 呕吐误吸

13. 患者，男，66岁。胸闷胸痛间断发作4年加重3个月，诊断为CAD、三支病变，拟行CPB下CABG术。该患者的麻醉原则是（ ）。

- A. 维持心率不大于75mmHg
- B. 增加心脏的前负荷
- C. 维持平均动脉血压不低于85mmHg
- D. 维持心脏的氧供需平衡
- E. 增加心脏的前向血流

14. 患者男，13岁。车祸致双下肢广泛撕脱伤，急送手术室。神志恍惚，血压45/30mmHg，脉搏160次/分。无哮喘史，空腹。上述情况最先应该处理的是（ ）。

- A. 给予氨茶碱
- B. 给予地塞米松
- C. 加深麻醉
- D. 将气管导管外拔少许
- E. 增大肌松药剂量

15. 女，50岁，农民，平时下地干活。诊断为嗜铬细胞瘤。为使血压控制效果更好宜复合用药，哪个更好

- A. 硝普钠
- B. 硝酸甘油
- C. 艾司洛尔
- D. 右旋美托咪定
- E. 卡托普利

16. 患者，男，25岁，既往体健，急进高原后第三天，突然出现头痛、心悸、呼吸困难、发绀，频繁干咳，后咳出大量粉红色泡沫痰。患者的体征和检查中，下述均可能会有，除了

- A. 双肺可闻及湿啰音
- B. 肺动脉瓣第二心音亢进
- C. 不完全右束支传导阻滞
- D. 心电图电轴左偏
- E. 白细胞总数增高

17. 4岁患儿在全麻下行腹腔镜阑尾切除术，术后拔除气管导管后送入恢复室。给予监测观察5分钟后，突然出现呼吸急促，面色发绀，并咳出粉红色泡沫痰。此患儿最可能的诊断

- A. 支气管痉挛
- B. 术后精神障碍

- C. 急性肺水肿
- D. 疼痛刺激
- E. 喉痉挛

18. 患者，男，68岁。高血压病史8年，长期服用美托洛尔（倍他乐克），利血平等药物，血压控制良好，现拟行胃癌根治术。最适合的麻醉方法为（ ）。

- A. 硬膜外麻醉
- B. 腰麻
- C. 静脉麻醉
- D. 吸入麻醉
- E. 静吸复合麻醉

19. 患者，男，因左下肢干性坏疽，拟行截肢术。入院后体温39℃，呼吸32次/分，昏迷，面色苍白，呼出气有“烂苹果”味。术前检查除常规外，还应检查（ ）。

- A. 腹部B超
- B. 血糖、尿糖、尿酮体
- C. 脑电图
- D. 腹部听诊
- E. 血糖、尿糖

20. 患者，男，饱胃，后脑外伤清醒，拟行急诊手术。在下列情况下，该患者最易发生胃内容物反流误吸的是（ ）。

- A. 快速诱导非去极化肌松下插管
- B. 局麻手术
- C. 咽喉表面麻醉清醒插管
- D. 不插管保留自主呼吸静脉麻醉
- E. 完全清醒后拔除插管

21. 患者，男，70岁。拟行左上肺切除术。术前了解病情，对麻醉意义相对不大的是（ ）。

- A. 体格检查
- B. 营养情况
- C. 近期用药
- D. 婚姻史
- E. 查看病历

22. 患者，男，37岁。实质性脏器破裂，急行剖腹探查。查体：一般情况较差，贫血面貌，心率120次/分，律齐，两肺呼吸音清，血压80/60mmHg。患者曾患乙肝、肝硬化腹水。术中低血压首选的是（ ）。

- A. 强心药
- B. 缩血管药
- C. 利尿
- D. 扩充血容量
- E. 改用局麻+强化

23. 患者，女，60岁。既往有慢性支气管病史。两年前诊断为甲亢，一直服用甲疏咪唑治疗。现欲行甲状腺大部切除手术。对于口服药物需要调整的是（ ）。

- A. 术前2周停药，改用卢戈液
- B. 术前2周停药，改用β受体阻断剂
- C. 术前1周停药，改用卢戈液
- D. 术前1周停药，改用β受体阻断剂

E. 可不用作调整

24. 患者，女，28岁。车祸致骨盆骨折，右股骨干开放性骨折。体温 39.1℃，血压 55/25mmHg，脉搏 135 次/分，呼吸 23 次/分。术前未置胃肠减压管，拟行急症股骨干骨折切开复位内固定术。首选的麻醉方法为（ ）。

A. 全麻快速诱导插管

B. 腰麻

C. 全麻清醒插管

D. 硬膜外阻滞

E. 脊麻、硬膜外联合阻滞

25. 患儿，3岁。右颈胸肿物 1 个月余，诊断为右中纵隔、右颈淋巴管肿物，择期行肿物切除术。麻醉医师术中不易观察到的是（ ）。

A. 出血

B. 缺氧

C. 神经损伤

D. 血容量

E. 胸膜破裂

26. 患者，女，43岁，因神志不清 2 小时入院。2 小时前患者排便时突感头痛，很快呼之不应，恶心，呕吐，立即送到医院。头颅 CT 示：“蛛网膜下出血”。3 天后患者基本醒转，但有些烦躁，GCS 评分 13 分。为了进一步明确诊断，此时可以选择的最有效的检查是（ ）。

A. 侧脑室造影

B. MRI

C. 脑室造影

D. 脑血管造影

E. CT

27. 患者，男，66岁。胸闷胸痛间断发作 4 年加重 3 个月，诊断为 CAD、三支病变，拟行 CPB 下 CABG 术。该患者不用 >2MAC 异氟烷麻醉，主要原因是（ ）。

A. 异氟烷可引起冠状动脉窃血

B. 异氟烷可能具有肝脏毒性

C. 异氟烷吸入可引起心率减慢

D. 异氟烷可引起冠状动脉痉挛

E. 异氟烷对心肌抑制作用很强

28. 男性患者，35岁，身高 1.70 体重 98kg，拟在全麻下行腹腔镜胆囊切除术，患者甲-颌距离 2 横指，张口度 3 横指，麻醉选择清醒诱导全麻。麻醉诱导过程中最重要的是预防

A. 缺氧

B. 喉痉挛

C. 呛咳

D. 血压波动

E. 舌后坠

29. 患者男 55 岁，拟在常温下行脑膜血管瘤摘除术，术前血压 160/95mmHg，EKG、肝、肾功能正常，术中拟行控制性降压。该患者安全的降压水平为

A. 收缩压 60~70mmHg

B. 收缩压 85~95mmHg

C. 收缩压 50~80mmHg

D. 舒张压 40~50mmHg

E. 收缩压降至基础血压 25%

30. 女，50 岁，农民，平时下地干活。诊断为嗜铬细胞瘤。摘除肿瘤并停用酚妥拉明，血压在 40/20mmHg。不当的处理是

- A. 加快输液，最好两路线
- B. 静注肾上腺素或去甲肾上腺素
- C. 静注多巴胺
- D. 提高吸入氧浓度
- E. 取头低位

31. 患者，男，25 岁，既往体健，急进高原后第三天，突然出现头痛、心悸、呼吸困难、发绀，频繁干咳，后咳出大量粉红色泡沫痰。该患者应该采用的治疗除外

- A. 立即转移，回到低海拔
- B. 保持呼吸通畅，清除分泌物
- C. 高流量吸入氧气
- D. 低温降低耗氧
- E. 高压氧舱治疗

32. 4 岁患儿在全麻下行腹腔镜阑尾切除术，术后拔除气管导管后送入恢复室。给予监测观察 5 分钟后，突然出现呼吸急促，面色发绀，并咳出粉红色泡沫痰。此时肺部听诊可及

- A. 呼吸音低
- B. 呼吸音正常
- C. 干啰音及少量湿啰音
- D. 呼吸音不可及
- E. 满肺大水泡音

33. 患者，男，68 岁。高血压病史 8 年，长期服用美托洛尔（倍他乐克），利血平等药物，血压控制良好，现拟行胃癌根治术。为预防麻醉期间心动过缓，该患者麻醉前可常规加用（ ）。

- A. 麻黄碱
- B. 多巴胺
- C. 肾上腺素
- D. 阿托品
- E. 异丙肾上腺素

34. 患者，男，饱胃，后脑外伤清醒，拟行急诊手术。术毕拔除插管时发生呕吐，最关键的处理是（ ）。

- A. 吸氧
- B. 使用催吐药
- C. 加快输液
- D. 使用止吐药
- E. 使患者处于头低足高位，喉镜明视下吸除口咽喉呕吐物

35. 患者，男，70 岁。拟行左上肺切除术。手术顺利结束，患者清醒后回到病房不久出现低氧血症。不是低氧血症的原因的是（ ）。

- A. 胸腔闭式引流
- B. 伤口疼痛
- C. 患者本身的肺功能损害
- D. 肌松药残余
- E. 下颌松弛，分泌物流入气道

36. 患者，女，66岁。无烟酒嗜好，拟行胆囊摘除+胆总管探查术。对麻醉作用大的术前了解是（ ）。

- A. 查看病历
- B. 营养状况
- C. 肝肾功能
- D. 心肺功能
- E. 以上均是

37. 患者，男，63岁。拟行胆囊切除术。术前检查发现有冠心病、陈旧性心肌梗死，自诉偶有心跳不规则。血压 170/110mmHg，脉搏 104 次/分。血液生化检查提示：空腹血糖 7.8mmol/L(140mg/dl)，血清胆固醇 460mg，血清钾 3.8mmol/L。患者双亲均在 50 岁左右死于心脏病。导致冠心病发作的危险因素是（ ）。

- A. 高胆固醇血症
- B. 糖尿病
- C. 高血压
- D. 家族史
- E. 以上所有

38. 患者，女，60岁。既往有慢性支气管病史。两年前诊断为甲亢，一直服用甲疏咪唑治疗。现欲行甲状腺大部切除手术。CT 检查发现该患者部分气管受压，肺功能检查未发现明显异常，下列选项中麻醉方法最佳的是（ ）。

- A. 颈丛阻滞
- B. 局麻
- C. 硬膜外阻滞
- D. 全麻气管插管
- E. 应用喉罩

39. 患者，女，28岁。车祸致骨盆骨折，右股骨干开放性骨折。体温 39.1℃，血压 55/25mmHg，脉搏 135 次/分，呼吸 23 次/分。术前未置胃肠减压管，拟行急症股骨干骨折切开复位内固定术。术前准备错误的是（ ）。

- A. 静脉注射哌替啶 50mg 止痛
- B. 快速补液进行抗休克治疗，血压回升后进行麻醉诱导
- C. 置入硬质粗胃管，吸引胃内容物
- D. 静脉注射西咪替丁 200mg
- E. 静脉注射甲氧氯普胺 10mg

40. 患儿，3岁。右颈胸肿物 1 个月余，诊断为右中纵隔、右颈淋巴管肿物，择期行肿物切除术。手术中对组织影响不大的是（ ）。

- A. 动脉
- B. 神经
- C. 胸膜
- D. 胸导管
- E. 静脉

41. 患者，女，43岁，因神志不清 2 小时入院。2 小时前患者排便时突感头痛，很快呼之不应，恶心，呕吐，立即送到医院。头颅 CT 示：“蛛网膜下出血”。3 天后患者基本醒转，但有些烦躁，GCS 评分 13 分。该患者麻醉时禁用（ ）。

- A. 芬太尼
- B. 氯胺酮

C. γ -ON

D. 丙泊酚

E. 利多卡因

42. 患者男，13岁。车祸致双下肢广泛撕脱伤，急送手术室。神志恍惚，血压45/30mmHg，脉搏160次/分。无哮喘史，空腹。麻醉前用药最佳的是（ ）。

A. 阿托品肌注

B. 地西洋肌注

C. 吗啡肌注

D. 东莨菪碱诱导前静注

E. 苯巴比妥肌注

43. 男性患者，35岁，身高1.70m体重98kg，拟在全麻下行腹腔镜胆囊切除术，患者甲-颌距离2横指，张口度3横指，麻醉选择清醒诱导全麻。术中通气应采取

A. 经喉罩人工通气

B. 人工通气、增大分钟通气量

C. 高频喷射通气

D. 呼气末正压通气

E. 同步辅助通气

44. 患者男55岁，拟在常温下行脑膜血管瘤摘除术，术前血压160/95mmHg，EKG、肝、肾功能正常，术中拟行控制性降压。如果用硝普钠施行降压，应该

A. 启动时按 $8\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 泵入

B. 先快后慢，尽快使血压降至预定水平

C. 将硝普钠稀释至0.1%静脉滴注

D. 启动时按 $0.5\sim 1.0\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 泵入

E. 血压降至预定水平时，按原速持续泵入

45. 女，50岁，农民，平时下地干活。诊断为嗜铬细胞瘤。上述处理效果不明显时，下述方法可用，除了

A. 迅速让患者清醒

B. 继续静注副肾或正肾

C. 静注大剂量地塞米松

D. 输注高渗氯化钠液

E. 给予毛花苷丙

46. 患者，女，22岁，既往体健，急进高原后第二天下午，不慎遭遇车祸，致右侧胫腓骨骨折。患者随即出现头痛，呼吸困难，烦躁，频繁咳嗽，咳出粉红色泡沫痰，且患者上午曾出现心悸、头晕、发绀等表现。该患者骨折后并发症最有可能的是

A. 急性高原病

B. 混合型慢性高原病

C. 高原肺水肿

D. 高原脑水肿

E. 高原心脏病

47. 4岁患儿在全麻下行腹腔镜阑尾切除术，术后拔除气管导管后送入恢复室。给予监测观察5分钟后，突然出现呼吸急促，面色发绀，并咳出粉红色泡沫痰。引发此症状的最可能原因

A. 术中输液过量

B. 感染

- C. 误吸
- D. 脂肪栓塞
- E. 肺挫伤

48. 患者，男，饱胃，后脑外伤清醒，拟行急诊手术。患者呕吐后出现呼吸困难，最可能的原因是（ ）。

- A. 误吸
- B. 肺栓塞
- C. 肌松药的残余作用
- D. 支气管痉挛
- E. 全麻药的中枢性呼吸抑制

49. 患者，男，70岁。拟行左上肺切除术。为了预防术后低氧血症，下列选项中处理不恰当的是（ ）。

- A. 面罩给氧
- B. 及时清除呼吸道分泌物
- C. 纠正贫血
- D. 给予大剂量镇静镇痛药
- E. 继续进行呼吸功能监测

50. 患者，女，66岁。无烟酒嗜好，拟行胆囊摘除+胆总管探查术。患者高血压病10年，有时感胸闷，考虑是（ ）。

- A. 肺心病
- B. 肝炎
- C. 脓胸
- D. 冠心病
- E. 肋间神经痛

51. 患者，男，63岁。拟行胆囊切除术。术前检查发现有冠心病、陈旧性心肌梗死，自诉偶有心跳不规则。血压170/110mmHg，脉搏104次/分。血液生化检查提示：空腹血糖7.8mmol/L(140mg/dl)，血清胆固醇460mg，血清钾3.8mmol/L。患者双亲均在50岁左右死于心脏病。此次手术最好距上次心肌梗死（ ）。

- A. 2个月
- B. 3个月
- C. 4个月
- D. 5个月
- E. 6个月

52. 患者，女，60岁。既往有慢性支气管病史。两年前诊断为甲亢，一直服用甲疏咪唑治疗。现欲行甲状腺大部切除手术。该患者理想的术前用药是（ ）。

- A. 东莨菪碱和哌替啶
- B. 阿托品
- C. 芬太尼
- D. 吗啡
- E. 氟哌利多

53. 患者，男，72岁。既往有慢性支气管病史10年，肺功能检查为中度阻塞性通气功能障碍，全身情况较差。拟行胃大部切除术。适合该患者的麻醉方法是（ ）。

- A. 硬膜外麻醉
- B. 腰麻

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

- C. 局麻
 - D. 全身麻醉
 - E. 腰麻联合硬膜外麻醉
54. 患者，男，66岁。胸闷胸痛间断发作4年加重3个月，诊断为CAD、三支病变，拟行CPB下CABG术。麻醉前访视应注重了解（ ）。
- A. 近期用药史、左心室射血分数
 - B. 冠状动脉造影结果
 - C. 心绞痛发作诱因
 - D. 血压、心率、心律、心电图
 - E. 以上均是
55. 患者，男，66岁。胸闷胸痛间断发作4年加重3个月，诊断为CAD、三支病变，拟行CPB下CABG术。搭桥开放后，宜选药物是（ ）。
- A. 多巴胺
 - B. 硝酸甘油
 - C. 普萘洛尔
 - D. 硝苯地平
 - E. 硝普钠
56. 患者男，13岁。车祸致双下肢广泛撕脱伤，急送手术室。神志恍惚，血压45/30mmHg，脉搏160次/分。无哮喘史，空腹。最佳麻醉方法是（ ）。
- A. 连续硬膜外阻滞
 - B. 蛛网膜下隙（又称蛛网膜下腔）阻滞
 - C. 氯胺酮肌注全麻
 - D. 气管插管全麻
 - E. 连续硬膜外阻滞加全麻
57. 患者男55岁，拟在常温下行脑膜血管瘤摘除术，术前血压160/95mmHg，EKG、肝、肾功能正常，术中拟行控制性降压。若降压前发现该患者有颅内高压，则
- A. 放弃控制性降压
 - B. 改用硝酸甘油作降压药
 - C. 蛛网膜下腔穿刺放出部分脑脊液
 - D. 降低潮气量，减少胸内压利于脑静脉回流
 - E. 输注甘露醇和(或)作暂时过度通气
58. 4岁患儿在全麻下行腹腔镜阑尾切除术，术后拔除气管导管后送入恢复室。给予监测观察5分钟后，突然出现呼吸急促，面色发绀，并咳出粉红色泡沫痰。此时处理不正确的是
- A. 吸氧
 - B. 利尿
 - C. 胸腔闭式引流
 - D. 除泡剂雾化吸入
 - E. 必要时气管插管
59. 患者，男，68岁。高血压病史8年，长期服用美托洛尔（倍他乐克），利血平等药物，血压控制良好，现拟行胃癌根治术。处理术中高血压不正确的选项是（ ）。
- A. 先寻找原因，再作相应处理
 - B. 伴有心率慢者可用格尔(Labetalol)
 - C. 硝普钠降压效果最佳，应为首选
 - D. 降压同时注意控制输液量

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/187020145024010023>