

2024 年四川省石棉县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题真题题库附答案 下载

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 调节酸平衡药中，临床上最常用的碱性药是()

- A: 氯化钠
- B: 碳酸氢钠
- C: 氯化铵
- D: 乳酸钠

答案：B

2. 对抗新产生的血栓应首选

- A: 右旋糖酐
- B: 肝素
- C: 尿激酶
- D: 华法林

答案：C

3. 下列氨基糖苷类抗菌药物中，引起耳蜗神经损伤发生率最高的是

- A: 妥布霉素
- B: 链霉素
- C: 卡那霉素
- D: 新霉素

答案：D

4. 下列药物中,属于抗乙型肝炎病毒的药物是()

- A: 齐多夫定
- B: 喷昔洛韦
- C: 阿德福韦酯
- D: 奥司他韦

答案: C

5. (2018 年真题) 适应症仅应用于治疗失眠的药物是 ()

- A: 地西泮
- B: 氟西汀
- C: 苯巴比妥
- D: 佐匹克隆

答案: D

6. 大剂量雌激素用于()

- A: 绝经期综合征
- B: 再生障碍性贫血
- C: 回奶
- D: 痛经

答案: C

7. (2018 年真题) 属于膨胀性泻药的是 ()

- A: 聚乙二醇 4000
- B: 蓖麻油
- C: 硫酸镁
- D: 乳果糖

答案: A

8. 患者，男，19 岁，既往有癫痫病史 2 年，长期服用苯妥英钠控制良好。1 周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4 次/日。

- A: 抑制 H
- B: 阻断组胺 H
- C: 保护胃黏膜
- D: 中和胃酸

答案：B

9. 在痛风急性期，应禁用的抗痛风药

- A: 秋水仙碱
- B: 舒林酸
- C: 布洛芬
- D: 别嘌醇

答案：D

10. 下述药物中不可用于治疗疥疮的是()

- A: 林旦霜
- B: 硫黄软膏
- C: 过氧苯甲酰
- D: 苯甲酸苄酯

答案：C

11. (2016 年真题) 那于 GLP-1 受体激动剂的是

- A: 艾塞那肽
- B: 那格列奈

C: 阿卡波糖

D: 二甲双胍

答案: A

12. (2016 年真题) 对血小板聚集及凝血机制无影响的药品是

A: 阿司匹林

B: 对乙酰氨基酚

C: 罗非昔布

D: 吲哚美辛

答案: B

13. 抑制蛋白质合成与功能的药物是()

A: 顺铂

B: 多柔比星

C: 氟尿嘧啶

D: 高三尖杉酯碱

答案: D

14. 可用于肝硬化腹水以及加速某些毒物排泄的药物是

A: 托拉塞米

B: 乙酰唑胺

C: 氨苯蝶啶

D: 氢氯噻嗪

答案: A

15. 可竞争肝药酶 CYP2C9、CYP2C19 而影响氯吡格雷代谢为有活性的产物，降低氯吡格雷的疗效，因此正在使用氯吡格雷的患者应避免合用

A: 雷贝拉唑

- B: 法莫替丁
- C: 泮托拉唑
- D: 奥美拉唑

答案：D

16. 静脉滴注过快易发生红人综合征的是()

- A: 万古霉素
- B: 克林霉素
- C: 庆大霉素
- D: 阿奇霉素

答案：A

17. 抑制甲状腺内过氧化酶，使碘不能活化的是

- A: 甲状腺素
- B: 糖皮质激素
- C: 放射性碘
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：D

18. 可抑制血小板聚集和释放的药物是

- A: 尿激酶
- B: 肝素
- C: 华法林
- D: 噻氯匹啶

答案：D

19. 对抗杆菌属等厌氧菌具有抗菌活性，属于头霉素类的抗菌药物是()

。

- A: 氨曲南
- B: 亚胺培南
- C: 头孢美唑
- D: 头孢吡肟

答案：C

20. 联合应用可使部分患者血压升高的药物是

- A: 利奈唑胺+苯丙醇胺
- B: 磷霉素氨丁三醇
- C: 磷霉素钠+万古霉素
- D: 利奈唑胺+哌替啶

答案：A

21. （2016 年真题）属于血管紧张素 II 受体阻断剂的药品是

- A: 坦洛新（坦索罗辛）
- B: 哌唑嗪
- C: 替米沙坦
- D: 依那普利

答案：C

22. 抑制细菌叶酸合成的抗菌药物是

- A: 利福喷丁
- B: 头孢米诺
- C: 头孢吡肟
- D: 磺胺甲噁唑甲氧苄啶

答案：D

23. 作用于二氢叶酸合成酶，干扰叶酸合成的第一步的是

- A: 甲氧苄啶 (TMP)
- B: 磺胺甲噁唑 (SMZ)
- C: 替硝唑
- D: 莫西沙星

答案: B

24. 与克拉霉素和兰索拉唑联合治疗幽门螺杆菌感染的药物是

- A: 替考拉宁
- B: 大观霉素
- C: 羟氨苄青霉素
- D: 庆大霉素

答案: C

25. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

- A: 在使用万古霉素的第 4 个维持剂量给药前测定谷浓度
- B: 该万古霉素浓度偏低
- C: 万古霉素是浓度依赖性抗菌药物
- D: 该患者用法不能维持全天稳定的血药浓度

答案: C

26. 可以防治夜盲症的是

- A: 维生素 A
- B: 叶酸
- C: 维生素 K
- D: 维生素

答案：A

27. 易通过血脑屏障的抗真菌药物是

- A: 咪康唑
- B: 酮康唑
- C: 克霉唑
- D: 氟康唑

答案：D

28. 维生素 K 为

- A: 抗出血药
- B: 抗凝血药
- C: 抗贫血药
- D: 抗血小板药

答案：A

29. 5-羟色胺再摄取抑制剂与单胺氧化酶制剂合用，出现不安、肌阵挛、多汗、震颤、腹泻、高热、抽搐和精神错乱等不良反应，严重者可导致死亡的现象称为

- A: 戒断反应
- B: “宿醉”现象
- C: 锥体外系反应
- D: 5-HT 综合征

答案：D

30. 可致前庭、耳蜗神经功能障碍，妊娠期妇女和新生儿禁用的抗菌药物是

- A: 酰胺醇类(氯霉素)

- B: 林可霉素类
- C: 氨基糖苷类
- D: 四环素类

答案：C

31. 治疗期间避免献血的药物

- A: 维 A 酸
- B: 异维 A 酸
- C: 阿达帕林
- D: 壬二酸

答案：B

32. 碳酸钙用于肾衰竭患者降低血磷时,适宜的服药时间是()

- A: 餐前即刻
- B: 餐中
- C: 清晨或睡前
- D: 餐后 2h

答案：B

33. 现有调脂药中降低 LDL 作用最强的一类药是

- A: 胆固醇吸收抑制剂
- B: 他汀类药物
- C: 胆汁酸结合树脂
- D: 抗氧化剂

答案：B

34. 口服后很少被吸收的口服降糖药是

- A: 达格列净

- B: 罗格列酮
- C: 阿卡波糖
- D: 二甲双胍

答案: C

35. 肥胖型二型糖尿病患者首选的降糖药

- A: 二甲双胍
- B: 静脉用胰岛素
- C: 胰岛素皮下注射
- D: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

答案: A

36. 抑制骨髓造血功能的是

- A: 左氧氟沙星
- B: 氯霉素
- C: 四环素
- D: 青霉素

答案: B

37. 患者，女，45 岁。诊断为高血压合并甲状腺功能亢进，心率过快，宜选用的抗高血压药是

- A: 普萘洛尔
- B: 吧达帕胺
- C: 氨氯地平
- D: 赖诺普利

答案: A

38. 属于二肽基肽酶-4 (DPP-4) 抑制剂的是

- A: 格列美脲
- B: 沙格列汀
- C: 罗格列酮
- D: 瑞格列奈

答案：B

39. 下列何药对心房颤动无治疗作用

- A: 普萘洛尔
- B: 奎尼丁
- C: 利多卡因
- D: 胺碘酮

答案：C

40. 抑制真菌中由细胞色素 P450 介导的 14 α -甾醇去甲基化，从而抑制真菌细胞膜主要固醇类——麦角固醇的生物合成，损伤真菌细胞膜并改变其通透性，以致细胞内重要物质摄取受影响或流失而使真菌死亡的是

- A: 伊曲康唑
- B: 万古霉素
- C: 氟胞嘧啶
- D: 两性霉素

答案：A

41. 可直接抑制和杀灭皮肤表面和毛囊内的细菌，消除病原体的药物()

- A: 维 A 酸
- B: 阿达帕林
- C: 异维 A 酸
- D: 壬二酸

答案：D

42. (2017 年真题) 抑制细菌核酸合成 ()

- A: 利福喷丁
- B: 头孢米诺
- C: 头孢吡肟
- D: 磺胺甲噁唑甲氧苄啶

答案：A

43. 下列对皮肤真菌感染治疗药叙述错误的是 ()

- A: 奈替芬是丙烯胺类抗真菌药
- B: 环吡酮胺为吡啶酮类抗真菌药
- C: 阿莫罗芬为唑类的局部抗真菌药
- D: 酮康唑为咪唑类抗真菌药

答案：C

44. (2019 年真题) 以肝细胞膜损害为主的急慢性肝炎患者，宜使用的药物是 ()

- A: 甘草酸二铵
- B: 多烯磷脂酰胆碱
- C: 还原型谷胱甘肽
- D: 葡醛内酯

答案：B

45. (2018 年真题) 具有抗炎作用，可用于各型肝炎治疗的药物是 ()

- A: 多烯磷脂酰胆碱
- B: 异甘草酸镁
- C: 门冬氨酸钾镁

D: 双环醇

答案: B

46. 多柔比星与肝素、头孢菌素等同用()

A: 导致坏死性结肠炎

B: 增加心脏毒性

C: 增加肝毒性

D: 易产生沉淀

答案: D

47. (2017 年真题) 可能引起持续性干咳的抗高血压药是 ()

A: 硝普钠

B: 卡托普利

C: 阿利克仑(阿利吉仑)

D: 氨氯地平

答案: B

48. 用于表面麻醉、阻滞麻醉的局部麻醉药是

A: 普鲁卡因

B: 西地碘

C: 布地奈德

D: 利多卡因

答案: D

49. 属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是()。

A: 氟他胺

B: 他莫昔芬

C: 托瑞米芬

D: 乙烯雌酚

答案：A

50. 下述哪种药物与氨基糖苷类抗生素合用可能出现呼吸抑制或呼吸停止

A: 硫糖铝

B: 西咪替丁

C: 奥美拉唑

D: 多潘立酮

答案：B

51. 属于头孢一代的是

A: 拉氧头孢

B: 头孢呋辛

C: 头孢曲松

D: 头孢唑林

答案：D

52. 阿司匹林的主要适应证不包括()

A: 急性心肌梗死

B: 胃溃疡

C: 预防血栓形成

D: 不稳定型心绞痛

答案：B

53. (2019 年真题) 为预防大剂量环磷酰胺引起的膀胱毒性，在充分水化、利尿的同时，还应给予的药物是 ()

A: 二甲双胍

B: 螺内酯

C: 美司钠

D: 氯化钾

答案：C

54. 脓毒血症引起的严重肾衰竭使用

A: 复方氨基酸注射液（3AA）

B: 复方氨基酸（18AA- I）

C: 苯丙氨酸

D: 复方氨基酸注射液（9AA）

答案：D

55. 属于钠通道阻滞剂的抗心律失常药的是（）。

A: 索他洛尔

B: 硝酸甘油

C: 利多卡因

D: 美托洛尔

答案：C

56. 抢救糖尿病酮症酸中毒和高血糖高渗性昏迷患者宜选用

A: 二甲双胍

B: 普通胰岛素

C: 格列喹酮

D: 低精蛋白锌胰岛素

答案：B

57. 伊曲康唑与肝药酶的关系是

A: CYP3A4 酶的抑制剂

- B: 伊曲康唑主要经 CYP1A2 酶代谢
- C: 伊曲康唑主要经 CYP2C9 酶代谢
- D: CYP3A4 酶的诱导剂

答案：A

58. 属于合成的麻醉性镇痛药的是

- A: 布洛芬
- B: 吗啡
- C: 美沙酮
- D: 可待因

答案：C

59. (2020 年真题) 使用奥沙利铂后最需要关注的典型不良反应是

- A: 肾毒性
- B: 神经毒性
- C: 肝毒性
- D: 消化道反应

答案：B

60. 治疗勃起功能障碍药的是

- A: 氯地孕酮
- B: 他达拉非
- C: 达那唑
- D: 左炔诺孕酮

答案：B

61. 下列属于二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂的是

- A: 双嘧达莫

B: 阿司匹林

C: 氯吡格雷

D: 阿替普酶

答案：C

62. 异烟肼联用对乙酰氨基酚使

A: 肝毒性增加

B: 疗效减弱

C: 月经不规则

D: 吸收减少

答案：A

63. 可导致“类流感样”反应的药物是

A: 氯屈膦酸二钠

B: 帕米膦酸二钠

C: 唑来膦酸钠

D: 依替膦酸二钠

答案：C

64. 长期大量服用维生素 E 会出现

A: 头痛、眼花、烦躁、心律失常、妇女经血不止

B: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重下降、肝脏肿大、肾脏损害、骨硬化

C: 视物模糊、乳腺肿大、类流感样综合征、胃痉挛

D: 颅内压增高、夜尿增多、毛发干枯或脱落、皮肤干燥或瘙痒、体重减轻

答案：C

65. 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是

- A: 罗格列酮
- B: 艾塞那肽
- C: 瑞格列奈
- D: 阿卡波糖

答案: D

66. 促进子宫颈成熟的是()

- A: 米非司酮
- B: 普拉睾酮
- C: 戈那瑞林
- D: 达那唑

答案: B

67. 夫西地酸最常见的不良反应是

- A: 血小板减少
- B: 黄疸
- C: 腹部不适
- D: 静脉炎

答案: D

68. (2015 年真题) 属于润滑性泻药的是 ()。

- A: 乳果糖
- B: 酚酞
- C: 聚乙二醇 4000
- D: 甘油 (开塞露)

答案: D

69. 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的调节血脂药是()

- A: 辛伐他汀
- B: 依折麦布
- C: 烟酸
- D: 非诺贝特

答案: A

70. 治疗高血压危象的药物是()

- A: 可乐定
- B: 依那普利
- C: 硝普钠
- D: 普萘洛尔

答案: C

71. 过量使用,会导致大量的中间代谢产物 N-乙酰对苯醌亚胺堆积,引起严重肝毒性的药物是()

- A: 塞来昔布
- B: 双氯芬酸
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 阿司匹林

答案: C

72. 可单独用于原发性高血压的药物是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 螺内酯
- C: 呋塞米
- D: 甘露醇

答案: A

73. 林可霉素类抗菌药物无抗菌作用的是

- A: 革兰阳性球菌
- B: 厌氧菌
- C: 肺炎支原体
- D: 肺炎链球菌

答案：C

74. 患者男性，25 岁。咽炎，注射青霉素后 1 分钟，呼吸急促，面部发绀，心率 130 次/分，血压 60/40mmHg。

- A: 曲安西龙+异丙肾上腺素
- B: 地塞米松+多巴胺
- C: 地塞米松+肾上腺素
- D: 地塞米松+去甲肾上腺素

答案：C

75. 头孢曲松

- A: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- B: 肾毒性较大
- C: 用于非典型病原体感染
- D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

答案：A

76. 可引起眼睛疼痛不适的是

- A: 茶碱
- B: 氨溴索
- C: 异丙托溴铵
- D: 乙酰半胱氨酸

答案：C

77. 用于青春期前隐睾症的诊断和治疗的是

- A: 噻嘧啶
- B: 绒促性素
- C: 硝苯地平
- D: 米非司酮

答案：B

78. 属于第四代头孢菌素的药物是()

- A: 头孢哌酮
- B: 头孢噻吩
- C: 头孢噻肟
- D: 头孢吡肟

答案：D

79. 对血吸虫具有杀灭活性的药物是()。

- A: 阿苯达唑
- B: 吡喹酮
- C: 甲硝唑
- D: 噻嘧啶

答案：B

80. 阿昔洛韦的作用靶点是

- A: HIV-1 反转录酶
- B: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶
- C: 神经氨酸酶
- D: 脱氧核糖核酸聚合酶

答案：D

81. (2017 年真题) 关于糖皮质激素外用制剂使用注意事项的说法, 错误的是 ()

- A: 为控制的细菌或真菌感染不宜使用
- B: 可用于过敏性皮炎的治疗
- C: 面部、阴部和皱褶部位的湿疹, 需长期使用强效制剂
- D: 若继发细菌或真菌感染, 可与抗菌药或抗真菌药联合使用

答案：C

82. 患者, 女, 56 岁, 血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常, 初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食, 增强运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标, 医师处方辛伐他汀片 20mg / d 治疗。

- A: CK
- B: AST
- C: BUN
- D: Cr

答案：A

83. 通过抑制 5-HT 和去甲肾上腺素 (NA) 再摄取, 增加突触间隙 5-HT 和 NA 浓度从而增强中枢 5-HT 和 NA 能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

- A: 阿米替林
- B: 度洛西汀
- C: 舍曲林
- D: 吗氯贝胺

答案：B

84. 促进复极 4 相 K

- A: 奎尼丁
- B: 利多卡因
- C: 普萘洛尔
- D: 维拉帕米

答案：B

85. 癫痫小发作选用

- A: 苯妥英钠
- B: 苯巴比妥
- C: 乙琥胺
- D: 丙戊酸钠

答案：C

86. 严重肝病患者应减量慎用、肾功能减退患者应避免使用的是

- A: 红霉素
- B: 氟胞嘧啶
- C: 异烟肼
- D: 青霉素

答案：B

87. 下列关于 5α -还原酶抑制剂的描述，错误的是()

- A: 对膀胱颈和平滑肌没有作用
- B: 作用是不可逆的
- C: 与 $\alpha 1$ 受体阻断药相比，更易引起性功能障碍
- D: 可引起前列腺上皮细胞萎缩

答案：B

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/187042111150010024>