

2024 甘肃省宕昌县《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题往年题考

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 抑制 Na

A: 氨苯蝶啶

B: 乙酰唑胺

C: 氢氯噻嗪

D: 呋塞米

答案: C

2. 30 岁，农民，头昏乏力，粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L。诊断：钩虫感染，缺铁性贫血。

A: 对胃酸缺乏者，宜与稀盐酸并用，有利于铁剂的解离

B: 选择适宜的病期、疗程和监测

C: 尽量选择三价铁

D: 注意预防铁负荷过重

答案: C

3. 西咪替丁与氨基糖苷类药物合用

A: 可升高合用药物的血浆药物浓度

B: 使后者药效降低

C: 出现呼吸抑制或停止

D: 减慢药物代谢速度

答案: C

4. 阻碍 DNA 合成的药物是

- A: 氟尿嘧啶
- B: 高三尖杉酯碱
- C: 顺铂
- D: 紫杉醇

答案：A

5. (2017 年真题) 可引起双硫仑样反应 ()

- A: 甲硝唑
- B: 哌拉西林
- C: 米诺环素
- D: 左氧氟沙星

答案：A

6. (2021 年真题) 属于二肽基肽酶-4 (DPP-4) 抑制剂的药物是 ()

- A: 利拉鲁肽
- B: 那格列奈
- C: 西格列汀
- D: 格列美脲

答案：C

7. 可用于治疗假膜性肠炎的糖肽类药物是

- A: 替硝唑
- B: 万古霉素
- C: 红霉素
- D: 克林霉素

答案：B

8. (2021 年真题) 兼有抑菌作用的鼻用减充血剂是 ()

- A: 呋麻滴鼻液
- B: 赛洛唑啉滴鼻液
- C: 羟甲唑啉鼻喷剂
- D: 麻黄碱滴鼻液

答案: A

9. 通过增强 AT-III 的活性发挥抗凝作用的是

- A: 维生素 K1
- B: 香豆素类
- C: 维生素 B12
- D: 肝素

答案: D

10. 葡萄球菌感染的角膜炎可选用

- A: 金霉素眼膏
- B: 多黏菌素 B 滴眼液
- C: 1% 泼尼松滴眼液
- D: 夫西地酸滴眼剂

答案: D

11. 可导致“类流感样”反应的药物是

- A: 糖皮质激素
- B: 阿仑膦酸钠
- C: 骨化三醇
- D: 降钙素

答案: B

12. 肌肉注射 ACTH 作用达到高峰的时间是

- A: 8 小时
- B: 10~25 分钟
- C: 4 小时
- D: 7~12 分钟

答案: C

13. 不属于普罗帕酮作用特点的是

- A: 在胃肠道中吸收良好，血浆蛋白结合率高
- B: 属于 I c 类抗心律失常药
- C: 适用于室上性和室性心律失常
- D: 无肝首过效应

答案: D

14. (2017 年真题) 长期大剂量服用维生素 D 可能引起的不良反应是 ()

- A: 血栓性静脉炎
- B: 颅内压升高
- C: 高钙血症
- D: 高胆红素血症

答案: C

15. 可诱发哮喘且变异型心绞痛不宜选用的药物是

- A: 洛伐他汀
- B: 硝苯地平
- C: 普萘洛尔
- D: 硝酸甘油

答案: C

16. 可能引起中性粒细胞减少的药物是

- A: 左甲状腺素
- B: 碘及碘化物
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 鲨肝醇

答案：C

17. 患者，男，56 岁，有高血压病史 4 年。体检：血压 156 / 96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利控制血压。

- A: 血钙
- B: 血钠
- C: 血钾
- D: 血氯

答案：C

18. 精神病患者及神经中毒症状者慎用

- A: 氯霉素
- B: 更昔洛韦
- C: 四环素可的松
- D: 利巴韦林

答案：B

19. （2020 年真题）通过抑制 A 型单胺氧化酶，减少去甲肾上腺素、5-HT 及多巴胺的降解，增强去甲肾上腺素、5-HT 和多巴胺能神经功能，发挥抗抑郁作用的药物是

- A: 阿米替林
- B: 吗氯贝胺

C: 度洛西汀

D: 舍曲林

答案: B

20. 出现流感样综合征，寒战、发热的药物是()

A: 链霉素

B: 利福平

C: 对氨基水杨酸

D: 异烟肼

答案: B

21. 下列关于氯化钾注射液的描述，正确的是()

A: 可以肌肉注射，也可以直接静脉注射

B: 禁止肌肉注射，可以直接静脉注射

C: 严禁肌肉注射和直接静脉注射，仅可静脉滴注

D: 可以肌肉注射，禁止直接静脉注射

答案: C

22. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A: 该万古霉素浓度偏低

B: 该患者用法不能维持全天稳定的血药浓度

C: 在使用万古霉素的第 4 个维持剂量给药前测定谷浓度

D: 万古霉素是浓度依赖性抗菌药物

答案: D

23. 临床常用的巨幼红细胞性贫血治疗药物是

- A: 维生素 B12
- B: 维生素 K
- C: 肝素
- D: 香豆素类

答案：A

24. 以下不属于强心苷的禁忌证的是()

- A: 梗阻性肥厚型心脏病
- B: 慢性收缩性心力衰竭
- C: 预激综合征伴心房颤动或扑动
- D: 室性心动过速、心室颤动

答案：B

25. (2016 年真题) 减少钠离子内流而使神经细胞稳定，属于乙内酰脲类的是抗癫痫药

- A: 苯巴比妥
- B: 苯妥英钠
- C: 卡马西平
- D: 丙戊酸钠

答案：B

26. 无雌激素、雄激素、肾上腺皮质激素样作用代谢物没有雌激素活性，可用于黄体功能不足的先兆流产治疗的药物是

- A: 地屈孕酮
- B: 甲羟孕酮
- C: 屈螺酮
- D: 环丙孕酮

答案：A

27. 属于抗甲状腺药的是

- A: 醋酸去氨加压素
- B: 生长抑素
- C: 甲巯咪唑
- D: 左甲状腺素

答案：C

28. 与阿托品比较，东莨菪碱的特点是

- A: 中枢镇静作用较强
- B: 对眼的作用强
- C: 对有机磷中毒解救作用强
- D: 对胃肠道平滑肌作用强

答案：A

29. 下列关于眼部抗菌药物的描述，错误的是

- A: 夫西地酸不可用于治疗葡萄球菌感染
- B: 氟喹诺酮类及氨基糖苷类具有广谱抗菌活性
- C: 多黏菌素 B 对铜绿假单胞菌引起的感染有效
- D: 妥布霉素对铜绿假单胞菌引起的感染有效

答案：A

30. 预防急性肾衰竭可选用

- A: 螺内酯
- B: 乙酰唑胺
- C: 氢氯噻嗪
- D: 呋塞米

答案：D

31. 对合并有高氨血症的便秘患者,适宜使用的泻药是

- A: 乳果糖
- B: 聚乙二醇 4000
- C: 硫酸镁
- D: 甘油

答案：A

32. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊，塞来昔布胶囊，碳酸氢钠治疗。

- A: 促进血栓形成
- B: 胃肠道反应
- C: 尿道刺激
- D: 肾结石

答案：C

33. 属于组胺 H₂ 受体阻断剂是

- A: 氯苯那敏
- B: 多潘立酮
- C: 奥美拉唑
- D: 法莫替丁

答案：D

34. 患者，男，80 岁。因慢性心功能不全、同时伴有双下肢水肿住院。能充分控制心衰患者液体潴留的药物是

- A: 肾素抑制剂

B: 血管紧张素转换酶抑制剂

C: 利尿剂

D: β 受体阻断剂

答案：C

35. 下述保肝药中属于解毒类的是()

A: 甘草酸二铵

B: 复方甘草酸苷

C: 多烯磷脂酰胆碱

D: 硫普罗宁

答案：D

36. 属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是()。

A: 他莫昔芬

B: 托瑞米芬

C: 乙烯雌酚

D: 氟他胺

答案：D

37. 对伴有同型半胱氨酸升高的高血压患者在降压的同时应注意补充

A: 维生素 C+维生素

B: 叶酸+维生素 B12

C: 维生素 B2+维生素 C

D: 维生素 K+维生素 B

答案：B

38. 奥司他韦对下列哪种病毒有效

A: 甲型、乙型流感病毒

B: 疱疹病毒

C: 甲型肝炎病毒

D: 巨细胞病毒

答案：A

39. 低剂量用药时对中枢和外周多巴胺 D₂ 受体有拮抗作用，而高剂量用药时有较弱的 5-HT₂ 受体阻断作用，可用于化疗所致恶心呕吐的是

A: 氯丙嗪

B: 甲氧氯普胺

C: 帕洛诺司琼

D: 劳拉西泮

答案：B

40. 可导致新生儿的戒断症状和呼吸抑制的是

A: 布地奈德

B: 氨茶碱

C: 可待因

D: 沙丁胺醇

答案：C

41. 属于 GLP-1 受体激动剂的是 ()。

A: 那格列奈

B: 二甲双胍

C: 艾塞那肽

D: 阿卡波糖

答案：C

42. (2019 年真题) 关于氢氯噻嗪临床应用的说法，错误的是 ()

- A: 对血糖和尿酸无影响，可长期服用
- B: 老年患者服药后易发生低血压及肾功能损害
- C: 服药期间应关注有无肌痉挛、耳鸣、听力障碍等症状
- D: 与磺胺类药物存在交叉过敏反应

答案：A

43. 使用后可产生抗体，1 年内不宜再次使用的药物是

- A: 瑞替普酶
- B: 链激酶
- C: 尿激酶
- D: 阿替普酶

答案：B

44. 酰胺醇类药的主要作用靶点是

- A: 细胞壁丙氨酰丙氨酸
- B: 核糖体的 50S 亚基
- C: 核糖体的 30S 亚基
- D: 细胞内膜 PBP

答案：B

45. 袢利尿药中，最易引起耳毒性，且可发生永久性耳聋的药物是()

- A: 托拉塞米
- B: 呋塞米
- C: 依他尼酸
- D: 布美他尼

答案：C

46. 属于贝丁酸类调节血脂药是()。

- A: 阿托伐他汀
- B: 非诺贝特
- C: 阿昔莫司
- D: 依折麦布

答案：B

47. 急性缺血性脑卒中发作，应用溶栓药治疗时间窗是在发病后

- A: 8 小时内
- B: 3 小时内
- C: 24 小时内
- D: 12 小时内

答案：B

48. 新斯的明治疗重症肌无力的机制是

- A: 抑制胆碱酯酶和兴奋骨骼肌 N 胆碱受体
- B: 对大脑皮质有兴奋作用
- C: 增强运动神经乙酰胆碱合成
- D: 兴奋骨骼肌中 M 胆碱受体

答案：A

49. 属于雌激素受体拮抗剂的抗肿瘤药是

- A: 炔雌醇
- B: 他莫昔芬
- C: 阿那曲唑
- D: 丙酸睾酮

答案：B

50. 吸入用布地奈德混悬液抗炎作用是强的松龙的

- A: 40 倍
- B: 25 倍
- C: 100 倍
- D: 15 倍

答案：D

51. 患者，男，66 岁。BMI24kg/m²，高血压病史 15 年，冠心病史 3 年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服 1 片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体：血压 163/83mmHg，心率 80 次 1 分。临床诊断为：（1）心绞痛急性发作；（2）心功能不全、心功能 III 级；（3）高血压病 3 级；（4）高脂血症。

- A: 硝酸甘油片被吞服，而不是舌下含服
- B: 贝那普利、阿托伐他汀等拮抗硝酸甘油的疗效
- C: 硝酸甘油片已经过期
- D: 硝酸甘油片单次剂量不足，次数不足

答案：B

52. 5 α -还原酶抑制剂的作用特点不包括

- A: 降低血清前列腺特异抗原（PSA）水平
- B: 减小增大的前列腺体积
- C: 可以松弛前列腺平滑肌
- D: 无心血管不良反应

答案：C

53. 患者，男，35 岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵（+++），血红蛋白 60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

A: 进食可促进铁剂的吸收

B: 铁剂不应与浓茶同服，浓茶含有的鞣酸可与铁形成沉淀，使铁剂的吸收减少

C: 治疗期间应定期检查血象和血清铁水平

D: 宜在餐后或餐时服用

答案：A

54. 中毒症状主要表现为胃肠道反应、中枢神经系统反应和心脏毒性三个方面的是

A: 氨氯地平

B: 卡托普利

C: 哌唑嗪

D: 地高辛

答案：D

55. 扩张脑血管作用较强,能增加脑血流量的钙通道阻滞剂是 ()

A: 氨氯地平

B: 非洛地平

C: 拉西地平

D: 尼莫地平

答案：D

56. 长期大量服用维生素 B6 会出现

A: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

B: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活

C: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

D: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

答案：B

57. 关于胺碘酮描述，正确的是

- A: 对室上性和室性心动过速都有效
- B: 只对室上性心动过速有效
- C: 只对室性心动过速有效
- D: 特异性针对房颤有效

答案：A

58. 下列不属于肽类抗生素的是

- A: 万古霉素
- B: 多黏菌素 B
- C: 去甲万古霉素
- D: 利奈唑胺

答案：D

59. 有减轻体重作用的口服降糖药是

- A: 吡格列酮
- B: 格列苯脲
- C: 那格列奈
- D: 达格列净

答案：D

60. (2015 年真题) 属于超强效的外用糖皮质激素是 ()。

- A: 卤米松
- B: 氢化可的松
- C: 曲安奈德
- D: 地塞米松

答案：A

61. (2021 年真题) 关于抗心力衰竭药物沙库巴曲缬沙坦的说法，错误的是 ()

A: 适用于射血分数降低的慢性心力衰竭 (NYHA II-IV 级, LVEF $\leq$ 40%) 成年患者

B: 与血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI) 合用具有协同作用

C: 通过抑制脑啡肽酶, 同时阻断血管紧张素 II 的 1 型受体 (AT1) 起效

D: 血钾水平 >5

答案：B

62. 属于雌激素类退乳药的是 ()

A: 他莫昔芬

B: 己烯雌酚

C: 睾酮

D: 甲羟孕酮

答案：B

63. 儿童使用强效激素制剂, 连续不应超过

A: 3 天

B: 3~5 天

C: 2 周

D: 5~7 天

答案：C

64. 激动岛受体, 对慢性心力衰竭疗效较好 ()

A: 多巴酚丁胺

B: 氨力农

C: 地高辛

D: 硝普钠

答案: A

65. 服用磺胺多辛的方式不正确的是

A: 每次服药时饮水约 240ml

B: 餐中服用

C: 餐前 1 小时服用

D: 餐后 2 小时服用

答案: B

66. 可引起肌痛、骨关节病损、跟腱炎症和跟腱断裂

A: 环丙沙星

B: 灰黄霉素

C: 咪康唑

D: 克霉唑

答案: A

67. 适用于各种类型疟疾的症状控制，尤其是对抗氯喹恶性及凶险型疟疾有较好疗效的药物是

A: 蒿甲醚

B: 双氢青蒿素

C: 奎宁

D: 乙胺嘧啶

答案: B

68. 与奥美拉唑-替硝唑三联治疗胃溃疡的是

- A: 罗红霉素
- B: 红霉素
- C: 克拉霉素
- D: 克林霉素

答案：C

69. 以下药物肾结石患者禁用的是

- A: 苯溴马隆
- B: 秋水仙碱
- C: 非布司他
- D: 别嘌醇

答案：A

70. 治疗肾性尿崩症

- A: 氢氯噻嗪
- B: 乙酰唑胺
- C: 呋塞米
- D: 螺内酯

答案：A

71. 有抗胆碱作用和阻断 α 受体的抗心律失常药是

- A: 普萘洛尔
- B: 维拉帕米
- C: 奎尼丁
- D: 利多卡因

答案：C

72. 肺栓塞静脉溶栓更有效的是()

- A: 肝素
- B: 华法林
- C: 磺达肝癸钠
- D: 尿激酶

答案：D

73. 下列关于袢利尿药使用的描述中，不正确的是()

- A: 可多次应用最小有效剂量
- B: 单独使用可能会使利尿作用降低
- C: 可联用作用部位不同的利尿药
- D: 出现利尿药抵抗时，可使用低效利尿药增大剂量

答案：D

74. 用于治疗单纯性甲状腺肿的是

- A: 糖皮质激素
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 甲状腺素
- D: 放射性碘

答案：C

75. 对地高辛中毒出现心动过缓者可静脉注射

- A: 利尿剂
- B: 阿托品
- C: 氯化钾、葡萄糖注射液
- D: 苯妥英钠

答案：B

76. 可用于急慢性支气管炎的治疗，还能用于环磷酰胺出血性膀胱炎治疗的药物是

- A: 溴己新
- B: 氨溴索
- C: 乙酰半胱氨酸
- D: 羧甲司坦

答案：C

77. 通过与敏感需氧革兰阴性菌细胞膜上 PBP3 的高度亲合而发挥杀菌作用，仅对需氧革兰阴性菌包括铜绿假单胞菌具有良好抗菌活性，对革兰阳性菌和厌氧菌作用差的是

- A: 头孢他啶
- B: 氨曲南
- C: 头孢噻肟
- D: 头孢美唑

答案：B

78. （2020 年真题）痛风缓解期，抑制内源性尿酸生成的药物是

- A: 苯溴马隆
- B: 碳酸氢钠
- C: 秋水仙碱
- D: 非布司他

答案：D

79. 能治疗强心苷中毒引起的异位心律的是

- A: 苯妥英钠
- B: 利血平
- C: 阿托品

D: 哌替啶

答案: A

80. 属于抗炎类保肝药的是

A: 异甘草酸镁

B: 双环醇

C: 还原型谷胱甘肽

D: 多烯磷脂酰胆碱

答案: A

81. 脑瘤的首选药是

A: 替尼泊苷

B: 依托泊苷

C: 羟喜树碱

D: 博来霉素

答案: A

82. 润滑性泻药()

A: 甘油

B: 乳果糖

C: 地芬诺酯

D: 硫酸镁

答案: A

83. H₁ 受体拮抗剂的各项叙述，错误的是

A: 可用于治疗妊娠呕吐

B: 可用于治疗变态反应性失眠

C: 主要代表药有法莫替丁

D: 主要用于治疗变态反应性疾病

答案: C

84. 葡萄糖和胰岛素一起静脉滴注，可以用来治疗的是

A: 高钾血症

B: 低钠血症

C: 低钾血症

D: 高钠血症

答案: A

85. (2017 年真题) 可能引起中性粒细胞减少的药物 ()

A: 鲨肝醇

B: 丙硫氧嘧啶

C: 左甲状腺素

D: 碘，碘化物

答案: B

86. 羟基脲选择性作用于肿瘤细胞

A: G

B: M 期

C: S 期

D: G

答案: C

87. 与瑞格列奈无药物相互作用的是

A: 伊曲康唑

B: 克拉霉素

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 吉非贝齐

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/187065132046010024>