

2024 年辽宁省康平县《执业药师之西药学专业二》考试真题【A 卷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 关于奥司他韦作用特点的说法,错误的是()

- A: 1 岁以上儿童可以使用奥司他韦
- B: 应严格掌握奥司他韦适应证,不能用于流感的预防
- C: 奥司他韦可用于甲型和乙型流感的治疗
- D: 治疗流感时,首次使用奥同他韦应当在流感症状出现后的 48 小时以内

答案: B

2. 属于持续大剂量应用糖皮质激素引起的不良反应是

- A: Cushing 综合征体型
- B: 胰腺炎
- C: 青光眼
- D: 骨质疏松症

答案: A

3. 铂类化合物

- A: 丝裂霉素
- B: 环磷酰胺
- C: 喜树碱类
- D: 顺铂

答案: D

4. 假膜性肠炎或食物中毒应首选的微生物制剂是()

- A: 枯草杆菌
- B: 酪酸菌
- C: 双歧三联活菌
- D: 粪肠球菌

答案：B

5. 用于抗艾滋病病毒的药物是

- A: 利巴韦林
- B: 更昔洛韦
- C: 拉米夫定
- D: 阿昔洛韦

答案：C

6. 可引起性欲减退的是

- A: 哌唑嗪
- B: 十一酸睾酮
- C: 非那雄胺
- D: 普适泰

答案：C

7. 能明显抑制骨髓造血功能的药物是

- A: 红霉素
- B: 氯霉素
- C: 庆大霉素
- D: 青霉素 G

答案：B

8. (2018 年真题) 酪氨酸激酶抑制剂吉非替尼的特征性不良反应是 ()

- A: 心肌损伤
- B: 痤疮样皮疹
- C: 血压升高
- D: 骨髓抑制

答案: B

9. (2015 年真题) 属于胰岛素增敏剂的是 ()。

- A: 西格列汀
- B: 罗格列酮
- C: 阿卡波糖
- D: 二甲双胍

答案: B

10. 下列情况不应首选红霉素的是 ()

- A: 肠道痢疾杆菌感染
- B: 支原体肺炎
- C: 白喉带菌者
- D: 军团菌肺炎

答案: A

11. 前列腺素类似物的不良反应不包括

- A: 眼睑水肿和红斑
- B: 角膜病变
- C: 虹膜颜色加深
- D: 眼部刺激症状

答案: B

12. 对铜绿假单胞菌作用较强的头孢菌素是()

- A: 头孢拉定
- B: 头孢哌酮
- C: 头孢唑林
- D: 头孢噻吩

答案：B

13. (2015 年真题) 治疗青光眼宜选用 ()。

- A: 复方托吡卡胺滴眼液
- B: 碘苷滴眼液
- C: 毛果芸香碱滴眼液
- D: 左氧氟沙星滴眼液

答案：C

14. 成人与头孢类并用舒巴坦最大剂量为每日

- A: 3g
- B: 2g
- C: 4g
- D: 1g

答案：C

15. 硫脲类药物用于

- A: 精神病
- B: 甲亢
- C: 糖尿病
- D: 高血压

答案：B

16. 具有抗炎作用的他汀类调血脂药是

- A: 藻酸双酯钠
- B: 普伐他汀
- C: 氟伐他汀
- D: 阿伐他汀

答案: B

17. 肝癌晚期患者疼痛剧烈，可以选用的镇痛药物是

- A: 可待因
- B: 布桂嗪
- C: 阿司匹林
- D: 哌替啶

答案: D

18. 患者，男，19岁，既往有癫痫病史2年，长期服用苯妥英钠控制良好。1周前，患者无明显诱因感胸骨后烧灼感，无腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。查体：腹平软，无压痛及反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音正常。胃镜检查提示：胃食管反流病。医嘱：西咪替丁胶囊，400mg，口服，4次/日。

- A: 停药后复发率低
- B: 抑酸作用强大，持续时间长
- C: 能有效地抑制夜间基础胃酸分泌
- D: 很少发生耐药

答案: C

19. 阿司匹林的主要适应证不包括()

- A: 急性心肌梗死

- B: 不稳定型心绞痛
- C: 预防血栓形成
- D: 胃溃疡

答案：D

20. 铁剂用于治疗

- A: 溶血性贫血
- B: 小细胞低血红蛋白性贫血
- C: 巨幼细胞贫血
- D: 再生障碍性贫血

答案：B

21. 我国研制的没有“金鸡纳”反应的抗癌药

- A: 青蒿素
- B: 氯喹
- C: 伯氨喹
- D: 奎宁

答案：A

22. 可替代氯霉素用于治疗伤寒的药物是()

- A: 氨基糖苷类
- B: 四环素类
- C: 氟喹诺酮类
- D: 青霉素类

答案：C

23. 连续应用易产生耐受性的是

- A: 硝酸甘油

B: 硝苯地平

C: 地尔硫

D: 普萘洛尔

答案：A

24. 蛇毒血凝酶的给药方式不包括

A: 静脉注射

B: 皮下注射

C: 皮内注射

D: 肌肉注射

答案：C

25. 糖皮质激素的药理作用不包括

A: 抗病毒

B: 免疫抑制

C: 抗休克

D: 抗炎

答案：A

26. 经袢利尿药作用后排出的尿液是

A: 等渗

B: 先高渗后低渗

C: 低渗

D: 高渗

答案：A

27. 阻碍 DNA 合成的药物是

A: 高三尖杉酯碱

B: 氟尿嘧啶

C: 紫杉醇

D: 顺铂

答案: B

28. 患者，女，36 岁，近期经常上腹灼烧痛、反酸，疼痛多出现在上午 10 点及年 4 点，有时夜间痛醒进。食后缓解，X 线钡餐诊断为十二指肠溃疡，该患者宜使用的治疗药物是（）

A: 奥美拉唑

B: 颠茄

C: 甲氧氧普胺

D: 多潘立酮

答案: A

29. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次 / 分，R21 次 / 分，BP110 / 70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A: 老年人

B: 肾功能不全者

C: 肝功能不全者

D: 推荐应用大剂量万古霉素来维持其血药浓度在 $15 \sim 20 \mu g/ml$ 并且长疗程的患者

答案: C

30. 关于多柔比星治疗时使用右雷佐生的叙述，不正确的是

A: 右雷佐生剂量应为多柔比星剂量的 10 倍

B: 与多柔比星同时给药

C: 使用右雷佐生的目的是保护心肌

D: 右雷佐生水解后能与多柔比星螯合

答案: B

31. (2015 年真题) 阿片类镇痛药与硫酸镁合用，可增强中枢抑制，导致的不良反应是 ()。

A: 便秘

B: 胆绞痛

C: 躁狂

D: 低血压

答案: D

32. 属于叶酸类抗代谢类药物的是 ()

A: 长春瑞滨

B: 巯嘌呤

C: 吉西他滨

D: 甲氨蝶呤

答案: D

33. 主要抑制排卵的长效口服避孕药是

A: 庚酸炔诺酮

B: 苯丙酸诺龙

C: 丙酸睾丸素

D: 炔诺酮

答案: A

34. 小剂量碘主要用于

A: 黏液性水肿

- B: 抑制甲状腺素的释放
- C: 呆小病
- D: 地方性甲状腺肿

答案：D

35. 大环内酯类药的主要作用靶点是

- A: 细胞内膜 PBP
- B: 核糖体的 50S 亚基
- C: 细胞壁丙氨酰丙氨酸
- D: 核糖体的 30S 亚基

答案：B

36. 应用曲妥珠单抗治疗乳腺癌前对患者必须进行基因筛查，筛查的目的是

- A: B 淋巴细胞表面的 CD20
- B: 人表皮生长因子受体-2
- C: 表皮生长因子受体
- D: 血管内皮生长因子

答案：B

37. 对受体亲和力最大的糖皮质激素是

- A: 地塞米松
- B: 甲泼尼龙
- C: 氟氢可的松
- D: 氢化可的松

答案：B

38. 患者，男，60 岁，诊断为冠心病，经皮冠状动脉介入术置入支架。医生给予氯吡格雷、阿司匹林抗血小板治疗。

- A: 快代谢型患者
- B: 超快代谢型患者
- C: 慢代谢型患者
- D: 中间代谢型患者

答案：C

39. 环孢素合用可使赛洛多辛血药浓度升高，这是因为环孢素抑制

- A: CYP3A4
- B: 血浆蛋白
- C: UGT287
- D: p 一糖蛋白

答案：D

40. （2016 年真题）可以减轻环磷酰胺导致的膀胱毒性的药物是

- A: 右雷佐生
- B: 二巯基丙醇
- C: 美司钠
- D: 亚叶酸钙

答案：C

41. 可使维生素 B6 在体内的活性降低的是

- A: 雌激素
- B: 丙磺舒
- C: 异烟肼
- D: 糖皮质激素

答案：A

42. 为预防大剂量环磷酰胺引起的膀胱毒性，在充分水化，利尿的同时，还应给予的药物是（）

- A: 螺内酯
- B: 氯化钾
- C: 二甲双胍
- D: 美司钠

答案：D

43. 以下哪种药物对心脏影响最轻

- A: 茶碱
- B: 沙丁胺醇
- C: 异丙肾上腺素
- D: 肾上腺素

答案：B

44. 抢救糖尿病合并酮症酸中毒患者

- A: 二甲双胍
- B: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- C: 胰岛素皮下注射
- D: 静脉用胰岛素

答案：D

45. 严格控制用药剂量和用药时间可以避免产生

- A: 副作用
- B: 继发反应
- C: 变态反应
- D: 毒性反应

答案：D

46. 可增加溶血性尿毒症的发生危险的是

- A: 红霉素
- B: 氯丙嗪
- C: 他莫昔芬
- D: 维生素 C

答案：C

47. 林可霉素可以作为首选药的是

- A: 皮肤感染
- B: 金葡菌致骨髓炎
- C: 呼吸道感染
- D: 胆道感染

答案：B

48. 控制癫痫持续状态，可静脉注射

- A: 硫喷妥钠
- B: 阿司匹林
- C: 氯丙嗪
- D: 地西泮

答案：D

49. 氟喹诺酮类

- A: 禁用于 18 岁以下儿童及青少年
- B: 禁用于胆道阻塞患者
- C: 禁用于早产儿、新生儿
- D: 禁用于 8 岁以下儿童

答案：A

50. 与第二代溶栓酶相比，瑞替普酶的作用优势不包括()

- A: 给药较方便，可以为抢救患者赢得时间
- B: 血浆半衰期长，栓塞开通率高，给药方便
- C: 具有较强的、特异的纤维蛋白选择性
- D: 全身纤溶活性大于链激酶、阿替普酶

答案：D

51. 骨髓抑制较严重的是

- A: 亚叶酸钙
- B: 顺铂
- C: 奥沙利铂
- D: 卡铂

答案：D

52. 强心苷中毒引起的室性心律失常首选

- A: 苯妥英钠
- B: 利多卡因
- C: 胺碘酮
- D: 普萘洛尔

答案：A

53. 风湿性心脏病重度二尖瓣狭窄宜

- A: 常规剂量的洋地黄
- B: 快速洋地黄化
- C: 不宜使用洋地黄
- D: 停用洋地黄

答案：C

54. 与其他抗结核病药联合应用的是

- A: 妥布霉素
- B: 庆大霉素
- C: 奈替米星
- D: 链霉素

答案：D

55. (2021 年真题) 水溶性他汀类药物能够选择性抑制肝脏胆固醇合成，而对肾上腺、性腺、心脏、大脑等部位的胆固醇合成影响极低，既有效降低了血清胆固醇水平，又减少了肝脏以外组织不良反应的发生。水溶性较强的他汀类药物是 ()

- A: 普伐他汀
- B: 氟伐他汀
- C: 辛伐他汀
- D: 洛伐他汀

答案：A

56. 患者，男，30 岁。近期出现乏力、心动过速，考虑为“甲亢”，遵医嘱服用药物后出现头痛、眩晕、关节痛、剥落性皮炎的是

- A: 甲巯咪唑
- B: 左甲状腺素
- C: 地塞米松
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：D

57. 患儿，男，7 岁。长期偏食。近 1 个月面色渐苍白，自诉全身无力。体检：肝肋下 4cm，脾肋下 1cm。血常规：Hb70g / L，RBC3.0×10¹² / L，Ret2.0%，WBC、Plt 均正常，MCV74fl，MCH26pg，MCHC30%，考虑为缺铁性贫血。

- A: 黑色
- B: 蓝色
- C: 绿色
- D: 红色

答案：A

58. 与体内过氧化物和自由基结合,保护细胞中含巯基的蛋白质和酶,参与多种有毒物质解毒反应的药物是

- A: 甘草酸二铵
- B: 还原型谷胱甘肽
- C: 葡醛内酯
- D: 多烯磷脂酸胆碱

答案：B

59. 可用于治疗重度痤疮，但妊娠期妇女避免使用的药物是

- A: 克拉霉素
- B: 异维 A 酸
- C: 特比萘芬
- D: 克罗米通

答案：B

60. 为避免引起大面积中毒性表皮坏死松解症，服用前提倡做人体白细胞抗原等位基因（HLA-B*1502）检测的抗癫痫药是

- A: 卡马西平

B: 丙戊酸钠

C: 氯硝西泮

D: 托吡酯

答案：A

61. 唑来膦酸静脉给药输注的时间应在

A: 30 分钟以上

B: 60 分钟以上

C: 15 分钟以上

D: 5 分钟以上

答案：C

62. 对多种氨基糖苷类钝化酶稳定的药物是

A: 庆大霉素

B: 链霉素

C: 妥布霉素

D: 奈替米星

答案：D

63. 长期慢性便秘者不宜长期大量使用的药物是

A: 番泻叶

B: 利那洛肽

C: 多库酯钠

D: 欧车前

答案：A

64. 维生素 A 的适应证不包括

A: 夜盲症

- B: 干眼病
- C: 角膜软化
- D: 坏血病

答案：D

65. 治疗伤寒、副伤寒的首选药是

- A: 青霉素
- B: 氯霉素
- C: 诺氟沙星
- D: 四环素

答案：B

66. 属于 5-HT₃ 受体阻断剂的止吐药是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 托烷司琼
- C: 阿瑞吡坦
- D: 维生素 B₆

答案：B

67. 磷酸二酯酶Ⅲ抑制剂是()

- A: 米力农
- B: 多巴酚丁胺
- C: 地高辛
- D: 依那普利

答案：A

68. 下列药物中，能促进食物消化的是()

- A: 乳酶生

- B: 胶体果胶铋
- C: 雷尼替丁
- D: 兰索拉唑

答案：A

69. 能竞争 DNA 聚合酶的抗病毒药是

- A: 拉米夫定
- B: 利巴韦林
- C: 碘苷
- D: 阿昔洛韦

答案：D

70. (2017 年真题) 关于糖皮质激素外用制剂使用注意事项的说法, 错误的是 ()

- A: 面部、阴部和皱褶部位的湿疹, 需长期使用强效制剂
- B: 若继发细菌或真菌感染, 可与抗菌药或抗真菌药联合使用
- C: 为控制的细菌或真菌感染不宜使用
- D: 可用于过敏性皮炎的治疗

答案：A

71. 关于氢氧化铝叙述正确的是

- A: 与胃液混合形成凝胶保护膜
- B: 不易引起便秘
- C: 促进肠道磷酸盐的重吸收
- D: 减少胃酸分泌

答案：A

72. (2016 年真题) 属于延长动作电位时程的抗心律失常药是

- A: 硝酸甘油
- B: 利多卡因
- C: 美托洛尔
- D: 索他洛尔

答案：D

73. 分解痰液中的黏液成分如黏多糖和黏蛋白，使黏痰液化，痰液黏度降低而易于咳出的祛痰药是

- A: 碘化钾
- B: 氨溴索
- C: 表面活性剂
- D: 氯化铵

答案：B

74. 用于散瞳的眼用药物是

- A: 噻吗洛尔
- B: 溴莫尼定
- C: 复方托吡卡胺
- D: 毛果芸香碱

答案：C

75. 患者，女，49岁，间断上腹部饱胀、恶心1年。患者1年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部B超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。

医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3次/日。

- A: 不会导致锥体外系反应
- B: 不会促进乙酰胆碱的释放

C: 不会导致催乳素增多

D: 不会导致 Q-T 间期延长及室性心律失常

答案: B

76. 下列与激素水平无关的肿瘤是()

A: 小细胞肺癌

B: 乳腺癌

C: 甲状腺癌

D: 前列腺癌

答案: A

77. 属于钠通道阻滞剂的抗心律失常药的是()。

A: 硝酸甘油

B: 索他洛尔

C: 利多卡因

D: 美托洛尔

答案: C

78. (2019 年真题) 患者，男，52 岁，BMI28kg/m²，既往有动脉粥样硬化性心血管病、高尿酸血症、痛风病，患者诉昨晚 8 点起右大脚趾关节处疼痛难忍，宜使用的药物是()

A: 碳酸氢钠

B: 秋水仙碱

C: 别嘌醇

D: 非布司他

答案: B

79. 门冬酰胺酶能抑制蛋白质的合成，使细胞停止于()，从而降低其对甲氨蝶呤的敏感性，限制甲氨蝶呤的骨髓毒性

- A: G
- B: G
- C: G
- D: M 期

答案：C

80. 用于预防单纯性甲状腺肿的是

- A: None
- B: 小剂量碘制剂
- C: 大剂量碘制剂
- D: 甲状腺素

答案：B

81. 对 G

- A: 第一代头孢菌素
- B: 第四代头孢菌素
- C: 第三代头孢菌素
- D: 第二代头孢菌素

答案：B

82. 抗菌谱较窄，对放疗有增敏作用

- A: 丝裂霉素
- B: 环磷酰胺
- C: 放线菌素 D
- D: 阿霉素

答案：C

83. 以上药物镇咳作用最弱的是

- A: 吗啡
- B: 可待因
- C: 右美沙芬
- D: 喷托维林

答案：D

84. 急性心肌梗死引起的室性心律失常有效，对室上性心律失常基本无效的药物是

- A: 地高辛
- B: 胺碘酮
- C: 利多卡因
- D: 苯妥英钠

答案：C

85. 可用于烧伤及伤后感染的是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 磺胺米隆
- C: 磺胺甲噁唑
- D: 柳氮磺吡啶

答案：B

86. 神经毒性较严重的是

- A: 奥沙利铂
- B: 顺铂
- C: 亚叶酸钙

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 卡铂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/187114033141010024>