

2024 安徽省谢家集区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试完整版【轻巧夺冠】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 可治疗男性性功能障碍的药物是

- A: 西地那非
- B: 维生素 E
- C: 度洛西汀
- D: 沙美特罗

答案：A

2. 归属于药历“患者基本情况”内容的是

- A: 临床诊断
- B: 主要实验室检查数据
- C: 医保和费用支付情况
- D: 联合用药

答案：C

3. 患者，男性，80 岁，患有帕金森病伴闭角型青光眼，近 2 个月出现尿频、尿急、夜尿增多，无法控制。诊断为急迫性尿失禁，给予米拉贝隆治疗。药师应告知患者药物的主要不良反应是

- A: 直立性低血压
- B: 口干、便秘、尿潴留
- C: 鼻咽炎和尿路感染
- D: 卧位和坐位时高血压

答案：C

4. “记录患者用药问题、药学干预内容、药学监测计划”的技能是

- A: 药历书写技能
- B: 沟通技能
- C: 药品警戒技能
- D: 自主学习能力

答案：A

5. 溃疡性结肠炎患者应限制摄入的食品是

- A: 流质饮食
- B: 维生素类食品
- C: 乳制品
- D: 低渣食品

答案：C

6. 烫伤后药物选择不宜选用

- A: 润湿烧伤膏
- B: 京万红软膏
- C: 甲紫
- D: 破伤风

答案：C

7. 服用头孢曲松、甲硝唑、氯丙嗪等应该禁用的是

- A: 酒
- B: 浓茶
- C: 烟
- D: 食醋

答案：A

8. 赵某，男性，60 岁，既往高血压病史 8 年。与邻居吵架后突然起病，言语不清、左侧肢体无力、意识不清。查体：BP210 / 120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激阳性，左侧肢体无法活动，左侧巴宾斯基征阳性。

- A: 呋塞米
- B: 硝普钠
- C: 甘油果糖
- D: 尼莫地平

答案：C

9. 下列关于解热药的使用叙述错误的是

- A: 退热属对症治疗，可能会掩盖病情
- B: 阿司匹林无致畸作用，但由于可导致出血，故不宜在妊娠的最后 2 周使用
- C: 应严格掌握用量，避免滥用，老年人应减量
- D: 多数宜在餐后服用

答案：B

10. 药学服务的最基本的要素是

- A: 与药物有关的服务
- B: 调配
- C: 药学知识
- D: 用药指导

答案：A

11. 患者，男，28 岁，2 天前因淋雨后出现发热，体温最高达 39℃，经实验室和胸片检查，临床诊断为社区获得性肺炎，无其他基础疾病，可首选的抗菌药物是：

- A: 阿米卡星
- B: 亚胺培南西司他丁
- C: 头孢拉定
- D: 头孢哌酮舒巴坦

答案：C

12. 患者，女，53 岁，既往有痛风史，长期坚持服药控制。近日因高血压就诊，该患者禁用的药物是

- A: 洛伐他汀
- B: 卡托普利
- C: 普萘洛尔
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

13. 分析以下用药错误的事例，属于"认知缺失"的是

- A: 患者自行选购药品、误用假药、劣药
- B: 医师非主观意愿的诊断错误、造成误诊误治
- C: 调剂工作过于繁忙
- D: 新手值班以及计算机医嘱系统缺陷

答案：B

14. (2017 年真题) 患者，男 52 岁，身高 168cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L (正常值: 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 14.8mmol/L (正常值: <7.8mmol/L)，血尿酸 580 μmol/L (正常值: 男性 180~440 μmol/L)，LDL-c 3.7mmol/L (正常值: 2.1~3.1mmol/L) 肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示: 动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

- A: 低嘌呤饮食
- B: 适量运动
- C: 控制体重
- D: 应用阿司匹林

答案: D

15. 患者，女，45 岁，6 个月前出现口吐白沫、意识丧失、二便失禁。在神经专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗，症状控制较好。近 3 个月服用西咪替丁，患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱。该患者在全国各地求医，服用各种药物，具体药物品种不详。围绕该病例，医师、药师、护士对抗癫痫药物的安全用药和用药注意事项进行讨论。

- A: 有条件者应监测血药浓度
- B: 遵循多药联合治疗原则
- C: 长期规律用药
- D: 定期监测肝功能

答案: B

16. 患者，男，72 岁，患有阿尔茨海默病，给予卡巴拉汀每日 3mg 治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是 ()

- A: 每日清晨空腹口服

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 每晚睡前口服

C: 每日早晚与食物同服

D: 每日早晚空腹口服

答案：C

17. 下列关于药物对孕妇的影响哪一项是错误的

- A: 孕妇不应过量服用含咖啡因的饮料
- B: 受精后 3 周~3 个月接触药物最易发生先天畸形
- C: 受精后的半个月内几乎见不到药物的致畸作用
- D: 孕妇患有结核、糖尿病应绝对避免药物治疗以防止胎儿畸形

答案：D

18. 可致体重增加的抗癫痫药为（）

- A: 苯巴比妥
- B: 苯妥英钠
- C: 左乙拉西坦
- D: 丙戊酸钠

答案：D

19. 不能用于治疗缺铁性贫血的药物是

- A: 葡萄糖酸亚铁
- B: 乳酸亚铁
- C: 去铁胺
- D: 硫酸亚铁

答案：C

20. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。

日前体检：身高 160cm，体重 70kg；白细胞 $8.0 \times 10^9/L$

- A: 乳酸酸中毒
- B: 心力衰竭
- C: 低血糖
- D: 肌痛

答案：A

21. 慢性沙眼患者禁用的药品是

- A: 醋酸可的松滴眼剂
- B: 利福平滴眼剂
- C: 酞丁安滴眼剂
- D: 硫酸锌滴眼剂

答案：A

22. 某女性，19 岁，2 年前因上呼吸道感染后逐渐出现甲状腺肿大，伴多汗、多食、消瘦、心悸、烦躁，根据血 T

- A: 甲状腺功能亢进
- B: 亚急性甲状腺炎
- C: 单纯性甲状腺肿
- D: 甲状腺功能减退

答案：A

23. 属于患者用药咨询的是

- A: 减肥、补钙、补充营养素
- B: 注射剂溶媒的正确选择
- C: 栓剂、气雾剂的正确使用方法
- D: 抗菌药物的合理应用

答案：C

24. 同时使用 2 种药物，药物不良事件的发生率为

- A: 0.72
- B: 0.58
- C: 0.13

D: 0.38

答案: C

25. 患者，女，27岁，2年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血 T₃、T₄ 及 TSH 检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

A: 甲巯咪唑

B: 碳酸锂

C: 丙硫氧嘧啶

D: 放射性 ¹³¹I

答案: C

26. 常见老年人 ADR 的药物类别，硝苯地平可出现面部潮红、心慌、头痛等反应

A: β 受体阻断剂

B: 抗生素

C: 钙通道阻滞剂

D: 抗胆碱药

答案: C

27. β 受体阻断剂的主要不良反应是

A: 足踝部水肿

B: 支气管痉挛

C: 血尿酸升高

D: 直立性低血压

答案: B

28. 口服避孕药中雌激素对机体代谢的影响，正确的为

- A: 甘油三酯降低
- B: 低密度脂蛋白胆固醇升高
- C: 高密度脂蛋白胆固醇降低
- D: 糖耐量异常

答案：D

29. 根据血红蛋白含量评估缺铁性贫血程度重度贫血为

- A: 60～90g / L
- B: 90～120g / L
- C: 30～60g / L
- D: 120～160g / L

答案：C

30. 下列哪个不是慢性咽炎的临床表现

- A: 有刺激性咳嗽
- B: 清晨起床后常会吐出微量的稀痰，伴有声嘶
- C: 常伴有发热
- D: 咽喉部不适、干燥、发痒、疼痛或有异物感

答案：C

31. 甲氨蝶呤归属

- A: B 级
- B: X 级
- C: D 级
- D: C 级

答案：B

32. 适合餐前服用的是

- A: 吲哚美辛
- B: 氟伐他汀
- C: 奥利司他
- D: 多潘立酮

答案：D

33. 患者，男，体检发现尿血红蛋白阳性，特向药师咨询，怀疑为药物所致，以下可导致尿血红蛋白阳性的药物是

- A: 氯丙嗪
- B: 秋水仙碱
- C: 两性霉素 B
- D: 庆大霉素

答案：B

34. 代谢性或呼吸性碱中毒

- A: 尿蛋白检测阳性
- B: 尿酸碱度降低
- C: 尿酸碱度增高
- D: 尿胆红素检测阳性

答案：C

35. 餐前服用，可以促进胃排空的药品是

- A: 复方铝酸铋片
- B: 甲氧氯普胺片
- C: 瑞舒伐他汀片
- D: 二甲双胍片

答案：B

36. 患儿，女，4岁半。身高 110cm，体重 15kg。一天前发热（39.1℃），咽喉痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗，发病 20h 左右出现腹泻，约 2~5h，一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽位充血，出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \sim 10 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 分泌性腹泻？
- B: 动力性腹泻？
- C: 消化不良性腹泻？
- D: 感染性腹泻？

答案：D

37. 患儿，女，4岁半，身高 110cm，体重 15kg。1 天前开始发热，体温 39.1℃，咽部稍痛，无咳嗽、无吐泻。家长在家选用退热药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，每间隔 2~3 小时排 1 次大便，量少，黄色黏液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，咽部微充血，出现轻微脱水症状；双肺呼吸音清，腹平软，肝、脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ ，粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 消化不良性腹泻
- B: 感染性腹泻
- C: 分泌性腹泻
- D: 动力性腹泻

答案：B

38. 剂量过大，疗程过长，滴注速度过快，用药途径错误，重复用药等归属

- A: 药理作用

- B: 药物的使用
- C: 药动学相互作用
- D: 药物制剂因素

答案：B

39. 可诊断女性高尿酸血症的是

- A: 血尿酸为 $270\ \mu\text{mol/L}$
- B: 血尿酸为 $380\ \mu\text{mol/L}$
- C: 血尿酸为 $200\ \mu\text{mol/L}$
- D: 血尿酸为 $420\ \mu\text{mol/L}$

答案：B

40. 治疗三叉神经痛者首选的药物是

- A: 地西泮
- B: 卡马西平
- C: 谷维素
- D: 布洛芬

答案：B

41. 属于广谱抗病毒药，具有抗病毒、调节免疫和抗增生作用的是

- A: 氟胞嘧啶
- B: 奥司他韦
- C: 更昔洛韦
- D: 干扰素

答案：D

42. 用药剂量相同，妊娠期的血药浓度低于非妊娠期，是由于

- A: 胃肠活动程度减弱，使吸收减慢

- B: 妊娠晚期血流动力学发生改变较多
- C: 血容量增加使血浆清蛋白浓度降低
- D: 妊娠期药物分布容积明显增加

答案：D

43. 为保证用药安全，一些药物应用前需要实施皮肤敏感试验。一些权威性较高的二次文献中记载的需进行皮肤敏感试验的药品是

- A: 青霉素钠注射剂
- B: 鱼肝油酸钠注射剂
- C: 玻璃酸酶注射剂
- D: 链霉素注射剂

答案：C

44. 抗凝治疗

- A: 低分子肝素
- B: 阿司匹林
- C: 阿替普酶
- D: 巴曲酶

答案：A

45. 药物对孕妇的不良影响中，摄入过量泻药、利尿药可能引起()。

- A: 流产
- B: 畸形
- C: 溶血
- D: 死胎

答案：A

46. 具有肝毒性和性功能障碍不良反应，与其他药物同服时容易影响后者的血药浓度，不应成为该类药物首选的是

- A: 硫糖铝
- B: 莫沙必利
- C: 西咪替丁
- D: 埃索美拉唑

答案：C

47. 舒肝丸与甲氧氯普胺合用

- A: 合用抑制呼吸，易致呼吸衰竭
- B: 合用后抑制后者吸收，降低疗效
- C: 两者合用作用相反，互相降低药效
- D: 合用后增加毒性，出现药物中毒

答案：C

48. 作用于核酸转录的药物是

- A: 放线菌
- B: 依托泊苷
- C: 培美曲塞
- D: 顺铂

答案：A

49. 脑梗死的分期恢复期

- A: 2 周
- B: 1~6 个月
- C: 1 个月内
- D: 1~3 个月

答案：B

50. 处方审核是处方调配中的重要环节，药师应确定处方内容正确无误后，方可进行药品调配。处方审核结果分为合理处方和不合理处方。不合理处方包括不规范处方、用药不适宜处方及超常处方。

- A: 使用“遵医嘱”字句
- B: 联合用药不适宜
- C: 字迹难以辨认
- D: 无正当理由超说明书用药

答案：D

51. 易经乳汁分泌药物的特性是

- A: 蛋白结合率高
- B: 脂溶性高
- C: 分子量大
- D: 弱酸性

答案：B

52. （2021 年真题）患者，女，58 岁，诊断为骨性关节炎，经洛索洛芬单药治疗疼痛缓解不理想可联合使用的药物是（）

- A: 曲马多
- B: 美洛昔康
- C: 阿司匹林
- D: 双氯芬酸

答案：A

53. 氯霉素可引起

- A: 再生障碍性贫血
- B: 锥体外系反应

C: 癫痫发作

D: 听神经障碍

答案: A

54. 一般给予肠外营养物质的热氮比为

A: NPC7: 3

B: 100kcal: 1gN

C: NPC5: 5

D: 150kcal: 1gN

答案: D

55. 属于选择性 5-HT₄ 受体激动剂，促进乙酰胆碱释放的促胃肠动力药是

A: 莫沙必利

B: 多潘立酮

C: 昂丹司琼

D: 甲氧氯普胺

答案: A

56. 患者，男 64 岁，身高 174cm，体重 92KG，既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗

A: 特拉唑嗪片、辛伐他丁、阿司匹林肠溶片

B: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片

C: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、单硝酸异山梨酯注射液

D: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、辛伐他丁

答案: C

57. 正常人的体温在 37℃左右，但各个部位的温度不尽相同，内脏温度最高，头部次之，皮肤和四肢末端的温度最低。发热是指人体体温升高，超过正常范围。发热是人体对致病因子的一种全身性防御反应，是患病时常伴发或主要表现的一种症状。

- A: 退热用药可能发生皮疹、哮喘等反应
- B: 退热用药可能引起胃肠道的损伤
- C: 退热属对症治疗，可能掩盖病情，影响疾病诊断
- D: 退热用药可能导致肝、肾脏损伤

答案：C

58. 药师对药品不良事件、新药上市后被召回或撤市的案例应及时掌握，不能松懈

- A: 塞来昔布
- B: 钆贝葡胺
- C: 替加色罗
- D: 培高利特

答案：B

59. 异丙嗪属于

- A: 血管扩张药
- B: 利尿剂
- C: 抗组胺药
- D: 镇痛药

答案：C

60. 下列口腔溃疡治疗药物可降低毛细血管的通透性，减少炎症的渗出的是

- A: 甲硝唑含漱剂

B: 地塞米松黏贴片

C: 维生素 C

D: 冰硼散

答案: B

61. 中度贫血，Hb 为（）

A: 小于 60g/L

B: 90~120g/L

C: 60~90g/L

D: 60~120g/L

答案: C

62. 处方前记项下包括的项目（）

A: 临床诊断、费别

B: 主要实验室数据

C: 医师签名、药品金额

D: 对药物治疗的建设性意见与结果评价

答案: A

63. 某女孩，6 岁，2 个月来反复突发突止的意识障碍，表现为突然动作中断，呆立凝视，呼之不应，手中物体掉落，但从不跌倒，持续数秒钟缓解。

A: 地西泮

B: 苯妥英钠

C: 卡马西平

D: 丙戊酸钠

答案: D

64. 妊娠期使用某些药物可能导致胎儿发育异常，其中最易受到药物影响，可能产生形态或者功能上异常而造成胎儿畸形的阶段是：

- A: 妊娠 3~12 周
- B: 妊娠 13~27 周
- C: 妊娠 1~2 周
- D: 妊娠 27~32 周

答案：A

65. 关于微生态制剂，下列说法不正确的是

- A: 调节肠道菌群平衡
- B: 对促进营养物质的吸收没有帮助
- C: 补充人体正常生理细菌
- D: 清除对人体具有潜在危害的细菌

答案：B

66. 下列属于合理处方的是

- A: 患者，女，40 岁，咳嗽数日，经实验室检查示白细胞和 C-反应蛋白均正常，开具阿奇霉素治疗
- B: 患者，女，75 岁，身高 155cm，体重 77kg，高脂血症病史 10 年，因胃癌术后难以进食，给予脂肪乳静脉营养补液，给药期间密切关注血三酰甘油水平
- C: 患者，男，35 岁，行皮下脂肪瘤切除术（I 类手术切口），开具头孢哌酮-舒巴坦预防感染
- D: 患者，男，72 岁，患有活动性胃溃疡，因心肌梗死给予阿司匹林肠溶片

答案：B

67. 贫血的临床表现与下列哪项有关

- A: 铁元素缺乏
- B: 缺乏叶酸
- C: 血红蛋白下降的速度
- D: 红细胞减少

答案：C

68. 提示：不要驾车，操作机器或高空作业等，是针对

- A: 卡托普利
- B: 铋制剂
- C: 氟西汀
- D: 氯苯那敏

答案：D

69. （2021 年真题）吉法酯片治疗消化性溃疡，正确的用药方法是（）

- A: 餐后半小时服用
- B: 清晨空腹整片吞服，并保持上身直立至少 30 分钟
- C: 餐前 1/小时嚼碎服用
- D: 睡前服用

答案：A

70. 用于治疗溃疡性结肠炎，应多饮水，保持高尿流量，以防结晶尿的发生，必要时服用碳酸氢钠碱化尿液的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 西格列汀
- C: 阿卡波糖
- D: 格列吡嗪

答案：D

71. 三叉神经痛，应选的药物是

- A: 对乙酰氨基酚片
- B: 芬太尼透皮贴剂
- C: 卡马西平片
- D: 羟考酮缓释片

答案：C

72. 能有效控制症状，但单独使用不能改善 FEV1 的长期下降，也不能改变 COPD 患者的病死率的药物是（）

- A: 非甾体抗炎药 B β -受体阻断剂
- B: 茶碱
- C: 短效 β 2-受体激动剂
- D: 吸入型糖皮质激素

答案：D

73. 患者，男，60 岁，呈典型的"面具脸"，"慌张步态"及"小字症"表现，确诊为帕金森病，患者同时患有闭角型青光眼，不宜选用的治疗帕金森病的药物是（）

- A: 多奈哌齐
- B: 普拉克索
- C: 司来吉兰
- D: 左旋多巴

答案：D

74. 荨麻疹患者常出现

- A: 中性粒细胞增多
- B: 血小板计数增高
- C: 嗜酸性粒细胞增多

D: 血红蛋白减少

答案：C

75. 混合型高脂血症，首选用的药物是

A: 烟酸

B: 贝特类

C: 他汀类

D: ω -3 脂肪酸

答案：C

76. (2018 年真题) 患者, 女, 25 岁, 产后 2 个月, 哺乳期, 因尿路感染需要给予抗感染治疗, 首选的药物是 ()

A: 阿米卡星

B: 左氧氟沙星

C: 头孢呋辛

D: 多西环素

答案：C

77. 下列药品宜于冷处贮存, 但不应冷冻的是

A: 复方氨基酸注射剂

B: 双歧三联活菌制剂

C: 托烷司琼注射剂

D: 替硝唑注射剂

答案：B

78. 处方审核是处方调配的重要环节, 药师只有在审核处方内容正确无误时才能进行药品调配。处方审核的结果分为合理处方和不合理处方, 不合理处方包括不规范处方、用药不适宜处方和超常处方。

- A: 无适应证用药
- B: 联合用药不适宜
- C: 单张门诊处方超过 5 种药品
- D: 无正当理由开具高价药

答案：B

79. 静脉注射给药的外文缩写是

- A: i. h
- B: ivgtt
- C: im
- D: iv

答案：D

80. 万络（罗非昔布）撤市是发现大剂量服用万络者患心肌梗死和心脏猝死的危险增加了 3 倍；此例体现了药物警戒的作用包括

- A: 发现药品说明书问题
- B: 药品上市前风险评估
- C: 发现与规避假、劣药流入市场
- D: 药品上市后风险评估

答案：D

81. 一旦血肌酐升幅大于 30%~50%应

- A: 慎用甲基多巴
- B: 停用 ACEI 或减量
- C: 联用他汀类
- D: 给予硫酸亚铁

答案：B

82. 合剂的规范书写是

- A: Dos
- B: Dil
- C: Liq
- D: Mist

答案：D

83. 患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 美洛昔康
- B: 双氯芬酸钠
- C: 尼美舒利
- D: 对乙酰氨基酚

答案：D

84. 分娩前应用可引起新生儿循环障碍和灰婴综合征的药物是

- A: 维生素 A
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 维生素 D
- D: 氯霉素

答案：D

85. 就乙肝血清免疫学检查而言，判别“大三阳”区别于“小三阳”的主要检查项目结果是

- A: 抗-HBs(+)
- B: HBeAg(+)

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: HBsAg(+)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/188053071047007022>