

抗菌药物考试题库汇总（1）

1、下面说法错误的是（ C ）

A、卫生部负责全国医疗机构抗菌药物临床应用的监督管理。

B、抗菌药物临床使用应当遵循安全、有效、经济的原则。

C、抗菌药物是指治疗细菌、支原体、衣原体、立克次体、螺旋体、真菌、病毒、寄生虫等所致感染性疾病的药物。

D、根据安全性、疗效、细菌耐药性、价格等因素，将抗菌药物分为三级：非限制使用级，限制使用级和特殊使用级。

2、关于非限制使用级抗菌药物的说法正确的是（ B ）

A、非限制使用级抗菌药物是指经长期临床应用证明安全、有效，对细菌耐药性影响较大，或者价格相对较高的抗菌药物。

B、非限制使用级抗菌药物是指经长期临床应用证明安全、有效，对细菌耐药性影响较小，价格相对较低的抗菌药物。

C、非限制使用级抗菌药物具有明显的或者严重的不良反应，不宜随意使用的抗菌药物。

D、非限制使用级抗菌药物是疗效、安全性方面临床资料较少的抗菌药物。

3、主治医师临床应用中一般情况下，可以选用的抗菌药物有（ B ）

A、特殊使用级和限制使用级

B、非限制使用级和限制使用级

C、非限制使用级和特殊使用级

D、三种级别可任意选用

4、急性胆道感染时临床上最常选用（ ） D

A、第 1、2 代头孢菌素或喹诺酮类

B、第 3 代头孢菌素或四环素类

C、第 1、2 代头孢菌素或氨基糖甙类

D、第 3 代头孢菌素或广谱青霉素

5、发生 CRI/CRBSI 的危险性顺序正确的是（ ） A

A、锁骨下静脉<颈内静脉<股静脉

- B、锁骨下静脉<股静脉<颈内静脉
C、颈内静脉<锁骨下静脉<股静脉
D、股静脉<颈内静脉<锁骨下静脉
- 6、最常见的引起过敏性休克的药物是（）A
A、青霉素
B、红霉素
C、庆大霉素
D、万古霉素
- 7、最有效的杀阿米巴包囊的药物是（）B
A、双碘喹啉
B、二氯尼特
C、氯喹
D、吐根碱
- 8、最常见的致病曲霉是（）C
A、黑曲霉
B、黄曲霉
C、烟曲霉
D、土曲霉
- 9、儿童 CMV 感染的一线用药是（）B
A、左氧氟沙星
B、更昔洛韦
C、万古霉素
D、美洛培南
- 10、急性细菌性上呼吸道感染的病原菌主要为（）C
A、流感嗜血杆菌
B、肺炎链球菌
C、溶血性链球菌
D、葡萄球菌
- 11、M-H 药敏琼脂要求琼脂厚度是（）B
A、 2mm

B、 4mm

C、 6mm

D、 8mm

12、嗜肺军团菌的生存能力较强，在下水道污水中可存活（） B

A、 100 天

B、 1年

C、 2年

D、 3年

13、慢性心包炎的病程超过（） C

A、 6周

B、 3个月

C、 6个月

D、 9个月

14、单纯疱疹病毒主要侵犯什么部位的皮肤黏膜（） A

A、 颜面和生殖器

B、 胸前

C、 四肢

D、 手足

15、人类艾滋病病毒和肝炎病毒只能感染（） A

A、 人类和黑猩猩

B、 小鼠和豚鼠

C、 人类和家兔

D、 人类和雪貂

16、新生儿感染时应避免应用的抗菌药物是（） B

A、 青霉素类

B、 喹诺酮类

C、 氨基糖苷类

D、 头孢菌素类

17、肾功能不良的患者铜绿假单胞菌感染可选用（） B

A、 多粘菌素

B、头孢哌酮

C、氨苄西林

D、庆大霉素

18、用药过程中需要密切监测肝功能变化的药物是（ ） A

A、酮康唑

B、庆大霉素

C、甲氧苄啶

D、去甲万古霉素

19、根据抗菌药物临床应用指导原则，医疗机构抗菌药物使用强度力争控制在（ C ）DDD 以下。

A、20

B、30

C、40

D、50

20、接受抗菌药物治疗的住院患者微生物检验样本送检率应该不低于（ B ）

A、20%

B、30%

C、40%

D、50%

21、抗菌药物是指治疗细菌、支原体、衣原体、立克次体、螺旋体、等病原微生物所致感染性疾病的药物。（ B ）

A、病毒

B、真菌

C、寄生虫

D、疟疾

22、医疗机构应当对出现抗菌药物超常处方以上且无正当理由的医师提出警告，

限制其特殊使用级和限制使用级抗菌药物处方权；（ B ）

A、2次

- B、3 次
 - C、4 次
 - D、5 次
- 23、老年感染患者一般不宜选用：（ C ）
- A、青霉素类
 - B、克林霉素
 - C、氨基糖苷类
 - D、头孢菌素类
- 24、妊娠期不宜选用的抗菌药有：（ C ）
- A、青霉素
 - B、头孢呋辛
 - C、环丙沙星
 - D、磷霉素
- 25、具有致出血不良反应的头孢菌素是（ D ）
- A. 头孢唑啉
 - B. 头孢克洛
 - C. 头孢呋辛
 - D. 头孢哌酮
- 26、抗菌药物疗程，一般宜用至体温正常，症状消退后（ C ）
- A、24-48 小时
 - B、48-72 小时
 - C、72-96 小时
 - D、5-7 天
- 27、需要严格控制使用避免细菌过快产生耐药的抗菌药物：（ A ）
- A、特殊使用
 - B、限制使用
 - C、管理使用
 - D、非限制使用
- 28、外科预防用抗菌药物给药方法，接受清洁手术（ I 类切口手术），在术前小时给药；（ B ）

A、 1-2

B、 0.5-2 C、 2-3 D、 3-4

29、细菌耐药率超过的抗菌药物，应当暂停临床应用。（ D ）

A、 30%

B、 40%

C、 50%

D、 75%

30、肝功能减退时，不需要调整给药剂量的药物为：（ D ）

A、 克林霉素

B、 利福平

C、 红霉素

D、 头孢他啶

31、对于头孢菌素认识错误的是（ D ）

A. 治疗甲氧西林敏感葡萄球菌感染，最好选择头孢唑啉

B. 随着头孢菌素代别增加，抗阴性菌活性增加

C. 随着头孢菌素代别增加，抗菌谱扩宽

D. 第四代头孢菌素抗阳性球菌活性最强

32、下列属于繁殖期杀菌药的是（ B ）

A、 氨基糖苷类

B、 头孢菌素类

C、 氯霉素类

D、 四环素类

33、抗菌药联合用药的目的不包括（ D ）

A、 治疗混合感染

B、 扩大抗菌范围

C、 减缓耐药性的产生

D、 延长作用时间

34、抗菌药物作用机制不包括（ D ）

A、 抑制细菌细胞壁合成

B、 抑制细胞膜功能

- C、抑制或干扰蛋白质合成
- D、抑制受体介导的信息传递

35、下列药物组合有协同作用的是（ D ）

- A、青霉素+ 红霉素
- B、青霉素+ 四环素
- C、青霉素+ 氯霉素
- D、青霉素+ 阿米卡星

36、《关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知》卫办医政发〔2009〕38号指出对β-内酰胺类抗菌药物过敏者，可选用预防葡萄球菌、链球菌感染。（ A ）

- A、克林霉素
- B、左氧氟沙星
- C、头孢唑啉
- D、阿奇霉素

37、在制订抗菌治疗方案中给药途径描述不正确的是（ C ）

- A、轻症感染可接受口服给药者
- B、重症感染、全身性感染患者初始治疗应予静脉给药
- C、氨基糖苷类可局部用药制成滴耳剂
- D、治疗全身性感染或脏器感染时应避免局部应用抗菌药物

38、下列哪种手术宜预防性应用抗生素（ D ）

- A、疝修补术
- B、甲状腺腺瘤摘除术
- C、乳房纤维腺瘤切除术
- D、开放性骨折清创内固定术

39、老年人和儿童在应用抗菌药物是，最安全的品种是（ C ）

- A. 氟喹诺酮类
- B. 氨基糖苷类
- C. β-内酰胺类
- D. 氯霉素类

40、引起医院院内感染的主要致病菌是（ B ）

- A. 革兰阳性菌
- B. 革兰阴性菌
- C. 真菌 D 支原体

41、在细菌所引起的医院内感染中，以（ C ）感染在我国最常见。

- A. 尿路感染
- B. 术后伤口感染
- C. 肺部感染
- D. 皮肤感染

42、万古霉素对以下哪些微生物敏感（ A ）

- A、葡萄球菌、链球菌
- B、支原体、衣原体
- C、军团菌、螺旋体
- D、真菌、病毒

43、以下属于时间依赖性的抗菌药的是（ C ）

- A、妥布霉素
- B、环丙沙星
- C、头孢呋辛
- D、万古霉素

44、喹诺酮药物的不良反应有哪些（ D ）

- A、中枢神经系统的兴奋性增加和光毒性
- B、骨关节损害和跟腱炎
- C、心脏的损害和肝毒性
- D、以上皆是

45、对绿脓杆菌有效的头孢菌素是（ B ）

- A、头孢唑啉
- B、头孢他啶
- C、头孢氨苄
- D、头孢拉定

46、在头孢菌素中，抗阳性菌活性最强的是（ A ）

- A、第一代头孢菌素

B、第二代头孢菌素

C、第三代头孢菌素

D、第四代头孢菌素

47、大环内酯类抗生素可抑制（ A ）的正常代谢。

A、茶碱

B、胰岛素

C、血钠

D、血钾

48、对于（ D ），红霉素可作为首选药。

A、流感杆菌、铜绿假单胞菌

B、金黄色葡萄球菌、变形杆菌

C、大肠埃希菌、志贺菌

D、军团菌肺炎和支原体肺炎

49、诺氟沙星的禁忌证包括（ D ）

A、对喹诺酮类药物过敏者

B、糖尿病患者

C、18 岁以下患者

D、以上都是

50、妊娠期可选用的抗菌药物有（ D ）

A、庆大霉素

B、环丙沙星

C、克拉霉素 D 哌拉西林

51、对产生超广谱 β - 内酰胺酶的细菌感染的患者进行治疗时宜首选抗生素。（ A ）

A 碳青霉烯类

B 氯霉素类

C 大环内酯类

D 氨基糖苷类

52、肝功能减退时，不需调整给药剂量的药物为：（ B ）

A 氯霉素 B 庆大霉素 C 红霉素酯化物 D 利福平

53、酒后有明显的恶心、呕吐、面部潮红，头痛，血压降低，这种现象和哪种药物有关：（ D ）

A 四环素 B 氨苄西林 C 青霉素 D 头孢孟多

54、下列细菌中耐药最为严重的是（ C ）

A、铜绿假单胞菌

B、肺炎克雷伯菌

C、鲍曼不动杆菌

D、大肠埃希菌

55、头孢菌素过敏患者，针对革兰氏阴性菌感染可以选用（ B ）

A、万古霉素

B、氨曲南

C、克林霉素

D、阿莫西林

56、治疗（ C ）感染时，可以用抗菌药物的较小剂量给予治疗。

A、血流感染

B、感染性心内膜炎

C、单纯性下尿路感染

D、社区获得性肺炎

57、氨基糖苷类抗菌药物的作用机制是（ B ）

A、抑制细菌细胞壁的合成

B、干扰细菌蛋白质的合成

C、抑制细胞膜的功能

D、抑制核酸合成

58、下面属于氨基糖苷类抗菌药物的是（ A ）

A、阿米卡星

B、土霉素

C、氨曲南

D、氯霉素

59、牙齿发育患者禁用哪类抗菌药物（ A ）

A、四环素

B、头孢菌素

C、氨基糖苷类

D、碳青霉烯类

60、克林霉素对（ B ）具有较好的抗菌活性

A、革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌

B、革兰氏阳性菌、厌氧菌

C、革兰氏阴性菌、厌氧菌

D、革兰氏阳性菌、铜绿假单胞菌

61、患者需要应用限制使用抗菌药物治疗时，应经具有（ B ）以上专业技术职务任职资格的医师同意，并签名。

A 住院医师 B 主治医师 C 副主任医师 D 主任医师

62、治疗性使用抗菌药物在（ D ）小时后，必须有用药效果观察分析。

A 12

B 24 C36 D72

63、抗菌药物使用（ C ）时，必须有用药小结

A 一天 B 三天 C 一周 D 二周

64、抗菌药物的序贯式治疗原则指的是（ A ）

A 开始时先用注射剂，病情改善后再改用口服剂

B 开始时先用口服剂，病情改善后再改用注射剂

C 开始时使用广谱抗生素，随后根据微生物学检查结果调整使用窄谱抗生素

D 开始时使用窄谱抗生素，随后根据微生物学检查结果调整使用广谱抗生素

65、抗菌药物的降阶梯治疗原则指的是（ C ）

A 开始时先用注射剂，病情改善后再改用口服剂

B 开始时先用口服剂，病情改善后再改用注射剂

C 开始时使用广谱抗生素，随后根据微生物学检查结果调整使用窄谱抗生素

D 开始时使用窄谱抗生素，随后根据微生物学检查结果调整使用

广谱抗生素

66、下列哪种为限制使用的抗菌药物？（ C ）

A 青霉素 B 头孢唑林 C 头孢他啶 D 头孢匹罗

67、手术前预防用药目的是预防（ D ）

A 切口感染 B 手术深部器官或腔隙的感染

C 肺部感染 D 切口感染和手术深部器官或腔隙感染

68、在实际临床工作中，最为常见的感染是（ A ）

A 病毒性感染 B 细菌性感染 C 衣原体感染 D 真菌性感染

69、所谓合理用药是指（ D ）

A 选择正确的药物和给药途径

B 要以最小的社会消耗取得最大的社会效果

C 安全

D 以上都是

70、经临床长期应用证明安全、有效，价格相对较低的抗菌药物在抗菌药物分级管理中属于（ A ）

A 非限制使用抗菌药物

B 限制使用抗菌药物

C 特殊使用抗菌药物

D 以上都不是

71、我国抗菌药物使用不合理的情况有（ D ）

A 有适应症却没有用 B 该用高剂量的时候的剂量不足

C 没有适应症却用了，或使用抗菌药物剂量过大、疗程过长

D 以上都是

72、正确的抗菌治疗方案需考虑（ D ）

A 患者感染病情 B 感染的病原菌种类

C 抗菌药作用特点 D 以上都是

73、患者病情需要应用特殊使用抗菌药物，应具有严格临床用药指征或确凿依据，经抗菌药物临床应用专项整治活动管理小组有关专家会诊同意，处方需经具有（ C ）专业技术职务任职资格医师签名。

A 初级 B 中级 C 高级 D 以上均可

74、抗菌药物指治疗（ A ）等所致感染性疾病的药物

- A 支原体、衣原体 B 真菌、病毒
- C 支原体、寄生虫 D 以上都是

75、药师连续（ B ）次以上未按照规定审核抗菌药物处方与医嘱，或者发现处方不适宜、超常处方未进行干预且无正当理由的，取消其抗菌药物调剂资格。

- A 2 次 B 3 次 C 4 次 D 5 次

76、下列哪种药物对铜绿假单胞菌不具抗菌活性（ D ）

- A 哌拉西林 B 头孢噻肟 C 头孢他啶 D 头孢哌酮

77、治疗甲氧西林耐药葡萄球菌感染时首选（ A ）

- A 万古霉素 B 头孢唑啉 C 克林霉素 D 氨苄西林/舒巴坦

78、治疗厌氧菌感染可以选用（ D ）

- A 氨基糖苷类 B 头孢唑林 C 环丙沙星 D 甲硝唑

79、有神经肌肉接头阻滞作用，不宜用于重症肌无力患者感染的药物为（ D ） A 克林霉素 B 头孢曲松 C 美罗培南 D 阿米卡星

80、对曲霉有效的抗真菌药物为（ C ）

- A 酮康唑 B 氟康唑 C 两性霉素 B D 氟胞嘧啶

81、关于特殊使用级抗菌药物的说法错误的是（ D ）

A、特殊使用级抗菌药物具有明显或严重的不良反应，不宜随意使用。

B、特殊使用级抗菌药物需要严格控制使用，避免细菌过快产生耐药的抗菌药物。

C、特殊使用级抗菌药物疗效、安全性方面的临床资料较少。

D、特殊使用级抗菌药物价格一般相对便宜，疗效差。

82、预防感染、治疗轻度或者局部感染应当首选（ B ）

- A、限制使用级抗菌药物
- B、非限制使用级抗菌药物
- C、价格便宜的抗菌药物
- D、特殊使用级抗菌药物

83、以下哪个药物不得在门诊使用（ C ）

- A、头孢他啶
- B、头孢呋辛
- C、去甲万古霉素
- D、头孢曲松

84、I类切口手术围手术期预防用抗菌药物首选（D）

- A、头孢曲松
- B、头孢呋辛
- C、头孢硫脒
- D、头孢唑林

85、I类切口手术一般不预防使用抗菌药物，确需使用时，总预防用药时间一般不超过（B）

- A、12h
- B、24h
- C、36h
- D、48h

86、喹诺酮类抗菌药物的经验性治疗可用于（D）

- A、肠道感染
- B、社区获得性呼吸道感染
- C、社区获得性泌尿系统感染
- D、以上均是

87、下列药物中，应该严格控制作为外科围手术期预防用药的是（D）

- A、头孢唑林
- B、头孢呋辛
- C、头孢曲松
- D、左氧氟沙星

88、下面属于特殊使用级抗菌药物的是（D）

- A、头孢硫脒
- B、头孢哌酮舒巴坦
- C、头孢噻吩

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/188065023140007002>