
主治医师（口腔医学）-相关专业知识(A1/A2 型题 3)

1、颌面部的第三快速发育期是指

- A. 16~19 岁，第三恒磨牙萌出
- B. 7 个月~6 岁，乳牙列期
- C. 4~7 岁，第一恒磨牙萌出
- D. 7~11 岁，替牙列期
- E. 11~13 岁，第二恒磨牙萌出

2、以下不属于预防性矫治范畴的是

- A. 龋的早期治疗
- B. 口腔不良习惯的早期破除
- C. 乳牙早失的缺隙保持
- D. 滞留乳牙的及时拔除
- E. 早期严重拥挤牙列的序列拔牙治疗

3、关于个别正常概念说法，不正确的是

- A. 存在轻微的错畸形
- B. 对生理过程无大妨碍
- C. 对美观无大影响
- D. 个体之间表现有所不同
- E. 必须保存全副牙齿，且上、下牙尖窝关系完全正确

4、关于牙根特异性吸收的说法，不正确的是

- A. 其发生与矫治力无关
- B. X 线片检查常发现矫治前已经有根吸收
- C. 矫治力不会加速其吸收
- D. 牙根表面的牙骨质可发生吸收
- E. 牙根内面的牙本质可出现吸收

5、牙列拥挤开辟间隙的方法不包括

- A. 扩弓
- B. 推磨牙向远中
- C. 拔牙
- D. 用功能性矫治器促进下颌骨生长
- E. 邻面去釉

6、以下不属于阻断性矫治范畴的是

- A. 口腔不良习惯的破除
- B. 对有骨性错倾向的病例进行早期生长控制
- C. 拔除埋伏多生牙
- D. 用功能性矫治器治疗恒牙早期 II 类错
- E. 第一恒磨牙前移时的间隙恢复

7、推出差动力概念的是

- A. Angle
- B. Andrews
- C. Begg
- D. Bennett
- E. Tweed

8、根据矫治力的强度中度力是指

- A. 30~60g
- B. 60~150g
- C. 100~150g
- D. 60~350g
- E. 350~500g

9、关于上颌中切牙间多生牙的说法，不正确的是

- A. 常导致上颌正中中间隙
- B. 形态常异常
- C. 可单独或多个发生
- D. 易埋伏阻生
- E. 无需早期拔除，等恒牙完全替换后再处理

10、与伸舌习惯无关的错是

- A. 前牙梭形开
- B. 前后牙广泛开
- C. 前牙圆形开
- D. 下颌前突伴下前牙间隙
- E. 双颌前突伴前牙间隙

11、颅底平面又称 Bolton 平面是指

- A. 鼻根点到 Bolton 点连线
- B. 眶下点到 Bolton 点连线
- C. 耳点到眶下点连线
- D. 耳点到 Bolton 点连线
- E. Bolton 点到前鼻棘点连线

12、以下属于局部活动矫治器的功能部分为

- A. 邻间钩
- B. 卡环
- C. 头帽
- D. 双曲舌簧
- E. 以上都不对

13、以下不属于自然保持范畴的是

- A. 依靠肌功能保持

- B. 依靠咬合关系保持
- C. 依靠健康的牙周组织保持
- D. 依靠拔牙保持
- E. 依靠功能性矫治器保持

14、以下与错复发无关的因素是

- A. 肌动力平衡未建立
- B. 牙周纤维张力平衡未建立
- C. 平衡未建立
- D. 口腔不良习惯未破除
- E. 错矫治疗程过短

15、关于下颌骨生长特点，说法正确的是

- A. 下颌骨生长主要靠髁突软骨成骨和骨表面增生
- B. 下颌体、升支、下颌角都发生改变
- C. 下颌角从出生到成人其角度减小
- D. 下颌角从成人到老年其角度增大
- E. 以上说法全对

16、在替牙期往往要充分利用替牙间隙(lee-way space)，它是

- A. 在乳牙列上、下颌之间(C、D、E)牙冠近远中宽度总和之差
- B. 上颌或下颌的乳牙(C、D、E)和后继恒牙(3、4、5)之间近远中宽度

总和之差

C. 乳牙列前牙部分，上、下颌间牙间隙总和之差

D. E 之颌间间隙

E. 中性时上、下颌恒切牙的前后的距离

17、在人类进化过程中，咀嚼器官的退化缩小，不平衡表现为

A. 牙槽、颌骨的退化缩小速度快于牙齿

B. 牙槽、颌骨的退化缩小速度慢于牙齿

C. 牙槽的退化、缩小速度快于牙齿和颌骨

D. 颌骨的退化、缩小速度快于牙齿和颌骨

E. 三者退化缩小的速度一致

18、序列拔牙适用于

A. 乳牙期

B. 替牙期

C. 恒牙期

D. 恒牙早期

E. 各期均适用

19、颅部生长发育完成后，面部生长发育按以下顺序完成

A. 宽度、长度、深度

B. 长度、宽度、深度

- C. 深度、长度、宽度
- D. 宽度、深度、长度
- E. 深度、宽度、长度

20、关于错畸形的危害性说法，不正确的是

- A. 前牙反会影响上颌骨发育
- B. 拥挤不齐的牙齿好发龋病、牙周病
- C. 前牙开会影响发音
- D. 后牙锁会影响咀嚼功能
- E. 错畸形与心理发育没有关系

21、临床常用的保持器为

- A. Hawley 保持器
- B. 牙齿正位器
- C. 功能性矫治器
- D. 改良 Hawley 保持器
- E. 粘固式固定保持器

22、完全近中是指

- A. 上颌第一恒磨牙近中颊尖咬合于下颌第一恒磨牙近中颊沟
- B. 上颌第一恒磨牙近中颊尖咬合于下颌第一恒磨牙近中颊尖
- C. 上颌第一恒磨牙近中颊尖咬合于下颌第一恒磨牙远中颊尖

- D. 上颌第一恒磨牙近中颊尖咬合于下颌第一、第二恒磨牙之间
- E. 上颌第一恒磨牙远中颊尖咬合于下颌第一恒磨牙近中颊沟

23、某男性患者，55 岁，上颌左侧牙列缺损，缺失，余留牙情况尚好，采用活动义齿修复时卡环最好设计在

- A. 上
- B. 上
- C. 上
- D. 上
- E. 上

24、某女性患者，55 岁，下颌牙列缺损，缺失，向近中倾斜 20° 角，向远中倾斜 10° 角，基牙牙冠形态正常，设计时应将模型

- A. 向近中倾斜 15° 角
- B. 向远中倾斜 15° 角
- C. 向近中倾斜 5° 角
- D. 向远中倾斜 5° 角
- E. 向远中倾斜 10° 角

25、某男性患者，44 岁，上颌牙列缺损，全口中度牙周炎，因牙周炎松动拔除后 3 个月，I 度松动，牙槽骨吸收至根尖 $1/2$ ，下前牙咬至上腭黏膜，以下设计较为合理的是

- A. 磨除下前牙切端 2mm，留出修复间隙，活动义齿修复
- B. 活动义齿修复，调磨下前牙高度，并在义齿上前牙腭侧使用金属基托
- C. 在活动义齿磨牙区制作垫
- D. 拔除下前牙后，上、下前牙固定义齿修复
- E. 烤瓷固定桥修复

26、某女性患者，61 岁，缺失，余留牙正常，设计为混合支持式可摘局部义齿，以下设计项目中哪项是不正确的

- A. 上设计回力卡环
- B. 上设计间接固位体
- C. 游离鞍基腭侧为金属基托
- D. 游离鞍基颊侧和远中设计成网状支架和塑料基托
- E. 两侧鞍基通过前腭杆和侧腭杆连接

27、某男性患者，43 岁，缺失，前牙Ⅲ度深覆，若采用可摘局部义齿修复，以下设计最好的是

- A. 前牙区铸造金属基托
- B. 前牙区塑料基托
- C. 采用后腭杆
- D. 采用侧腭杆
- E. 采用前腭杆

28、某女性患者，64 岁，缺失，余留牙正常，设计混合支持式可摘局部义齿时，在牙弓对侧设置的间接固位体一般不少于

- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个
- E. 5 个

29、某男性患者，61 岁，缺失，制作可摘局部义齿时，应采用何种印模

- A. 闭口印模
- B. 解剖式印模
- C. 水胶体一次印模
- D. 压力式印模
- E. 非压力印模

30、某女性患者，57 岁，下颌右侧牙列缺损，缺失，基牙正常，设计局部义齿时，应将模型

- A. 向左侧近中倾斜
- B. 向右侧近中倾斜
- C. 向左侧远中倾斜

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/188114125075006036>