

2024 年广东省《执业药师之西药学专业二》 考试必刷 200 题完整题库（夺冠系列）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，男，56 岁，有高血压病史 4 年。体检：血压 156 / 96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利控制血压。

- A: 氨氯地平
- B: 吲达帕胺
- C: 缬沙坦
- D: 美托洛尔

答案：C

2. 下列药物属于高选择性非肽类血小板膜糖蛋白 IIb/IIIa 受体阻断剂的是

- A: 替罗非班
- B: 双嘧达莫
- C: 硫酸亚铁
- D: 阿司匹林

答案：A

3. 属于抑酸药的是()

- A: 胃蛋白酶
- B: 莫沙必利
- C: 胶体果胶铋
- D: 奥美拉唑

答案：D

4. 甲状腺危象宜选用

- A: 硫脲类+大剂量碘
- B: 甲状腺片
- C: 普萘洛尔
- D: 硫脲类

答案：A

5. 大剂量静脉给药时，可能出现可逆性黄疸的抗生素是()

- A: 利奈唑胺
- B: 小檗碱
- C: 夫西地酸
- D: 磷霉素

答案：C

6. 连续使用应间隔 4h 以上

- A: 羟甲唑啉
- B: 赛洛唑啉
- C: 麻黄碱
- D: 酚甘油滴耳液

答案：A

7. 变异型心绞痛宜选用

- A: 硝苯地平
- B: 维拉帕米
- C: 普萘洛尔
- D: 地尔硫

答案：A

8. 可增加维生素 B6 经肾排出量的药物是

- A: 红霉素
- B: 吡嗪酰胺
- C: 异烟肼
- D: 乙胺丁醇

答案：C

9. 下述保肝药中属于解毒类的是()

- A: 硫普罗宁
- B: 复方甘草酸苷
- C: 甘草酸二铵
- D: 多烯磷脂酰胆碱

答案：A

10. 第 3 代二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂是

- A: 氯吡格雷
- B: 噻氯匹定
- C: 替格雷洛
- D: 替罗非班

答案：C

11. 不易发生耐药株，是目前治疗原虫和厌氧菌的重要药物是

- A: 呋喃妥因
- B: 克林霉素
- C: 甲硝唑
- D: 多黏菌素

答案：C

12. 因是前药，需在肝内转化后生效，严重肝功能不全者不宜选用的糖皮质激素是

- A: 氢化可的松
- B: 泼尼松龙
- C: 泼尼松
- D: 甲泼尼龙

答案：C

13. 关于维生素的使用，正确的是

- A: 大量应用维生素 E 可致血清胆固醇及三酰甘油降低
- B: 长期服用维生素 C 应随访监测暗适应试验
- C: 维生素 C 以空腹服用为宜
- D: 肌肉注射维生素 B1 需做皮肤敏感试验，静脉注射不需要

答案：C

14. 没有成瘾性，兼有中枢和外周镇咳作用的药品是()。

- A: 苯丙哌林
- B: 氯化铵
- C: 可待因
- D: 右美沙芬

答案：A

15. 通过与敏感真菌细胞膜上的甾醇（主要为麦角固醇）相结合，引起细胞膜的通透性改变，导致细胞内重要物质如钾离子、核苷酸和氨基酸等外漏，从而破坏细胞的正常代谢抑制其生长的是

- A: 伊曲康唑
- B: 两性霉素

C: 氟胞嘧啶

D: 万古霉素

答案: B

16. 以下关于奥利司他使用的叙述，错误的是

A: 药效在给药后 24~48 小时即可显现，停止治疗后 48~72 小时恢复

B: 应在餐时或餐后 1 小时内服用，如有一餐未进或食物中不含脂肪，可省略一次服药

C: 体重指数为 23 的人可使用

D: 脂溶性维生素应在服用本品 2 小时后或在睡前服用

答案: C

17. 西咪替丁的作用原理是()

A: 阻断 β 受体

B: 阻断 H

C: 阻断 α 受体

D: 阻断 H

答案: D

18. (2021 年真题) 促进尿酸排泄的抗痛风药物是 ()

A: 秋水仙碱

B: 双氯芬酸

C: 苯溴马隆

D: 双醋瑞因

答案: C

19. 治疗血吸虫病宜选用

A: 氯喹

B: 吡嗪酮

C: 甲苯咪唑

D: 甲硝唑

答案：B

20. 下列描述正确的是()

A: 根据病变部位不同选择不同浓度和强度的药物

B: 有刺激性的药物应从高浓度开始逐渐递减

C: 手掌损害应选择低效的制剂

D: 外用药经皮吸收后不会产生不良反应

答案：A

21. 对四环素不敏感的病原体是()

A: 肺炎支原体

B: 铜绿假单胞菌

C: 螺旋体

D: 肺炎衣原体

答案：B

22. 用于抗艾滋病病毒的药物是

A: 阿昔洛韦

B: 利巴韦林

C: 拉米夫定

D: 更昔洛韦

答案：C

23. (2018 年真题) 碳酸钙用于肾衰竭患者降低血磷时, 适宜的服药时间是()

- A: 餐中
- B: 清晨或睡前
- C: 餐前即刻
- D: 餐后 2h

答案：A

24. 患者，男，24 岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素

- A: 心肝肾功能严重障碍者
- B: 慢性胃炎
- C: 妊娠期妇女
- D: 骨髓功能抑制者

答案：B

25. 可引起血压下降、缩瞳、欣快感的受体是

- A: K 受体
- B: $\mu 2$ 受体
- C: δ 受体
- D: $\mu 1$ 受体

答案：C

26. (2019 年真题) 对磺胺类药物有严重过敏史的患者应避免使用的药物是 ()

- A: 特拉唑嗪
- B: 十一酸睾酮
- C: 西地那非
- D: 坦洛新

答案：D

27. 糖皮质激素的药理作用不包括

- A: 免疫抑制
- B: 抗休克
- C: 抗炎
- D: 抗病毒

答案：D

28. 下述不属于抗病毒药物禁忌证的是()

- A: 严重中性粒细胞减少者禁用更昔洛韦
- B: 相应药物过敏者禁用
- C: 妊娠期妇女禁用利巴韦林
- D: 糖尿病、高血压患者禁用

答案：D

29. 利多卡因

- A: 为窄谱抗心律失常药，仅用于室性心律失常
- B: 可治疗房性期前收缩
- C: 可治疗阵发性室上性心动过速
- D: 可用于房颤的复律治疗和复律后的维持

答案：A

30. 下列关于奥沙利铂的描述，错误的是

- A: 应给予预防性或治疗性的止吐用药
- B: 遇冷可加重奥沙利铂的神经毒性
- C: 与氯化钠和碱性溶液（特别是氟尿嘧啶）之间存在配伍禁忌
- D: 其神经系统毒性与剂量大小无关

答案：D

31. 柔红霉素可能与()存在交叉耐药性。

- A: 阿糖胞苷
- B: 多柔比星
- C: 甲氨蝶呤
- D: 环磷酰胺

答案：B

32. 在胃黏膜表面形成屏障的药物是

- A: 谷丙胺
- B: 法莫替丁
- C: 枸橼酸铋钾
- D: 奥美拉唑

答案：C

33. 可用于治疗老年骨质疏松，属于维生素 D 代谢产物的是

- A: 葡萄糖酸钙
- B: 瑞格列奈
- C: 骨化三醇
- D: 利拉鲁肽

答案：C

34. ACEI 与()联用，除可增强降压效果外，还可减少后者引起的高肾素血症以及对血尿酸及血糖的不良影响。

- A: β 受体阻断剂
- B: 人促红素
- C: 留钾利尿剂
- D: 噻嗪类利尿剂

答案：D

35. (2021 年真题) 乙内酰胺类药通过减少钠离子内流而使神经细胞稳定，限制 Na^+ 通道介导的发作性放电的扩散，属于该类的抗癫痫药物是 ()

- A: 左乙拉西坦
- B: 卡马西平
- C: 苯妥英钠
- D: 加巴喷丁

答案：C

36. 患者，女，63 岁，因心绞痛急诊就医，诊断为 ST 段抬高心肌梗死，血压 175/95mmHg，心率 110 次/分，该患者适使用的药物是

- A: 硝普钠
- B: 氨氯地平
- C: 美托洛尔
- D: 贝那普利

答案：C

37. 碳酸钙用于肾衰竭患者降低血磷时，适宜的服药时间是 ()

- A: 餐中
- B: 餐后 2h
- C: 清晨或睡前
- D: 餐前即刻

答案：A

38. 下列不属于肽类抗生素的是

- A: 利奈唑胺

B: 多黏菌素 B

C: 万古霉素

D: 去甲万古霉素

答案: A

39. 脂溶性较高，起效快，属于巴比妥类的镇静催眠药是()。

A: 地西泮

B: 阿普唑仑

C: 佐匹克隆

D: 异戊巴比妥

答案: D

40. 口服吸收少，用于肠道感染的是

A: 磺胺嘧啶

B: 氧氟沙星

C: 甲氧苄啶

D: 呋喃唑酮

答案: D

41. 关于镇咳药作用强度的比较，正确的是

A: 喷托维林>苯丙哌林>可待因

B: 苯丙哌林>可待因>喷托维林

C: 可待因>苯丙哌林>喷托维林

D: 苯丙哌林>喷托维林>可待因

答案: B

42. 静脉溶栓首选的药物是

A: 维生素 K

B: 达比加群酯

C: 阿替普酶

D: 重组人促红素

答案：C

43. 应用磺酰脲类降糖药治疗 5 年，患者发生继发性失效的比例是

A: 1%~5%

B: 5%~15%

C: 30%~40%

D: 50%~60%

答案：C

44. 糖尿病合并发热、感染者可选用()

A: 格列吡嗪

B: 胰岛素

C: 格列齐特

D: 格列喹酮

答案：B

45. (2019 年真题) 患者，女，52 岁，因“闭经 1 年，潮热、情绪波动、严重失眠半年”就诊，临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为：戊酸雌二醇片，每日 1 次，每次 1mg，醋酸甲羟孕酮片，每日 1 次，每次 2mg。

A: 体重增加

B: 突破性出血

C: 白带增多

D: 乳房触痛或增大

答案：B

46. 骨髓抑制较严重的是

- A: 亚叶酸钙
- B: 顺铂
- C: 卡铂
- D: 奥沙利铂

答案：C

47. 下列关于胺碘酮的描述，错误的是

- A: 是广谱抗心律失常药
- B: 在肝中代谢
- C: 主要经肾脏排泄
- D: 脂溶性高，口服、静脉注射均可

答案：C

48. 可抑制胃酸分泌，升高胃及十二指肠内 pH，防止胰酶失活的是

- A: 胃蛋白酶
- B: 碳酸氢钠
- C: 雷尼替丁
- D: 乳酸菌素

答案：C

49. 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：
二甲双胍片口服 500mg，bid；阿卡波糖片口服 50mg，tid。

- A: 餐后半小时
- B: 餐前 1 分钟
- C: 餐前 2 小时
- D: 餐后 1 小时

答案：B

50. 属于第四代喹诺酮类药物的是

- A: 吡哌酸
- B: 萘啶酸
- C: 莫西沙星
- D: 诺氟沙星

答案：C

51. 患者，男，35 岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

- A: 进食可促进铁剂的吸收
- B: 铁剂不应与浓茶同服，浓茶含有的鞣酸可与铁形成沉淀，使铁剂的吸收减少
- C: 治疗期间应定期检查血象和血清铁水平
- D: 宜在餐后或餐时服用

答案：A

52. 关于奥司他韦作用特点的说法，错误的是()

- A: 应严格掌握奥司他韦适应证，不能用于流感的预防
- B: 1 岁以上儿童可以使用奥司他韦
- C: 治疗流感时，首次使用奥同他韦应当在流感症状出现后的 48 小时以内
- D: 奥司他韦可用于甲型和乙型流感的治疗

答案：A

53. 特比萘芬属于

- A: 唑类

- B: 吗啉类
- C: 丙烯胺类
- D: 抗生素类

答案：C

54. 由于分子结构上的差异，导致铂类化合物的各自毒性亦有所区别典型不良反应为恶心、呕吐、肾毒性和耳毒性的是

- A: 奥沙利铂
- B: 卡铂
- C: 亚叶酸钙
- D: 顺铂

答案：D

55. 对 I 型和 II 型单纯疱疹病毒作用最强的是

- A: 阿糖腺苷
- B: 干扰素
- C: 阿昔洛韦
- D: 奥司他韦

答案：C

56. 抑制叶酸合成的抗癌药物是

- A: 环磷酰胺
- B: 阿糖胞苷
- C: 顺铂
- D: 甲氨蝶呤

答案：D

57. 用药过程中需要监护甲状腺功能的是()

- A: 胺碘酮
- B: 硝普钠
- C: 氯沙坦
- D: 哌唑嗪

答案：A

58. 无孕激素活性具有抗着床作用的避孕药是

- A: 戈那瑞林
- B: 绒促性素
- C: 双炔失碳酯
- D: 溴隐亭

答案：C

59. 良性前列腺增生药物治疗的短期目标是

- A: 缓解患者的下尿路症状
- B: 缓解患者的上尿路症状
- C: 延缓疾病临床进展
- D: 预防急性尿潴留

答案：A

60. 伊伐布雷定发挥作用特异性针对

- A: 心房传导
- B: 房室传导
- C: 心室传导
- D: 窦房结

答案：D

61. 治疗流行性细菌性脑膜炎最合适的联合用药是()

- A: 青霉素+链霉素
- B: 青霉素+克林霉素
- C: 青霉素+磺胺嘧啶
- D: 青霉素+四环素

答案：C

62. 为了保护亚胺培南，防止其在肾中破坏，应与其配伍的药物是()

- A: 舒巴坦
- B: 克拉维酸
- C: 西司他丁
- D: 他唑巴坦

答案：C

63. 羟基脲选择性作用于肿瘤细胞

- A: G0 期
- B: S 期
- C: M 期
- D: G1 期

答案：B

64. 甲亢术前准备的正确给药方法是()

- A: 先给硫脲类，术前 2 周再给碘化物
- B: 只给硫脲类
- C: 只给碘化物
- D: 先给碘化物，术前 2 周再给硫脲类

答案：A

65. 防止急性深静脉血栓形成的药物是

- A: 维生素 B12
- B: 香豆素类
- C: 达肝素钠
- D: 维生素 K1

答案：C

66. 可拮抗维生素 B6 或增加维生素 B6 经肾脏排泄，引起贫血或周围神经炎的是

- A: 雌激素
- B: 异烟肼
- C: 糖皮质激素
- D: 丙磺舒

答案：B

67. (2019 年真题) 服用异烟肼进行抗结核治疗的患者，为预防周围神经炎，应补充的维生素是 ()

- A: 维生素 A
- B: 维生素 B2
- C: 维生素
- D: 维生素 B6

答案：D

68. 用于血氨升高所致的精神症状的治疗的是

- A: 赖氨酸
- B: 复方氨基酸注射液 (18AA)
- C: 复方氨基酸注射液 (3AA)
- D: 精氨酸

答案：D

69. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次/日。

- A: 可作为术后预防呕吐的常规用药
- B: 对化疗所致的呕吐有效
- C: 无心脏不良反应
- D: 对泌乳素的分泌无影响

答案：D

70. 推荐与吸入性糖皮质激素联合使用，尤其适合于中、重度持续哮喘患者长期治疗的药物是

- A: 磷酸二酯酶抑制剂
- B: 白三烯受体阻断剂
- C: M 胆碱受体阻断剂
- D: 长效 B₂ 受体激动剂

答案：D

71. 对滴虫、阿米巴和兰氏贾第鞭毛虫等原虫，以及脆弱拟杆菌等厌氧菌具有强大抗菌活性，为治疗阴道滴虫病的首选药物是

- A: 甲硝唑
- B: 呋喃妥因
- C: 克林霉素
- D: 多黏菌素

答案：A

72. 对脑血管扩张作用较强的药物是()

- A: 非洛地平
- B: 硝苯地平
- C: 尼索地平
- D: 尼莫地平

答案: D

73. 对需氧革兰阴性菌具有抗菌活性，属于单酰胺类的抗菌药物是

- A: 头孢西丁
- B: 头孢吡肟
- C: 氨曲南
- D: 拉氧头孢

答案: C

74. 不作为高血压治疗的首选药，临床适用于伴前列腺增生症的高血压患者或与其他药物联合用于顽固性高血压治疗的药物是()

- A: 甲基多巴
- B: 特拉唑嗪
- C: 可乐定
- D: 肾素抑制剂

答案: B

75. 主要治疗双相情感障碍躁狂发作，宜选用的药物是

- A: 氯氮平
- B: 阿立哌唑
- C: 碳酸锂
- D: 利培酮

答案: D

76. 非选择性的钙拮抗剂是

- A: 硝苯地平
- B: 地尔硫卓
- C: 维拉帕米
- D: 氟桂利嗪

答案：D

77. 作用强而持久，不仅对子宫底，而且对子宫颈部都有很强的收缩作用，剂量稍大即产生强直性收缩，不适用于催产或引产，主要用于产后子宫出血或子宫复原不佳的是

- A: 普拉睾酮
- B: 麦角新碱
- C: 缩宫素
- D: 地诺前列酮

答案：B

78. 与促皮质激素合用，能促进尿钾排泄，降低钾盐疗效的是

- A: 氯化钠
- B: 氯化钙
- C: 氯化钾
- D: 枸橼酸钾

答案：C

79. 下列硝酸酯类药物起效最快的是

- A: 戊四醇酯
- B: 单硝酸异山梨酯
- C: 硝酸甘油

D: 硝酸异山梨酯

答案：C

80. 索他洛尔最严重的不良反应是

A: 心动过缓

B: 尖端扭转型室速

C: 头晕

D: 呼吸困难

答案：B

81. 对于高胆固醇血症造成高危心肌梗死的患者，作为一线治疗药物应选择()

A: 非诺贝特

B: 洛伐他汀

C: 烟酸

D: 阿昔莫司

答案：B

82. 属于抑制疟原虫的二氢叶酸还原酶，阻碍核酸合成的抗疟药物是

A: 奎宁

B: 乙胺嘧啶

C: 吡喹酮

D: 青蒿素

答案：B

83. 治疗细菌性结膜炎宜选用

A: 复方托吡卡胺滴眼液

B: 碘苷滴眼液

C: 左氧氟沙星滴眼液

D: 毛果芸香碱滴眼液

答案：C

84. 厌氧菌引起的肺炎宜选用()

A: 氟康唑

B: 克林霉素

C: 万古霉素

D: 阿奇霉素

答案：B

85. 患者，男，38 岁。因“发作性喘息”3 个月入院，发作时憋喘、全身大汗、端坐不能平卧，肺部可闻及哮鸣音。诊断为支气管哮喘，静脉滴注地塞米松。

A: 异丙托溴铵

B: 特布他林

C: 氨茶碱

D: 氟替卡松

答案：D

86. 止泻药()

A: 硫酸镁

B: 甘油

C: 乳果糖

D: 地芬诺酯

答案：D

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

87. 以下有关 ACEI 药物治疗高血压的监护叙述中，不正确的是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/188126134045007022>