专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年河北省正定县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷200题完整版及答案【最新】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.在脑卒中各亚型中发病率最高的疾病为（）

A：脑梗死

B：原发性蛛网膜下腔出血

C：缺血性脑卒中

D：脑出血

答案：C

2.鼻窦炎的急性期应尽早采用足量的何种药物治疗

A：抗过敏药

B：局部血管收缩剂

C：解热镇痛药

D：抗菌药

答案：D

3.下列物质口服中毒后，解救时不宜洗胃的是

A：汽油

B：砒霜

C：乐果

D：重金属

答案：A

4.不宜与葡萄柚汁合用的药物是

A：硫酸亚铁

B：磺胺类药物

C：左旋多巴

D：辛伐他汀

答案：D

5.（2016年真题）医师书写处方时经常使用外文缩写，药师在指导用药时需要准确掌握和解释

A：适量

B：右眼

C：立即

D：左眼

答案：B

6.在治疗痛风时，应用排尿酸药的过程中应多饮水，一日尿量宜保持在

A：1000ml以上

B：500ml以上

C：2000ml以上

D：1500ml以上

答案：C

7.患者，男，53岁。因心前区疼痛6年，加重伴呼吸困难10小时入院。入院前6年感心前区疼痛，痛系膨胀性或压迫感，多于劳累、饭后发作，每次持续3～5min，休息后减轻。入院检查：体温37.8℃，心率130次/分，血压80/40mmHg。呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻有湿鸣音，心界向左扩大，心音弱，入院诊断为冠心病。

A: 非ST段抬高型心肌梗死

B: 冠状动脉粥样硬化型心脏病

C: 无症状型心肌缺血型

D: 稳定型心绞痛

答案：A

8.无特殊的解救药，应用利尿剂促进排泄的药物是()。

A: 乙酰胺

B: 阿托品

C: 毒扁豆碱

D: 卡马西平

答案：D

9.对痛风急性发作者不宜服用，以防发生转移性痛风的是

A: 秋水仙碱

B: 苯溴马隆

C: 泼尼松

D: 别嘌醇

答案：B

10.患者女性，40岁，既往有风湿性心脏病史，近2年来出现劳力性呼吸困难，1天前因受凉出现发热、咳嗽，咳痰、咯血，头晕、心悸，不能平卧，查体：半卧位，口唇发绀，肺部湿性啰音。心脏体征：肺动脉瓣听诊区第二心音亢进及舒张期奔马律。

A: 急性左心衰竭

B: 支气管哮喘

C: 大叶性肺炎

D: 急性心肌炎

答案：A

11.发热（发烧）指人体体温升高，超过正常范围，主要表现是体温升高、脉搏加快。按体温状况，发热分为低热、中等度热、高热、超高热。中等度热是指体温范围

A：39.1℃～41.0℃

B：38.1℃～39.0℃

C：37.0℃～38.3℃

D：37.4℃～38.0℃

答案：B

12.（2018年真题）患者,女,45岁,6个月前因出现口吐白沫、意识变更、二便失禁,在专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗,症状控制较好,近3个月服用西咪替丁,患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱,该患者各地求医,服用各种药物,具体药物品种不详。围绕该病例,医师、药师、护士对抗癫痫药的安全用药和用药事项进行用药讨论。

A：遵从联合治疗原则

B：长期规律用药

C：定期监测肝功能

D：有条件的应测定药物血液浓度

答案：A

13.下列情况的首选药物是高TC血症（）

A：弹性酶

B：贝特类

C：他汀类

D：胆酸螯合剂+贝特类

答案：C

14.在药物经济学研究方法中，可以为总体医疗费用的控制和医疗资源优化配置提供基本信息的是

A: 最小成本分析

B: 最大效果分析

C: 成本-效用分析

D: 成本-效益分析

答案：A

15.公众用药咨询的内容是

A: 不宜选用氯化钠注射液溶解的药品

B: 栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法

C: 抗菌药物的合理使用

D: 减肥、补钙、补充营养素

答案：D

16.医学检查发现柏油样黑便并有光泽，通常见于

A: 胃溃疡

B: 痔疮

C: 肛裂

D: 直肠息肉

答案：A

17.塞来昔布在体内代谢的主要肝药酶是

A: CYP1A2

B: CYP2C8

C: CYP2C9

D: CYP2C19

答案：C

18.甲状腺危象应选用的药物是

A：格列本脲

B：胰岛素

C：二甲双胍

D：大剂量碘剂

答案：D

19.患者，女，8岁，体重22kg，因出现咳嗽、呼吸困难急诊就诊，症状在2天内逐步加重。出现这些症状前，先出现病毒性上呼吸道感染的症状（咽喉痛、流涕和咳嗽）3天。在过去的2年，患者有过几次急性支气管炎发作，并在3个月前因肺炎住院。患者目前未接受任何药物治疗。查体：中度呼吸窘迫伴呼气喘鸣音，偶尔咳嗽，呼气相延长，胸部过度膨胀，胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙凹陷。听诊时可闻及双侧吸气和呼气喘鸣声，左侧呼吸音减弱。呼吸30次／分、血压110／83mmHg、心率130次／分、体温37.8℃，动脉血气分析血氧饱和度（SaO2）90％。

A：沙丁胺醇静脉注射

B：茶碱片

C：雾化沙丁胺醇

D：孟鲁司特咀嚼片

答案：C

20.适用于阿司匹林哮喘伴有过敏性鼻炎的预防和维持治疗的药物是

A：茶碱片

B：异丙托溴铵气雾剂

C：沙丁胺醇气雾剂

D: 孟鲁司特钠咀嚼片

答案：D

21.下列药物中属于溶栓药物的是（）

A: 利伐沙班

B: 血凝酶

C: 华法林

D: 阿替普酶

答案：D

22.稳定型心绞痛发作时应选用的治疗药物是（）

A: 氟伐他汀

B: 硝酸甘油

C: 美托洛尔

D: 阿司匹林

答案：B

23.可待因属于兴奋剂中的

A: 麻醉药品

B: β 受体阻断剂

C: 精神刺激剂

D: 利尿剂

答案：A

24.患者，女，35岁，部分发作性癫痫病史12年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6个月前因癫痫病情控制不佳，提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊。患者同时患有2型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素B。

A：丙戊酸钠

B：卡马西平

C：左乙拉西坦

D：阿卡波糖

答案：B

25.合并闭角型青光眼的前列腺增生患者不宜选用的药物是()

A：多沙唑嗪

B：托特罗定

C：坦索罗辛

D：非那雄胺

答案：B

26.开具新药或增加药物前需考虑患者的总体情况和药物相互作用，是倡导开处方环节的

A：修订医嘱及时沟通

B：医嘱完整不漏项

C：医嘱清楚准确

D：实现个体化治疗

答案：D

27.“控制被经济利益所驱动的过度药物治疗”体现选择治疗药物的

A：有效性

B：方便性

C：安全性

D：经济性

答案：D

28.以下的论述哪项是错误的

A: 硝普钠可用于高血压危象和慢性心功能不全

B: 氢氯噻嗪作为基础降压药可单用于轻度高血压，也可与其他降压药合用，提高疗效，减少不良反应

C: 普萘洛尔不可抑制肾素的分泌

D: 氢氯噻嗪不可与普萘洛尔合用于治疗高血压

答案：D

29.普通处方一般不得超过几日用量

A: 3

B: 1

C: 5

D: 7

答案：D

30.以下"准备调配处方标签"事宜中，最重要的是

A: 用法用量规范

B: 不能只依赖药品说明书

C: 语言通俗易懂

D: 依据患者情况加贴个体化用药方法

答案：D

31.影响维生素B12吸收的药物是

A: 甲氨蝶呤

B: 苯巴比妥

C: 苯妥英钠

D: 二甲双胍

答案：D

32.(抗高血压药物的不良反应)，服用维拉帕米可能引起

A: 房室传导阻滞

B: 直立性低血压

C: 免疫失调

D: 多毛症

答案：A

33.即使某些眼疾患者适宜应用抗菌药物/糖皮质激素眼用制剂。连续应用时间也不宜超过

A: 7天

B: 3天

C: 10天

D: 5天

答案：C

34.（2018年真题）干眼症可选用（）

A: 色甘酸钠滴眼液

B: 玻璃酸钠滴眼液

C: 七叶洋地黄双苷滴眼液

D: 氧氟沙星滴眼液

答案：B

35.在治疗痛风时，应用排尿酸药过程中，应多饮水，一日尿量宜保持在

A: 2000ml以上

B: 500ml 以上

C: 1000ml 以上

D: 1500ml 以上

答案：A

36.亚硝酸盐中毒解救药物

A: 氯磷定

B: 亚甲蓝

C: 纳洛酮

D: 青霉胺

答案：B

37.适用于有完整子宫，仍希望有月经样出血的妇女

A: 雌孕激素连续联合用药

B: 单纯雌激素补充治疗

C: 雌孕激素序贯用药

D: 单纯孕激素补充治疗

答案：C

38.可用于氰化物中毒的药物是

A: 乙酰胺

B: 亚硝酸钠

C: 维生素 K1

D: 碘解磷定

答案：B

39.西咪替丁可引起的典型不良反应是

A: 血糖升高

B：高钾血症

C：低镁血症

D：定向力障碍、意识混乱

答案：D

40.氟马西尼用于解救的是（）

A：有机磷中毒

B：汞中毒

C：三唑仑中毒

D：氰化物中毒

答案：C

41.药品质量缺陷，包括

A：药品名称形似

B：须冷藏药品

C：片剂药品受潮裂片

D：药品名称音似

答案：C

42.用药错误A级（1级）的标准

A：患者已使用，但未造成伤害

B：客观环境或条件可能引发差错

C：发生差错但未发给患者，或已发给患者但未使用

D：差错造成患者暂时性伤害，需要采取预防措施

答案：B

43.用药期间粪便呈橘红至红色的药物是

A：利福平

B：硫酸钡

C：水杨酸钠

D：氢氧化铝制剂

答案：A

44.巴比妥类使口服避孕药效果降低属于()。

A：酶诱导作用

B：与血浆蛋白结合

C：作用于同一受体的拮抗作用

D：排泄

答案：A

45.高血压合并心肌梗死首选（）

A：氢氯噻嗪

B：硫酸镁

C：特拉唑嗪

D：卡托普利

答案：D

46.切忌直接静脉注射，应于临用前稀释，否则不仅会引起剧痛，且可致心脏停搏的药物是

A：青霉素

B：氯化钾

C：头孢曲松钠

D：两性霉素B

答案：B

47.淡黄色处方作为

A：急诊处方

B：普通处方

C：儿科处方

D：麻醉药品和第一类精神药品处方

答案：A

48.规范处方行为与操作流程，归属

A：科学发展

B：管理规范到位

C：知识培训

D：环境与流程的优化与持续改进

答案：B

49.患者，男性，72岁，患有前列腺增生症，常出现尿频、排尿困难，排尿后尿不尽、残余尿增多现象。诊断为充盈性尿失禁，给予阿夫唑嗪治疗。药师应告知患者药物的主要不良反应是

A：直立性低血压

B：鼻咽炎和尿路感染

C：口干、便秘、尿潴留

D：卧位和坐位时高血压

答案：A

50.正常剂量氯化钾的妊娠毒性分级是()

A：A级

B：X级

C：B级

D：C级

答案：A

51.患者，女，5岁，体重25kg。两天前受凉后发热，最高体温38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

A: 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分对乙酰氨基酚，应避免重复用药

B: 酚麻美敏口服液与盐酸麻黄碱滴鼻液含有相同成分，应避免重复用药

C: 酚麻美敏口服液与对乙酰氨基酚混悬滴剂都含有对乙酰氨基酚，应避免重复用药

D: 酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分氯苯那敏，应避免重复用药

答案：B

52.医师用药咨询的内容是

A: 减肥、补钙、补充营养素

B: 抗菌药物的合理使用

C: 一种药品有多种适应证或用药剂量范围较大

D: 栓剂、滴眼剂和气雾剂等外用剂型的正确使用方法

答案：B

53.（2021年真题）两性霉素B用0．9%氯化钠注射液溶解，可导致（）

A: 溶液变色

B: 产生胶状不溶物

C: 产生气体

D: 微浑浊或沉淀

答案：D

54.患者，男，28岁，2天前因淋雨后出现发热，体温最高达39℃，经实验室和胸片检查，临床诊断为社区获得性肺炎，无其他基础疾病，可首选的抗菌药物是

A: 头胞哌酮舒巴坦

B: 头孢拉定

C: 亚胺培南西司他汀

D: 阿米卡星

答案：B

55.急迫性尿失禁首选哪种药物

A: 非甾体抗炎药

B: 钙通道阻滞剂

C: 选择性a1受体激动药

D: 抗胆碱能药物

答案：D

56.男性，45岁。反复发生夜间呼吸困难1个月，加重一天就诊，体格检查：血压180/110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率130次/分。

A: 肺心病还是冠心病

B: 慢性支气管炎还是急性支气管炎

C: 支气管哮喘还是心源性哮喘

D: 双肺炎症还是肺间质纤维化

答案：C

57.应嘱咐患者避免冷饮冷食，避免暴露于低温或接触冰冷物体以防药物不良反应加重的是

A：卡培他滨

B：奥沙利铂

C：卡铂

D：顺铂

答案：B

58.氟哌啶醇的禁用范围是

A：新生儿

B：3岁以下幼儿

C：1岁以下婴儿

D：婴幼儿

答案：D

59.由肝脏清除，但并无明显毒性反应的药物

A：必须减量应用

B：尽可能避免使用

C：须谨慎使用，必要时减量给药

D：一般无须调整剂量

答案：C

60.有机磷农药重度中毒时，血胆碱酯酶的活力下降至

A：0.7

B：70%～50%

C：50%～30%

D：30%以下

答案：D

61.患者，男，43岁，患有家族性痛风，既往有磺胺类药物过敏史为防止尿酸结晶和痛风结石的产生，药师应建议患者在服用上述药物时加服

A：别嘌醇

B：对乙酰氨基酚

C：碳酸氢钠

D：丙磺舒

答案：C

62.药师发药时提示患者“不要驾车、操作机器或高空作业等”，针对的药物是

A：氟西汀

B：卡托普利

C：铋制剂

D：氯苯那敏

答案：D

63.孕妇的急性膀胱炎治疗时间是

A：10日

B：3~7日

C：1~3日

D：3~5日

答案：B

64.为使铁剂更好的被人体吸收，宜同时应用

A：亚叶酸钙

B：维生素C

C: 硫酸亚铁

D: 叶酸+维生素B12

答案：B

65.处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件。处方按其性质分为法定处方和医师处方。《处方管理办法》还将处方分为麻醉药品处方、急诊处方、儿科处方、普通处方等。印刷用纸根据实际需要用颜色区分，并在处方右上角以文字注明。

A: 淡绿色

B: 淡红色

C: 淡橙色

D: 淡黄色

答案：D

66.伴有心脏病、高血压者应慎用的药品是

A: 含伪麻黄碱的抗感冒药

B: 含右美沙芬的抗感冒药

C: 含咖啡因的抗感冒药

D: 含氯苯那敏的抗感冒药

答案：A

67.对于形似或声似的药品要加用醒目的标识，是针对药品调配环节防范措施中的

A: 保证足够的人力配备

B: 环境整齐、安静

C: 及时沟通

D: 规范操作、坚持核对

答案：B

68.患者，男，65岁，良性前列腺增生病史3年，高血压病史2年，咳嗽，咳痰10余年，伴哮喘，尤以活动后明显，因近半月咳嗽加重入院，主诉便秘，每周2次排便，长期口服硝苯地平控释片30mg/qd，血压控制良好。体格检查：体温36.6℃，P82次/分，R22次/分，端坐位，喘息貌，桶状胸，双肺叩诊过清音，散在干啰音，双肺下少许湿罗音，辅助检查：血常规WBC11.2×10

A: 氨溴索注射液

B: 异丙托溴铵溶液

C: 布地奈德混悬液

D: 硝苯地平控释片

答案：B

69.下列关于口服阿仑膦酸钠使用注意事项的说法,错误的是()

A: 食管炎为典型不良反应

B: 随餐服用,并大量饮水,可增加吸收、减少胃肠道刺激

C: 应避免同时使用两种双膦酸盐

D: 口服后30分钟内应保持立位或坐位

答案：B

70.以下所列处方书写的各项要求中，最正确的是

A: 每张处方不得超过3日用量

B: 每张处方不得合开中西药品

C: 每张处方不得超过5种药品

D: 处方中不得使用药品缩写名称

答案：C

71.因绝经期激素替代治疗应禁用的人群是

A: 合并高胆固醇血症的患者

B: 甲状腺切除后的患者

C: 6个月内有静脉血栓栓塞史的患者

D: 合并轻度高血压的患者

答案：C

72.易经乳汁分泌的药物特性是

A: 弱酸性

B: 蛋白结合率高

C: 分子量大

D: 脂溶性高

答案：D

73.患者男78岁,因心房颤动服用华法林治疗2年余。后因真菌感染使用氟康唑,用药后INR升高并出现咳血症状。出现该症状的主要原因是（）

A: 氟康唑可抑制CYP2C9,导致华法林血药浓度升高

B: 氟康唑具有较强的血浆蛋白结合力,导致血中游离的华法林浓度升高

C: 氟康唑抑制华法林的肾脏排泄,导致华法林血药浓度升高

D: 氟康唑可增加华法林的吸收,导致华法林血药浓度升高

答案：A

74.应贮存在阴凉处的药物是

A: 重组人促红细胞生成素

B: 硫酸亚铁片

C: 托烷司琼注射剂

D: 头孢拉定

答案：D

75.（2016年真题）患者到药店购买“扑尔敏片”，药师应给予（）。

A: 奥司他韦片

B: 阿昔洛韦片

C: 氯苯那敏片

D: 更昔洛韦片

答案：C

76.阿糖胞苷属于

A: 抗过敏药

B: 抗病毒药

C: 抗真菌药

D: 抗肿瘤药

答案：D

77.解救砷化合物中毒的是（）

A: 亚硝酸钠

B: 纳洛酮

C: 双复磷

D: 二巯丁二钠

答案：D

78.早期AD患者选用

A: 司来吉兰

B: 加兰他敏

C: 普拉克索

D: 金刚烷胺

答案：B

79.沟通的时间不宜过长，提供的信息不宜过多

A：认真聆听

B：关注特殊人群

C：注意掌握时间

D：注意语言的表达

答案：C

80.具有抗肿瘤作用的抗风湿药

A：塞来昔布

B：利妥昔单抗

C：甲氨蝶呤

D：布洛芬

答案：C

81.轻度支气管哮喘的临床表现不包括

A：可有焦虑

B：呼吸频率轻度增加，可闻及散在哮鸣音

C：步行或上楼时气短

D：心率增快>120次/分

答案：D

82.药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A：服用阿司匹林出现哮喘、慢性荨麻疹等

B: 口服避孕药致阿米替林的清除率下降

C: 肾病患者服用呋喃妥因可引起周围神经炎

D: 氯霉素在新生儿体内蓄积呈现灰婴综合征

答案：B

83.以下药品中，最适宜治疗沙眼和流行性急性结膜炎的是

A: 红霉素眼膏

B: 酞丁安滴眼剂

C: 硫酸锌滴眼剂

D: 色甘酸钠滴眼剂

答案：B

84.硝酸异山梨酯的别名是

A: 心痛定

B: 消心痛

C: 心得安

D: 安痛定

答案：B

85.除胰岛素分泌过多外，主要引起血糖低于正常参考区间低限的疾患是

A: 激素分泌功能亢进

B: 肝功能亢进

C: 颅内压增高、颅脑外伤

D: 激素分泌功能衰退

答案：D

86.（2019年真题）湿疹患者的实验室检查结果常会出现

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/188137054044007022