

糖尿病肾病血透患者护理查房



病例资料

现病史：患者黄秀芳，女，63岁。患者自诉入院前20余年无明显诱因出现多饮2多食，确诊为2型糖尿病：6个月前“感冒”后出现双下肢浮肿，2个月前出现乏力，并时感恶心、不欲饮食。为进一步确诊， 2014年5月1日以“多饮多食20余年，乏力、恶心2个月”收入我科。医生给予低盐低脂糖尿病优质蛋白饮食和改善肾功、控制血压血糖、纠正贫血、改善循环、纠正高甲低钙等治疗，余6月9日行血液透析治疗。

既往史：高血压、冠心病、糖尿病、动静脉内瘘术后

过敏史未发现家族史无特殊。



上课啦！！

- 你怎么称呼老师？
- 如果老师最后没有总结一节课的重点的难点，你是否会认为老师的教学方法需要改进？
- 你所经历的课堂，是讲座式还是讨论式？
- 教师的教鞭
- “不怕太阳晒，也不怕那风雨狂，只怕先生骂我笨，没有学问无颜见爹娘 ……”
- “太阳当空照，花儿对我笑，小鸟说早早早……”

检查




- T 36.8 P 85次/分 R 19次/分 Bp 142/52mmHg
- 发病以来精神睡眠食欲欠佳
- 神清、营养中等
- 肾病面容、皮肤黏膜色泽稍苍白
- 双下肢轻度浮肿
- 右前臂内瘘处4CM长手术疤痕

检查



- 2014年5月2日
- 血常规： WBC 12.0*10*9/L
  HGB 88 g/L
- 肾功能： BUN 29.1mmol/L
  CREA 894.9umol/L
- 凝血项： TT 25.3S (12—16s)
  Fib 5.02g/l



记录

2014年6月9日在心电监护

检查



2014年6月9日首次血透


透前　CREA 708.6umol/L

　　BUN　42.1mmol/L

透后　CREA 560.4umol/L

　　BUN　29.8mmol/L

1 问题



体液过多：



与肾脏不能排出





护理问题

4 焦虑及恐惧：与病情重、长期血液透析、疾病造成的形象改变及治疗的效果有关。

5 有皮肤完整性受损的危险： 与体液过多、机体抵抗力下降有关。

6 知识缺乏： 缺乏疾病及血液透析相关知识

7. 潜在并发症：低血糖、高血压脑病、急性左心衰、血液透析相关并发症等

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/195204130123011040