

2023 年执业医师资格证之临床助理医师综合检测试 卷 A 卷含答案

单选题（共 50 题）

1、初孕妇，30 岁，妊娠 40 周，规律宫缩 4h 入院，因产程不佳，给予缩宫素静脉滴注，加强宫缩，2h 后下腹疼痛难忍，孕妇烦躁不安，呼吸急促，心率 110 次 / 分，胎心率 100 次 / 分，子宫下段有明显压痛，导尿见血尿，本例最可能的诊断是

- A. 先兆子宫破裂
- B. 子宫破裂
- C. 强直性宫缩
- D. 羊水栓塞
- E. 胎盘早期剥离

【答案】 A

2、皮肤局部缺损由肉芽、瘢痕组织替代，并伴炎症细胞浸润及鳞状上皮再生，应诊断为

- A. 创伤一期愈合
- B. 皮肤慢性溃疡
- C. 皮肤溃疡伴感染
- D. 皮肤慢性溃疡、癌变
- E. 皮肤鳞状上皮癌浸

【答案】 D

3、初产妇，25 岁。宫口开全 1.5 小时，胎头已达盆底，持续性枕左横位。最恰当的处理是

- A. 缩宫素静脉滴注

- B. 等其自然回转
- C. 人工协助顺时针转动胎头 90°
- D. 人工协助逆时针转动胎头 90°
- E. 行会阴后一侧切开术

【答案】 D

4、女性，60岁，慢性咳喘18年，近3年来伴有下肢水肿，1周来咳喘加重，应用抗生素、利尿剂，疗效不显著。2日来失眠、烦躁，血气分析：pH 7.35，PaO₂ 55mmHg，PaCO₂ 74mmHg，AB 42mmol/L，血氯 80mmol/L。结合病史，可能的诊断为

- A. 代谢性酸中毒失代偿
- B. 呼吸性酸中毒失代偿
- C. 呼吸性酸中毒伴代谢性酸中毒
- D. 呼吸性酸中毒伴代谢性碱中毒
- E. 呼吸性酸中毒代偿

【答案】 D

5、女，48岁，自觉阴道口脱出肿物1年。妇科检查：宫颈及部分宫体脱出阴道口外，宫颈肥大，7点处可见溃疡。应诊为

- A. 子宫III度脱垂
- B. 子宫II度脱垂（轻度）
- C. 子宫II度脱垂（重度）
- D. 子宫I度脱垂（轻度）
- E. 子宫I度脱垂（重度）

【答案】 C

6、特发性血小板减少性紫癜

- A. 贫血和出血程度一致
- B. 贫血和出血程度不一致
- C. 有贫血而无出血
- D. 无贫血而有出血
- E. 无贫血也无出血

【答案】 A

7、导致心肌炎最主要的原因是

- A. 病毒感染
- B. 细菌感染
- C. 药物中毒
- D. 放射线照射
- E. 立克次体感染

【答案】 A

8、知识点：慢支急性感染

- A. 奈瑟球菌
- B. 甲型链球菌
- C. 流感嗜血杆菌
- D. 草绿色链球菌
- E. 金黄色葡萄球菌

【答案】 C

9、男，68岁。反复咳嗽、咳痰、气促41年。心悸、水肿5年，近1周来症状加重入院。查体：呼吸急促，双肺可闻及干湿啰音，P2亢进，三尖瓣区闻及3/6级收缩期杂音。肝右肋下4cm，压痛（+）。肝颈回流征阳性下肢水肿。此时首选的治疗是使用

- A. 强心剂
- B. 利尿剂
- C. 心血管扩张剂
- D. 抗生素
- E. 祛痰剂

【答案】 D

10、抑制胰岛素分泌和组织对葡萄糖的利用，升高血糖的是

- A. 氨苯蝶啶
- B. 呋塞米
- C. 螺内酯
- D. 氢氯噻嗪
- E. 乙酰唑胺

【答案】 D

11、患者女，39岁。腹胀、呕吐已半年，多于午后发作，吐出隔夜食物，吐量较大，吐后舒服。由于长期呕吐，除脱水外，还会造成

- A. 低氯、高钾性碱中毒
- B. 低氯、低钾性碱中毒
- C. 低氯、高钾性酸中毒

- D. 低氯、低钾性酸中毒
- E. 低氯、低钾血症

【答案】 B

12、男，44岁。因急性继发性腹膜炎入院，行非手术治疗。观察10小时，如决定手术治疗，不属于其手术适应症的是

- A. 呼吸性碱中毒
- B. 出现休克
- C. 腹痛进行性加重
- D. 腹腔积液增多
- E. 病因诊断不明

【答案】 A

13、男，80岁。右腹股沟斜疝6小时来诊，既往有可复性腹股沟肿物史30年，检查：右侧腹股沟至阴囊10cm×6cm嵌顿疝，皮肤无红肿，首选的治疗方法是

- A. 试行手法复位
- B. 手术复位并行疝囊高位结扎
- C. 手术复位
- D. 手术复位并行无张力疝修补
- E. 手法复位并行加强腹股沟管疝修补术

【答案】 A

14、下列有关同工酶的叙述正确的是

- A. 同工酶的分子结构相同

- B. 同工酶的理化性质相同
- C. 它们催化相同的化学反应
- D. 它们对同一底物有相同的 K_m 值
- E. 它们的差别是翻译后化学修饰的结果不同

【答案】 C

15、耐 β -内酰胺酶作用较强的药物是

- A. 磺胺类药
- B. 庆大霉素
- C. 异烟肼
- D. 头孢噻肟
- E. 苄星青霉素

【答案】 D

16、患者女，65岁。咳嗽、痰中带血，胸痛两个月，无明显发热。胸片发现，右下肺周边有一直径6cm的结节状阴影，首先应考虑为

- A. 肺脓肿
- B. 结核瘤
- C. 周围型肺癌
- D. 团块状矽结节
- E. 转移性肺癌

【答案】 C

17、患者，女，42岁。痛经2年并进行性加重，月经量增多，经期延长。今晨搬重物时突发下腹剧痛，伴恶心、呕吐。妇科检查于右侧附件区隐约可触及肿

物，大小边界不清。阴道后穹隆穿刺抽出 10ml 深咖啡色黏稠液体。最可能的诊断是

- A. 子宫异位妊娠破裂
- B. 子宫浆膜下肌瘤蒂扭转
- C. 盆腔肿瘤
- D. 卵巢巧克力囊肿破裂
- E. 子宫腺肌病

【答案】 D

18、确定心脏骤停后给予最基本的生命支持方法是

- A. 触摸大动脉搏动
- B. 测量血压
- C. 人工呼吸、胸外按压
- D. 非同步直流电除颤
- E. 静脉或气管内滴入肾上腺素

【答案】 C

19、男，35 岁。肛门持续性剧痛 3 天。局部有肿物突出，无便血。查体：肛门旁有直径为 1.0cm 的肿物，呈暗紫色，质硬，有触痛。最可能的诊断是

- A. 血栓性外痔
- B. 内痔脱出
- C. 肛门周围皮下脓肿
- D. 肛裂
- E. 直肠息肉

【答案】 A

20、男性，51岁，急性前壁心肌梗死，起病第二天发生心房颤动，心室率184次/分，血压84/60mmHg，气急发绀，首选的治疗措施是

- A. 静脉注射毛花苷丙
- B. 同步电除颤
- C. 静脉注射美托洛尔
- D. 静脉注射多巴酚丁胺
- E. 静注胺碘酮

【答案】 B

21、33岁女性，G0P0，平时月经规则，半年前体检发现有小子宫肌瘤。现停经8周，出现下腹隐痛，阴道少量流血5天。妇科检查子宫如孕10周，软硬不均，轻压痛，左侧附件区触及4?5cm囊性包块，壁薄，活动好，无压痛。尿妊娠试验阳性。

- A. 宫外孕
- B. 葡萄胎
- C. 卵巢巧克力囊肿
- D. 早孕合并子宫肌瘤
- E. 子宫肌瘤红色变

【答案】 D

22、女性，20岁，头昏乏力，鼻出血伴牙龈出血1周，Hb82g/L，WBC 45×10^9 /L，血小板 25×10^9 /L，骨髓增生极度活跃，原始细胞0.5，早幼粒细胞0.2，POX强阳性，NAP阴性，非特异性酯酶部分呈阳性反应，不被NAF抑制，确诊急性非淋巴细胞白血病，其FAB分型是

- A. M2
- B. M1

C. m4

D. M3

E. M5

【答案】 A

23、急性心肌梗死时，以下哪一种血清酶特异性最高

A. LDH

B. CK-MM

C. GOT

D. CK-MB

E. CPK

【答案】 D

24、老年男性患者，近2月来感头晕乏力，心悸不适来院检查，查体：贫血貌，皮肤干燥，指甲脆裂。浅表淋巴结未触及，肝脾不大。实验室检查：血红蛋白 70g/L ，网织红细胞计数 0.005 ，血片示小细胞低色素性贫血改变，血清铁 $6.2\ \mu\text{mol/L}$ ，总铁结合力 $92\ \mu\text{mol/L}$ ，粪便检查钩虫卵(+)。

A. 驱钩虫

B. 口服铁剂

C. 注射铁剂

D. 口服维生素 C

E. 进食含铁量高的饮食

【答案】 A

25、非甾体抗炎药对风湿性疾病的治疗，不正确的是

- A. 主要机制是抑制环氧化酶(COX)的活性
- B. 减少炎症介质的产生
- C. 有抗炎、镇痛作用
- D. 可以控制原发病的进展
- E. 可导致胃溃疡穿孔等严重并发症

【答案】 D

26、患者，男性，车祸伤及头部，伤后出现左侧鼻唇沟变浅，鼻出血，左耳听力下降，左外耳道流出淡血性液体。诊断首先考虑（）

- A. 颅前窝骨折
- B. 颅中窝骨折
- C. 颅后窝骨折
- D. 左颞骨骨折
- E. 脑震荡

【答案】 B

27、A 慢性支气管炎导致

- A. 阻塞性肺气肿
- B. 代偿性肺气肿
- C. 间质性肺气肿
- D. 老年性肺气肿
- E. 灶性肺气肿

【答案】 A

28、男，23岁。血尿、蛋白尿2年。查体：BP160/90mmHg，尿蛋白1.3~1.8g/d，血肌酐 $100\mu\text{mol/L}$ 。最可能的诊断是

- A. 无症状性蛋白尿和血尿
- B. 高血压肾损害
- C. 慢性肾小球肾炎
- D. 肾病综合征
- E. 慢性间质性肾炎

【答案】 C

29、初孕妇，29岁，妊娠37周。头痛1周，今晨喷射性呕吐1次。1小时前突然抽搐并随即昏迷入院。查体：血压180/120mmHg。尿蛋白(+++)。该患者最可能的诊断是

- A. 子痫
- B. 脑出血
- C. 癔症
- D. 癫痫
- E. 脑血栓形成

【答案】 A

30、下列有关蛛网膜下腔出血说法正确的是

- A. 发病突然，有剧烈头痛、恶心呕吐等症状
- B. 蛛网膜下腔出血患者不会出现精神症状
- C. 脑膜刺激征明显，常在蛛网膜下腔出血后6小时内出现
- D. 以一过性意识障碍多见，严重者呈昏迷状态，但不会出现脑疝
- E. 多数患者出血后经对症治疗后，病情仍然不稳定

【答案】 A

31、患者，女，25岁。停经3个月，阴道淋漓流血2个月，阴道前壁有胡桃大紫蓝色结节，子宫软，如孕4个月大小，尿妊娠试验阳性。应考虑为

- A. 葡萄胎
- B. 侵蚀性葡萄胎
- C. 双胎妊娠
- D. 妊娠合并子宫肌瘤
- E. 先兆流产

【答案】 B

32、肾结核时肾受累的部位首先应在

- A. 肾小管祥
- B. 肾小球
- C. 肾乳头
- D. 肾盖
- E. 集合管

【答案】 B

33、子宫内膜癌的高危因素不包括

- A. 卵巢早衰
- B. 不孕症
- C. 肥胖
- D. 无排卵性功能失调性子宫出

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/195241202014011132>