

2022 护士职业资格考试《实践能力》全真模拟考试试题 A 卷 附答案

考试须知：

- 1、考试时间：120 分钟，本卷满分为 380 分。
- 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号等信息。
- 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在密封线内答题，否则不予评分。

姓名：_____

考号：_____

得分	评卷人
	A1 型题（本题共 50 题，每小题 3 分，共 150 分）

1、心包腔内液体可起到的生理作用（ ）。

- A. 体液免疫
- B. 加强心肌收缩力
- C. 营养细胞
- D. 润滑
- E. 营养心肌

2、右心衰竭患者查体时可出现（ ）。

- A. 颈静脉怒张
- B. 阵发性夜间呼吸困难
- C. 交替脉
- D. 心尖区舒张期奔马律
- E. 双肺底湿啰音

3、为减少支气管扩张患者肺部继发感染和全身中毒症状，最关键的措施是（ ）。

- A. 加强痰液引流

B、选择广谱抗生素

C、使用呼吸兴奋剂

D、使用支气管扩张剂

E、注射流感疫苗

4、关于肺结核患者咳血时的护理措施的叙述，不正确的是（ ）。

A. 绝对卧床休息

B. 消除紧张情绪

C. 协助患者健侧卧位，轻拍患者后背刺激咳嗽

D. 鼓励患者轻咳将血排除，不可屏气

E. 发现窒息先兆时立即报告医生

5、关于要素饮食的概念哪项不妥（ ）。

A、是一种化学精制食物

B、只需要经小肠消化

C、含有人体需要的全部营养成分

D、含的蛋白质为氨基酸

E、含的碳水化合物为单糖

6、子宫内膜异位症患者卵巢病变最常见的类型是（ ）。

A. 卵巢恶性肿瘤

B. 卵巢黄体囊肿

C. 卵巢滤泡囊肿

D. 卵巢炎性包块

E. 卵巢巧克力囊肿

7、在倾听技巧中，哪项是不可取的（ ）。

A、全神贯注

B、集中精神

C、双方保持合适的距离

D、用心听讲来源：考试大

E、不必保持目光的接触

8、某6月龄婴儿，父母带其到儿童保健门诊进行预防接种，此时应给该患儿注射的疫苗是（ ）。

A. 百白破疫苗

B. 乙肝疫苗

C. 卡介苗

D. 腮麻风疫苗

E. 脊髓灰质炎疫苗

9、“黑加征”是指（ ）。

A. 子宫增大、变软

B. 子宫呈后倾位

C. 子宫峡部软，子宫和宫颈似不相连

D. 宫颈呈紫蓝色

E. 乳头及乳晕着色加深

10、长期氧疗是指（ ）。

A. 每天吸氧时间坚持8小时

B. 每天吸氧时间坚持10小时

C. 每天吸氧时间坚持15小时以上

D. 睡眠时不吸氧

E. 氧流量维持在2~4L/min

11、室性心动过速首选的治疗药物（ ）。

A. 普纳洛尔

B. 利多卡因

C. 硝酸甘油

D. 洋地黄

E. 酚妥拉明

12、慢性左心功能不全最早出现的症状是：（ ）。

A. 劳力性呼吸困难

B. 心源性哮喘

C. 水肿

D. 咳粉红色泡沫痰

E. 食欲降低

13、确诊葡萄胎最重要的辅助检查是（ ）。

A. 血/尿HCG测定

B. B超检查

C. 多普勒胎心听诊检查

D. 腹部CT检查

E. 腹部X线检查

14、关于肝性脑病患者的饮食护理，叙述正确的是（ ）。

A. 昏迷者给予蛋白质以补充营养

B. 患者清醒后最好给动物性蛋白

C. 显著腹水患者应限制水钠摄入量

D. 给予脂肪类物质以补充热量

E. 葡萄糖的入量宜少

15、慢性心力衰竭患者使用洋地黄治疗过程中，一日不慎漏服一次，此时患者应该（ ）。

A. 在下一次服药时补服

B. 不要补服，下一次按照医嘱剂量正常服药

C. 发现时立即补服漏服剂量的全量，下一次按照医嘱剂量正常服药

D. 发现时立即补服漏服剂量的半量，下一次按照医嘱剂量正常服药

E. 发现时立即补服漏服剂量的全量，下一次按照医嘱剂量半量服药

16、猩红热患儿特有的体征是（ ）。

A、口周苍白圈

B、躯干糠皮样脱屑

C、皮疹多在发热2天后出现

D、疹间无正常皮肤

E、多为持续性高热

17、拔火罐的适应证是（ ）。

A. 外感风寒，风寒湿痹

B. 急性腰扭伤

C. 各种疮疡疔肿

D. 平素体质虚弱

E. 高热、抽搐、昏迷

18、下列大咯血窒息抢救措施，不妥的是（ ）。

A. 立即置患者于头低足高位

B. 立即清除口腔内血块

C. 立即应用镇静、镇咳剂

D. 必要时人工呼吸

E. 呼吸道通畅后加压吸氧

19、生化检验的血标本应在什么时候采集（ ）。

A、清晨空腹

B、饭前半小时

C、饭后半小时

D、临睡前

E、没有时间限制

20、婴儿期持续性青紫最常见于（ ）。

A. 房间隔缺损

B. 室间隔缺损，

C. 动脉导管未闭

D. 肺动脉狭窄

E. 法洛三联症

21、昏迷病人从急诊室被送入病室后值班护士首先应（ ）。

A. 填写各种卡片

B. 通知医生、配合抢救、测量生命体征

C. 询问病史，评估发病过程

D. 通知营养室，准备膳食

E. 介绍医院环境

22、低于多少为羊水过少（ ）。

A. 300ml

B. 400ml

C. 500ml

D. 200ml

E. 600ml

23、下列体位与褥疮好发部位的关系不正确的是（ ）。

A、仰卧——骶尾部

B、侧卧——髋部

C、俯卧——内踝

D、坐位——坐骨结节

E、侧卧——肩峰部

24、输卵管妊娠患者前来就诊时，最常见的主诉是（ ）。

- A. 腹痛
- B. 胸痛
- C. 咳嗽
- D. 咯血
- E. 呼吸急促

25、以下有关输液的叙述不正确的是（ ）。

- A、需长期输液者，一般从远端静脉开始
- B、需大量输液时，一般选用较大静脉
- C、输入多巴胺时应调节较慢的速度
- D、连续24小时轮流时，应每12小时更换输液管
- E、颈外静脉穿刺拔管时在穿刺点加压数分钟，避免空气进入

26、李某，颈椎骨折，现需搬运至平车上，平车与床的适当位置是（ ）。

- A. 头端与床尾相接
- B. 头端与订头平齐
- C. 头端与床头呈锐角
- D. 头端与床尾呈锐不可当角
- E. 头端与床头呈钝角

27、张先生，男，32岁，因患急性黄疸性肝炎住院，此时进行的护理措施不妥当的是（ ）。

- A. 接触病人应穿隔离衣
- B. 病人的排泄物直接倒入马桶中冲洗
- C. 护理病人前后均应洗手
- D. 给予低脂肪食物
- E. 病人剩余的饭菜可用漂白粉混合搅拌后倒掉

28、下列哪种情况可实施大量不保留灌肠（ ）。

- A、高热病人降温
- B、心肌梗死病人来源：考试大
- C、急腹症
- D、消化道出血
- E、妊娠早期

29、下列有关适应特性的叙述，不正确的是（ ）。

- A、适应是有一定限度的
- B、适应本身也具有应激性
- C、应激源来的越突然，个体越难以适应
- D、面对应激源机体只能做出一个层次的适应
- E、适应是区别有生命机体和无生命物质的一个特征

30、胆道T管引流与腹腔引流管的护理措施不同的是（ ）。

- A. 保持引流管通畅
- B. 每天更换引流袋
- C. 观察引流液的量和性状
- D. 拔管前夹管观察1~2天
- E. 引流袋不得高于引流出口

31、输卵管结扎术的结扎部位是输卵管的（ ）。

- A. 间质部
- B. 峡部
- C. 壶腹部
- D. 伞部
- E. 漏斗部

32、使用简易呼吸器前，首要的步骤是（ ）。

- A. 清除呼吸道分泌物

B. 松开领口、腰带

C. 俯卧，人工呼吸

D. 氧气吸入

E. 使用呼吸中枢兴奋剂

33、关于产褥感染的防治，不妥的是（ ）。

A. 加强孕期保健

B. 产时尽量少作肛查

C. 产前、产时常规用抗生素

D. 产褥期保持外阴清洁

E. 掌握阴道检查适应证

34、下列情况中，可引起气管向患侧移位的是（ ）。

A. 胸腔积液

B. 肺不张

C. 气胸

D. 纵隔肿瘤

E. 肺气肿

35、大咯血患者发生窒息首要抢救措施是（ ）。

A. 立即气管插管

B. 取患侧卧位

C. 用导管盲插抽吸血块

D. 立即应用呼吸兴奋剂

E. 加压吸氧

36、胃肠减压管的拔管最可靠的指征是（ ）。

A. 体温正常

B. 腹胀消失

- C. 肛门排气
- D. 肠蠕动恢复
- E. 吸出液体量少

37、判断肋骨骨折，胸部检查最可靠的依据是()。

- A. 局部肿胀
- B. 皮下瘀斑
- C. 皮下气肿
- D. 胸式呼吸消失
- E. 直接和间接压痛

38、留置胸膜腔闭式引流管的病人出现引流管脱出，首先要()

- A、给病人吸氧
- B、立即报告医生
- C、急送手术室处理
- D、把脱出的引流管重新插入
- E、用无菌凡士林纱布、厚层纱布封闭引流

39、国际护士会将“5月12日”定为国际护士节，这一日期是南丁格尔的()。

- A. 生日
- B. 授奖日期
- C. 参战日期
- D. 逝世的日期
- E. 第一所护士学校创办的日期

40、目前医学界对死亡的判断依据是()。

- A. 呼吸停止
- B. 心跳停止
- C. 各种反射消失

D. 脑死亡

E. 瞳孔散大，对光反射消失

41、下列药物中适宜饭前服用的是（ ）。

A. 伊曲康唑

B. 维生素C

C. 枸橼酸铋钾

D. 青霉素

E. 甲硝唑

42、下列哪项不符合压疮溃疡期的临床表现（ ）。

A. 局部溃疡形成

B. 浅层组织感染，有脓液流出

C. 出现黑色坏死组织

D. 局部有水疱形成

E. 严重者可引起败血症

43、深二度烧伤的损伤深度至（ ）。

A. 表皮角质层

B. 表皮生发层

C. 真皮浅层

D. 真皮深层，有附件残留

E. 皮肤全层

44、心脏前负荷过重见于（ ）。

A. 高血压

B. 主动脉瓣狭窄

C. 二尖瓣狭窄

D. 肺动脉高压

E. 二尖瓣关闭不全

45、婴儿营养不良的主要原因是（ ）。

A. 喂养不当

B. 患传染病

C. 双胎早产

D. 生长发育迅速

E. 消化系统结构或功能异常

46、慢性肾衰竭最早和最常见的症状是（ ）。

A. 心血管系统

B. 精神、神经系统症状

C. 消化系统症状

D. 代谢紊乱

E. 内分泌失调

47、肾病综合征治疗过程中，可减少尿蛋白排泄并延缓肾功能损害的常用药物是（ ）。

A. 噻嗪类利尿剂

B. 血管紧张素转换酶抑制剂

C. 糖皮质激素

D. 细胞毒药物

E. 环孢素A

48、心源性水肿的主要致病因素是（ ）。

A. 心律失常

B. 醛固酮水平下降

C. 液体自毛细血管内渗透至组织间隙的量少于回吸收的量

D. 右心功能不全

E. 有效循环血量减少

49、高血压病的治疗药物卡托普利最常见的副作用是（ ）。

- A. 头痛
- B. 无力
- C. 心率增快
- D. 刺激性干咳
- E. 心率减慢

50、关于炎f生浸润期压疮的描述，不正确的是（ ）。

- A. 皮肤呈紫色
- B. 皮下结节
- C. 有大、小水疱
- D. 水泡表皮剥脱露出湿润的创面
- E. 创面上有脓性分泌物

得分	评卷人
----	-----

A2 型题（本题共 50 题，每小题 3 份，共 150 分）

1、关于输卵管妊娠非手术治疗病人的护理措施，正确的叙述是（ ）。

- A. 多活动
- B. 流质饮食
- C. 定期腹部触诊
- D. 避免做增加腹压的动作
- E. 无出血危险不必严密观察

2、患儿女，9岁。患病毒性脑膜脑炎入院。入院当日患儿突然出现全身抽搐，放射性呕吐，口腔及气管内有大量呕吐XX。护士应立即采取的措施是（ ）。

- A. 给予氧气吸入
- B. 约束四肢，制止抽搐
- C. 吸引器吸出呼吸道内异物

D. 应用镇静药物，控制抽搐

E. 开通静脉通道，应用脱水药物

3、患儿女，早产，母乳喂养，经过10天观察，身体状况良好，医家长接其出院；护士应给予正确指导是（ ）。

A. 培养良好的生活习惯

B. 训练按时排便

C. 及早添加辅食

D. 预防感染

E. 预防外伤

4、患者男，40岁，因劳累近2周自感头晕、头疼，连续三次测血压值为21.3/13.3kPa（160/100mmHg），休息后血压可自行恢复正常，诊断首先考虑（ ）。

A. 急进性高血压

B. 慢性肾炎

C. 甲亢

D. 原发性高血压

E. SLE

5、患者男，30岁。儿童时曾患麻疹肺炎，被诊断为支气管扩张已10余年。近1周来咳嗽、咳痰加重，痰呈脓性，首选护理措施是（ ）。

A. 指导有效咳嗽

B. 导管吸痰

C. 拍背

D. 体位引流

E. 湿化呼吸道

6、患者女性，为育龄妇女，心功能I。II级，无心力衰竭且无其他并发症。对她的妊娠建议是（ ）。

- A. 可以
- B. 不可以
- C. 密切监护下可以
- D. 绝对不可以
- E. 终生不孕

7、患析女性，78岁。高血压10年，晨起发现有侧肢体瘫痪，当时意识清楚，被家人送到医院进行治疗，3天后，病情稳定。此病人瘫痪肢体的康复从什么时候开始()。

- A. 在发病3天后就应进行康复期功能训练
- B. 住发病5天后就应进行康复期功能训练
- C. 住发病1周后就应进行康复期功能训练
- D. 住发病2周后就应进行康复期功能训练
- E. 在发病3周后就应进行康复期功能训练

8、刘先生，45岁，失血性休克，正在进行扩容疗法，中心静脉压监测为ScmH20，血压70 / 50mmHg，应()。

- A. 加快输液速度
- B. 维持原速输液
- C. 减慢滴速
- D. 停止输液
- E. 加用强心剂

9、某4个月患儿，人工喂养。近日反复出现发作性吸气困难，伴有吸气时喉鸣音，急诊入院。查血钙1.7mmol/L，其余正常。首先考虑该患儿出现了()。

- A. 中毒性肺炎
- B. 喉痉挛
- C. 气管异物
- D. 惊厥

E. 支气管哮喘

10、患者女，28岁，乳腺癌扩大根治术后咨询护士可以妊娠的时间是术后（ ）。

A、1年

B、2年

C、3年

D、4年

E、5年

11、患者男，60岁，搬举重物时严重腹痛，呕吐数次，腹胀不适。既往有右腹股沟斜疝病史，该患者最主要的护理问题是（ ）。

A. 恐惧：与突发严重腹痛有关

B. 潜在并发症：休克

C. 营养失调：低于机体需要量，与呕吐有关

D. 体液不足：与呕吐有关

E. 疼痛：与腹股沟斜疝嵌顿有关

12、王先生：，自感心慌，头晕就医，门诊医生听诊心脏时记录心率为84次/min，脉搏为52次/min，而且心率不规则，心率快慢不一，心音强弱不等，你认为该病人出现了（ ）。

A、二联律

B、三联律

C、脉搏短绌

D、心动过缓

E、脉搏异常

13、患儿女，三岁，法洛四联症，心功能IV级，护士建议该家长最适宜的手术时机是：（ ）。

A. 立即

B. 择期

C. 学龄前

D. 成年后

E. 心功能改善后

14、李女士，50岁，下蹲或腹部用力时，出现不由自主的排尿，其正确的护理诊断是（ ）。

A、功能性尿失禁：与膀胱过度充盈有关

B、功能性尿失禁：与腹压升高有关

C、反射性尿失禁：与膀胱收缩有关

D、完全性尿失禁：与神经传导功能减退有关

E、压迫性尿失禁：与膀胱扩约肌功能减退有关

15、患者女，56岁。初诊为高血压，目前血压维持在146/85mmHg。护士在评估中发现患者喜好下列食物。护士应指出，其中最不利于控制高血压的食物是（ ）。

A. 猪肝

B. 鲫鱼

C. 瘦肉

D. 河虾

E. 竹笋

16、女性，47岁，久站后左下肢出现酸胀感，小腿内侧可见静脉轻微突起，诊断为下肢静脉曲张。对此病人日常保健要求中不正确的是（ ）。

A. 尽量避免久站

B. 适当体育锻炼

C. 休息时放低患肢

D. 使用弹力袜

E. 避免跷二郎腿

17、患者，男性，42岁，反复发作右上腹痛、向右肩背放射2个月。查体：右上腹轻度压痛，肝不大，未扪及包块。首选的检查是（ ）。

A. 静脉胆管造影

B. 腹部CT扫描

C. 腹部B型超声

D. 纤维胆道镜检查

E. 经皮肝胆管造影(PTC)

18、患者孙某，背部烧伤，俯卧位。护士应该密切观察的部位是（ ）。

A. 足跟

B. 骶尾部

C. 髌部

D. 坐骨结节

E. 髂前上棘

19、某26岁初产妇，双胎妊娠35周，因下腹疼痛2小时入院，查体：宫口开大6cm，其最可能发生的情况是（ ）。

A. 早产

B. 前置胎盘

C. 胎盘早剥

D. 妊娠高血压综合征

E. 子宫收缩乏力

20、男性，70岁，因前列腺肥大造成排尿困难，尿潴留，已15小时未排尿。目前正确的护理措施是（ ）。

A. 让患者坐起排尿

B. 让患者听流水声

C. 用温水冲洗会阴部

D. 热敷下腹部

E. 行导尿术

21、刘先生：55岁，脑血管意外，长期卧床，无自理能力，根据奥瑞姆的自理模式，这时护士提供的护理应属于何种补偿系统（ ）。

A、全补偿系统

B、部分补偿系统

C、支持系统

D、教育系统

E、辅助系统

22、患者男，56岁，肝硬化腹水，在放腹水的过程中突然出现昏迷，首先采取的措施是()。

A、吸氧

B、头部降温

C、停止放腹水

D、补充血容量

E、保持呼吸道通畅

23、患者男，3岁，因“寒战，高热伴咳嗽，声音嘶哑”入院，查体：咽部明显充血，扁桃体肿大，临床诊断为急性上呼吸道感染（急性扁桃体炎），正确的护理措施是()。

A. 进温度适宜饮食或流质饮食，多饮水

B. 每小时测量体温1次

C. 并发细菌感染时只给予对症治疗即可

D. 允许经常探视

E. 可以吃辛辣刺激的食物

24、患儿男，10个月，今晨家长发现其眼眶周围密集针尖大小的出血点，经实验室检查诊断为特发性(急性型)血小板减少性紫癜，为及早识别颅内出血的发生，应重点监测患儿的()。

A、骨髓象巨核细胞比例

B、血小板计数

C、红细胞计数

D、白细胞计数

E、血红蛋白含量

25、患儿女，足月儿，出生后1分钟评估患儿情况：躯干皮肤色红，四肢较紫、心率120次/分、哭声响亮、肌张力好，呼吸45次/分。该足月儿最终的Apgar评分是()。

A. 6分

B. 7分

C. 8分

D. 9分

E. 10分

26、患儿女，9岁。患病毒性脑膜脑炎入院。入院当日患儿突然出现全身抽搐，放射性呕吐，口腔及气管内有大量呕吐物。护士应立即采取的措施是（ ）。

A. 给予氧气吸入

B. 约束四肢，制止抽搐

C. 吸引器吸出呼吸道内异物

D. 应用镇静药物，控制抽搐

E. 开通静脉通道，应用脱水药物

27、患儿男，生后10天。因口腔黏膜有异常来院就诊。查体可见口腔黏膜有白色乳凝块样小点，汇聚成小片，家长称不易拭去。目前患儿饮食正常，无全身症状。为该患儿进行口腔黏膜局部治疗应选用的是（ ）。

A. 2%利多卡因

B. 3%过氧化氢溶液

C. 10万U/ml制霉菌素鱼肝油混悬溶液

D. 2%碳酸氢钠溶液

E. 2.5%金霉素鱼肝油

28、患者男，46岁。建筑工人，入院时诊断为破伤风。以下与本病最有关的既往史是（ ）。

A. 糖尿病病史

B. 工作时被钉子扎伤过

C. 高血压家族史

D. 吸烟20年

E. 对花粉过敏

29、患者女，27岁。患风湿性瓣膜病，二尖瓣狭窄伴关闭不全2年。1周前因感冒后病情加重入院治疗，不正确的护理措施是（ ）。

- A. 空腹服用阿斯匹林
- B. 定时测体温，注意热型
- C. 卧床休息减少活动
- D. 进食高热量、高蛋白清淡易消化饮食
- E. 保持口腔清洁

30、患者女，48岁。哮喘持续发作，呼吸36次/分，吸气时脉搏明显减弱，此时该患者的脉搏属于（ ）。

- A、奇脉
- B、短绌脉
- C、洪脉
- D、交替脉
- E、水冲脉

31、患儿男，5岁。近来饮水量增多，适量增加，但体重下降，同时倦怠乏力，晚上多次起夜排尿，甚至尿床。该患儿最可能的诊断是（ ）。

- A. 遗尿症
- B. 尿崩症
- C. 糖尿病
- D. 肾小球肾炎
- E. 甲状腺功能亢进症

32、患者男，55岁。肺心病并发II型呼吸衰竭，遵医嘱给予吸氧。该患者为快速缓解症状，自行调大氧流量，30分钟后大量出汗，烦躁不安，肌肉震颤，间歇抽搐。考虑该患者最可能并发了（ ）。

- A. 氧中毒
- B. 肺性脑病
- C. 低钙血症

D. 低镁血症

E. 低钾血症

33、患者女，35岁，已婚。近3周来无明显诱因出现情绪低落、兴趣缺乏、动作缓慢，自觉“脑子笨，没有以前聪明，好像一块木头”，给予百忧解等治疗。护士需要向患者说明该药物的不良反应主要是（ ）。

A. 过度出汗

B. 嗜睡

C. 胃肠功能紊乱

D. 口唇发干

E. 心血管系统的紊乱

34、某13岁男孩，今出现不听父母安排，常用自己的标准衡量是非曲直。该男孩青春期的心理特征属于（ ）。

A. 情绪两极化

B. 独立性增强

C. 心理上锁

D. 心理向成熟过渡

E. 行为易冲动

35、患者女性，65岁。有高血压病史10年。最近稍事活动即出现胸闷、心悸、气急症状，该患者的心功能为（ ）。

A. I级

B. II级

C. III级

D. IV级

E. V级

36、患者女，80岁。慢性阻塞性肺疾病20余年。今因“咳嗽，咳痰加重”住院，夜间因烦躁难以入眠，自服地西洋5mg后入睡，晨起呼之不应，呼吸浅促。出现上述表现的最可能原因是（ ）。

A、地西洋的镇静作用

B、地西洋过敏

C、地西洋抑制呼吸中枢

D、地西洋中毒

E、地西洋的镇咳作用

37、男性，28岁，右侧胸外伤后，出现呼吸困难、发绀，胸壁伤处可听见空气进出的声音，首先考虑为()。

A. 多根多处肋骨骨折

B. 闭合性气胸

C. 开放性气胸

D. 张力性气胸

E. 进行性血胸

38、患者女性，29岁。妊娠32周，阴道流血2次，量小多，今日突然阴道流血多于月经量，兀腹痛，查血压100/80mmHg，脉搏96次/分，宫高30cm，腹围85cm，臀先露，未入盆，胎心140次/分，其诊断可能是()。

A. 阴道静脉曲张破裂

B. 妊娠合并宫颈癌

C. 妊娠合并宫颈息肉

D. 前置胎盘

E. 胎盘早期剥离

39、患者男，55岁。高血压病。身高176CM，体重86Kg，该患者属于()。

A. 体重低下

B. 体重正常

C. 体重超重

D. 重度肥胖

E. 中度肥胖

40、患儿女，4岁，体检发现“X”形腿，粗钙 2.5mmol/L ，护士正确的判断是()。

A. 可疑维生素D缺乏性佝偻病

B. 维生素D缺乏性佝偻病初期

C. 维生素D缺乏性佝偻病激期

D. 维生素D缺乏性佝偻病恢复期

E. 维生素D缺乏性佝偻病后遗症期

41、患儿，3岁，诊断为缺铁性贫血，血红蛋白 80g/L ，为改善贫血症状最佳的食物是()。

A. 牛奶及乳制品

B. 鱼虾及高热量饮食

C. 动物肝脏及高蛋白饮食

D. 紫皮茄子及高蛋白饮食

E. 海带，紫菜及低蛋白饮食

42、患者女，32岁。痛经两年，呈进行性加重，查体：子宫后倾固定，子宫后壁触及三个瘤性结节，进行达那唑治疗。目前最重要的护理措施为()。

A. 保持心情愉快

B. 避免剧烈运动

C. 湿热敷下腹部

D. 指导规范用药

E. 给予清淡饮食

43、患者男性，55岁。患右侧腹股沟斜疝，1小时前背重物时疝块突然增大、不能回纳，肿块紧张发硬伴疼痛和压痛。考虑其可能是()。

A. 易复性疝

B. 难复性疝

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/196110102030010050>