

主治医师（口腔医学）-基础知识(B型题 1)

1、鳃裂囊肿一般内衬

- A. 复层扁平上皮
- B. 假复层纤毛柱状上皮和复层扁平上皮
- C. 假复层纤毛柱状上皮
- D. 假复层无纤毛柱状上皮
- E. 复层扁平上皮、假复层纤毛柱状上皮、立方上皮或柱状上皮

2、鼻腭管囊肿一般内衬

- A. 复层扁平上皮
- B. 假复层纤毛柱状上皮和复层扁平上皮
- C. 假复层纤毛柱状上皮
- D. 假复层无纤毛柱状上皮
- E. 复层扁平上皮、假复层纤毛柱状上皮、立方上皮或柱状上皮

3、甲状舌管囊肿一般内衬

- A. 复层扁平上皮
- B. 假复层纤毛柱状上皮和复层扁平上皮
- C. 假复层纤毛柱状上皮
- D. 假复层无纤毛柱状上皮
- E. 复层扁平上皮、假复层纤毛柱状上皮、立方上皮或柱状上皮

4、牙源性上皮性肿瘤属于

- A. 牙源性腺样瘤
- B. Pindborg 瘤
- C. 巨大牙骨质瘤
- D. 良性成牙骨质细胞瘤
- E. 牙骨质-骨化纤维瘤

5、属于牙源性上皮和间充质性肿瘤，伴或不伴牙齿硬组织形成

- A. 牙源性腺样瘤
- B. Pindborg 瘤属于
- C. 巨大牙骨质瘤
- D. 良性成牙骨质细胞瘤
- E. 牙骨质-骨化纤维瘤

6、属于牙源性间充质瘤，含或不含牙源性上皮

- A. 牙源性腺样瘤
- B. Pindborg 瘤
- C. 巨大牙骨质瘤
- D. 良性成牙骨质细胞瘤
- E. 牙骨质-骨化纤维瘤

7、白斑常见于

- A. 棘层内疱
- B. 基层下疱
- C. 气球变性
- D. 上皮异常增生
- E. 网状变性

8、天疱疮

- A. 棘层内疱常见于
- B. 基层下疱常见于
- C. 气球变性常见于
- D. 上皮异常增生常见于
- E. 网状变性常见于

9、类天疱疮

- A. 棘层内疱常见于
- B. 基层下疱常见于
- C. 气球变性常见于
- D. 上皮异常增生常见于
- E. 网状变性常见于

10、腮腺属于

- A. 纯浆液性腺
- B. 纯黏液性腺
- C. 混合性腺
- D. 以浆液性腺泡为主的混合性腺
- E. 以黏液性腺泡为主的混合性腺

11、下颌下腺属于

- A. 纯浆液性腺
- B. 纯黏液性腺
- C. 混合性腺
- D. 以浆液性腺泡为主的混合性腺
- E. 以黏液性腺泡为主的混合性腺

12、唇腺属于

- A. 纯浆液性腺
- B. 纯黏液性腺
- C. 混合性腺
- D. 以浆液性腺泡为主的混合性腺
- E. 以黏液性腺泡为主的混合性腺

13、前期牙本质是

- A. 在成牙本质细胞和矿化牙本质之间一层未钙化的牙本质

- B. 牙本质钙化小球之间遗留的未钙化间质
- C. 在冠部靠近釉质和根部靠近牙骨质最先形成的牙本质
- D. 牙齿发育完成后形成的牙本质
- E. 釉质表面因磨损、酸蚀、龋病等而遭受破坏时，部分成牙本质细胞继续形成的牙本质

14、修复性牙本质是

- A. 在成牙本质细胞和矿化牙本质之间一层未钙化的牙本质
- B. 牙本质钙化小球之间遗留的未钙化间质
- C. 在冠部靠近釉质和根部靠近牙骨质最先形成的牙本质
- D. 牙齿发育完成后形成的牙本质
- E. 釉质表面因磨损、酸蚀、龋病等而遭受破坏时，部分成牙本质细胞继续形成的牙本质

15、球间牙本质是

- A. 在成牙本质细胞和矿化牙本质之间一层未钙化的牙本质
- B. 牙本质钙化小球之间遗留的未钙化间质
- C. 在冠部靠近釉质和根部靠近牙骨质最先形成的牙本质
- D. 牙齿发育完成后形成的牙本质
- E. 釉质表面因磨损、酸蚀、龋病等而遭受破坏时，部分成牙本质细胞继续形成的牙本质

16、牙槽骨吸收明显，说明牙周炎处于

- A. 始发期
- B. 早期病变
- C. 病损确立期
- D. 进展期
- E. 静止期

17、结合上皮出现炎症、增生，但尚未形成牙周袋，说明牙周炎处于

- A. 始发期
- B. 早期病变
- C. 病损确立期
- D. 进展期
- E. 静止期

18、龈沟上皮与结合上皮表现为急性渗出性炎症，说明牙周炎处于

- A. 始发期
- B. 早期病变
- C. 病损确立期
- D. 进展期
- E. 静止期

19、原有的牙槽骨吸收处有新的类骨质形成，纤维增生，说明牙周炎处于

- A. 始发期
- B. 早期病变
- C. 病损确立期
- D. 进展期
- E. 静止期

20、一般无矿化物形成的肿瘤是

- A. 成釉细胞瘤
- B. 牙源性钙化上皮瘤
- C. 牙源性钙化囊肿
- D. 牙源性腺样瘤
- E. 混合性牙瘤

21、属于发育异常或畸形而非真性肿瘤的病损是

- A. 成釉细胞瘤
- B. 牙源性钙化上皮瘤
- C. 牙源性钙化囊肿
- D. 牙源性腺样瘤
- E. 混合性牙瘤

22、影上皮细胞(ghostepithelialcell)存在于

- A. 成釉细胞瘤
- B. 牙源性钙化上皮瘤
- C. 牙源性钙化囊肿
- D. 牙源性腺样瘤
- E. 混合性牙瘤

23、镜下以颗粒细胞为主的病损为

- A. 先天性龈瘤
- B. 纤维性龈瘤
- C. 化脓性肉芽肿
- D. 妊娠性龈瘤
- E. 巨细胞性龈瘤

24、内分泌改变对其有影响的病损为

- A. 先天性龈瘤
- B. 纤维性龈瘤
- C. 化脓性肉芽肿
- D. 妊娠性龈瘤
- E. 巨细胞性龈瘤

25、镜下以炎性肉芽组织为主的病损为

- A. 先天性龈瘤
- B. 纤维性龈瘤
- C. 化脓性肉芽肿
- D. 妊娠性龈瘤
- E. 巨细胞性龈瘤

26、牙尖顶偏远中的牙是

- A. 上颌乳尖牙
- B. 下颌乳尖牙
- C. 上颌第一前磨牙
- D. 上颌第一乳磨牙
- E. 下颌第一乳磨牙

27、牙尖顶偏近中的牙是

- A. 上颌乳尖牙
- B. 下颌乳尖牙
- C. 上颌第一前磨牙
- D. 上颌第一乳磨牙
- E. 下颌第一乳磨牙

28、颊尖偏远中的牙是

- A. 上颌乳尖牙

- B. 下颌乳尖牙
- C. 上颌第一前磨牙
- D. 上颌第一乳磨牙
- E. 下颌第一乳磨牙

29、面一个中央窝，一个近中窝的牙是

- A. 上颌侧切牙
- B. 上颌第二前磨牙
- C. 上颌尖牙
- D. 上颌第一磨牙
- E. 下颌第一磨牙

30、面一个中央窝，一个远中窝的牙是

- A. 上颌侧切牙
- B. 上颌第二前磨牙
- C. 上颌尖牙
- D. 上颌第一磨牙
- E. 下颌第一磨牙

31、面只有一个窝的牙是

- A. 上颌侧切牙
- B. 上颌第二前磨牙

- C. 上颌尖牙
- D. 上颌第一磨牙
- E. 下颌第一磨牙

32、面发育沟成”Y”字形的牙是

- A. 下颌第一前磨牙
- B. 下颌第二前磨牙
- C. 上颌第一磨牙
- D. 下颌第一磨牙
- E. 下颌第二磨牙

33、面发育沟成”十”字形的牙是

- A. 下颌第一前磨牙
- B. 下颌第二前磨牙
- C. 上颌第一磨牙
- D. 下颌第一磨牙
- E. 下颌第二磨牙

34、面发育沟成”大”字形的牙是

- A. 下颌第一前磨牙
- B. 下颌第二前磨牙
- C. 上颌第一磨牙

D. 下颌第一磨牙

E. 下颌第二磨牙

35、对面容影响最大的一组牙是

A. 上颌尖牙

B. 下颌前磨牙

C. 上颌前磨牙

D. 上颌磨牙

E. 下颌磨牙

36、与上颌窦关系最密切的一组牙是

A. 上颌尖牙

B. 下颌前磨牙

C. 上颌前磨牙

D. 上颌磨牙

E. 下颌磨牙

37、离下颌管最近的一组牙是

A. 上颌尖牙

B. 下颌前磨牙

C. 上颌前磨牙

D. 上颌磨牙

E. 下颌磨牙

38、可以促进细菌黏附、集聚，参与菌斑基质组成的是

A. 胞内多糖

B. 水不溶性胞外多糖

C. 葡糖基转移酶

D. 果糖基转移酶

E. 乳酸

39、在外源性糖缺乏时，可作为能源，且使细菌继续产酸的是

A. 胞内多糖

B. 水不溶性胞外多糖

C. 葡糖基转移酶

D. 果糖基转移酶

E. 乳酸

40、可以利用蔗糖裂解后产生的葡萄糖合成葡聚糖的是

A. 胞内多糖

B. 水不溶性胞外多糖

C. 葡糖基转移酶

D. 果糖基转移酶

E. 乳酸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/197024064164006156>