

2024 年辽宁省苏家屯区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题真题题库含答案（培优 B 卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 维持心脏、神经及消化系统正常功能所必需，缺乏可出现脚气病的是

- A: 维生素 D
- B: 维生素 A
- C: 维生素 B1
- D: 维生素 C

答案：C

2. 老年高血压高血压患者的降压目标

- A: <150 / 90mmHg
- B: <120 / 80mmHg
- C: <140 / 90mmHg
- D: <130 / 80mmHg

答案：A

3. 下列药品通用名与别名的组合中，不属于同一种药品的是

- A: 利可君与利血生
- B: 氨甲苯酸与止血敏
- C: 桂利嗪与脑益嗪
- D: 氯己定与洗必泰

答案：B

4. (常用的特殊解毒剂的适应证)，对乙酰氨基酚过量的特殊解毒剂

- A: 二巯丁二钠
- B: 乙酰半胱氨酸
- C: 纳洛酮
- D: 谷胱甘肽

答案：B

5. 患者，男，70 岁，右手抖动和行走缓慢 3 个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病，既往前列腺肥大史 3 年，临床上对该患者不宜选用：

- A: 左旋多巴
- B: 司来吉兰
- C: 多巴丝肼
- D: 苯海索

答案：D

6. 患者，女，35 岁，因感冒所致流涕、咳嗽发热等症状到药店购药，药师应推荐的药品是()

- A: 对乙酰氨基酚片
- B: 萘甲唑啉滴鼻液
- C: 酚麻美敏片
- D: 氯苯那敏片

答案：C

7. 抗慢性阻塞性肺疾病药的用药监护，禁用于急性心肌梗死，并不得与其他黄嘌呤药同时使用的是

- A: 多索茶碱

- B: 色甘氨酸
- C: 二羟丙茶碱
- D: 氨茶碱

答案：A

8. 属于癌痛治疗第二阶梯的止痛药物为

- A: 羟考酮
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 二氢可待因
- D: 哌替啶

答案：C

9. 不得将咨询档案等患者的资料用于商业目的

- A: 特别关注特殊人群
- B: 解释的技巧
- C: 保护患者的隐私
- D: 及时回答不拖延

答案：C

10. 对于男性成人而言，下列红细胞沉降率检查值属于正常的是

- A: 18mm/h
- B: 14mm/h
- C: 20mm/h
- D: 16mm/h

答案：B

11. 属于 HIV 整合酶链转移抑制剂的是（）

- A: 阿巴卡韦

- B: 奈韦拉平
- C: 多替拉韦
- D: 洛匹那韦

答案：C

12. 第一类精神药品处方印刷用纸的颜色是

- A: 淡黄色
- B: 淡红色
- C: 淡橙色
- D: 淡绿色

答案：B

13. 服用含有盐酸伪麻黄碱的抗感冒药后，可导致的不良反应是

- A: 蛋白尿
- B: 血压升高
- C: #NAME?
- D: 栓塞

答案：B

14. 向患者发放合理用药宣传材料是

- A: 指令方式
- B: 被动方式
- C: 主动方式
- D: 质问方式

答案：C

15. 新药临床评价分为

- A: 三期

B: 一期

C: 四期

D: 二期

答案: C

16. (2017 年真题) 处方中外文缩写 OS. 代表 ()

A: 双眼

B: 右耳

C: 左耳

D: 左眼

答案: D

17. 患者因股癣前来药店购药，不宜推荐的药物是

A: 氢化可的松乳膏

B: 复方苯甲酸软膏

C: 酮康唑乳膏

D: 联苯苄唑乳膏

答案: A

18. 对急性卡他性结膜炎可选用

A: 1%泼尼松龙滴眼液

B: 碘苷滴眼液

C: 杆菌肽眼膏

D: 硫酸锌滴眼液

答案: C

19. 对 5 岁以下儿童高热时紧急退热，应该选用的药品是

A: 20% 安乃近溶液滴鼻

B: 布洛芬混悬液

C: 20%阿司匹林溶液滴鼻

D: 贝诺酯混悬液

答案: A

20. 心力衰竭的支气管哮喘禁用

A: 利尿剂

B: β 受体阻断剂

C: RAAS 抑制剂

D: 强心苷

答案: B

21. 患者，男，57 岁，患有冠心病、抑郁症、2 型糖尿病，用药包括二甲双胍、阿托伐他汀、圣约翰草提取物、阿卡波糖、阿司匹林。近日患者在家人陪同下去郊区旅游，日晒后暴露部位的皮肤出现红斑、丘疹，伴灼热、痒痛感，疑与用药有关。最可能引起该过敏反应的药物是

A: 阿托伐他汀

B: 圣约翰草提取物

C: 二甲双胍

D: 阿卡波糖

答案: B

22. 可造成肝脏损害，形成肝硬化或脂肪肝，减弱对药物的代谢速度的是

A: 食醋中的醋酸

B: 酒中的乙醇

C: 茶叶中的鞣酸

D: 食盐中的氯化钠

答案：B

23. 属于 CYP1A2 强抑制剂的药物是

A: 氟康唑

B: 西咪替丁

C: 环丙沙星

D: 红霉素

答案：C

24. 用于治疗铅中毒的特殊解毒剂是（）

A: 二巯丁二钠

B: 乙酰胺

C: 纳洛酮

D: 氟马西尼

答案：A

25. 一旦误服该毒性物质中毒，忌用碳酸氢钠溶液洗胃的是

A: 香豆素类杀鼠药

B: 拟除虫菊酯类杀虫药

C: 磷化锌等灭鼠药

D: 克仑特罗(瘦肉精)

答案：A

26. (2021 年真题) 在一定范围内,其水平与动脉粥样硬化和冠心病的发生、发展呈负相关的指标是（）

A: HbA1c

B: HDL-C

C: TG

D: LDL-C

答案：B

27. (2021 年真题) 患者，男，58 岁，有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2 年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊，开具药品如下：

A: 阿司匹林肠溶片在进餐时服用，以减轻对胃肠道的刺激性

B: 阿司匹林属于冠心病-级预防，长期使用方可获益

C: 用药期间，应关注腹痛、柏油样便或呕血等消化道出血症状

D: 阿司匹林用药期间，需定期监测 INR

答案：C

28. 效果转化为货币表示

A: 最小效益分析

B: 成本-效用分析

C: 最小效果分析

D: 成本-效益分析

答案：D

29. 查找药物信息的正确顺序是()。

A: 二级信息源→三级信息源→一级信息源

B: 二级信息源→一级信息源→三级信息源

C: 一级信息源→二级信息源→三级信息源

D: 三级信息源→二级信息源→一级信息源

答案：D

30. (2019 年真题) 关于处方开具和调剂的说法，正确的是

- A: 查处方时“四查”是指查对药名、剂型、规格和数量
- B: 处方开具后 7 日内有效
- C: 应使用淡红色处方开具第二类精神药品
- D: 调剂处方时应做到“四查十对”

答案：D

31. 在有关与药物使用的内容中，属于医师用药咨询的主要内容是

- A: 合理用药信息
- B: 用药后预计起效时间、维持时间及疗效
- C: 注射剂配制溶媒、浓度
- D: 首次剂量、维持剂量以及每日用药次数、间隔与疗效

答案：A

32. 高血压合并糖尿病、肾功能不全，宜选用的药物是

- A: 美托洛尔
- B: 非洛地平
- C: 氢氯噻嗪
- D: 缬沙坦

答案：D

33. 医生开具处方，必须使用药品的名称是

- A: 药品通用名
- B: 药品习用名
- C: 药品商标名
- D: 药品化学名

答案：A

34. 哮喘急性发作的首选药为

- A: 沙丁胺醇？
- B: 沙美特罗？
- C: 布地奈德？
- D: 福莫特罗？

答案：A

35. 青霉素常采用的剂量单位是

- A: μg
- B: g
- C: IU
- D: mg

答案：C

36. 以最低的药物成本，实现最好的治疗效果体现

- A: 经济性
- B: 安全性
- C: 有效性
- D: 规范性

答案：A

37. 对于绝经综合征患者，可根据患者的病情或用药需求，采用不同的药物制剂或给药方式进行绝经激素治疗（MHT）

- A: 雌二醇 / 雌二醇-地屈孕酮片
- B: 雌二醇-屈螺酮片
- C: 戊酸雌二醇 / 雌二醇-醋酸环丙孕酮片
- D: 17β -雌二醇

答案：B

38. 通过阻断 β 受体而发挥抗高血压作用的药物是 ()

- A: 哌唑嗪
- B: 普萘洛尔
- C: 卡托普利
- D: 硝苯地平

答案: B

39. 患者于 1 周前无诱因出现咳嗽，咳嗽为阵发性，痰少，呈白色黏液性，不易咳出，同时出现发热，体温多在夜间升高， 38°C 左右，无畏冷、寒战、胸痛、咳血等，于卫生院治疗后，未见好转，并有气喘、气促，活动后呼吸困难等症状。入院治疗诊断为：肺炎。

- A: 喹诺酮类抗菌药物有胃肠道反应，一般不用
- B: 青壮年和无基础疾病的 CAP 患者，常用青霉素和第一代头孢菌素
- C: CAP 常见病原体为肺炎链球菌、支原体、衣原体、流感嗜血杆菌和呼吸道病毒
- D: 老人、有基础疾病或者需要住院的 CAP 患者常用第二、三代头孢菌素、 β -内酰胺类等

答案: A

40. 处方调配差错的内容

- A: 药品名称出现差错
- B: 通过药剂师双人复核制
- C: 加强药品货位管理
- D: 确认差错发生的过程、细节

答案: A

41. 解救有机磷中毒的是

- A: 亚硝酸异戊酯

- B: 盐酸戊乙奎醚
- C: 单价抗毒血清
- D: 二巯丁二钠

答案：B

42. 1%硫酸铜溶液催吐用于解救

- A: 三唑仑中毒
- B: 巴比妥中毒
- C: 磷化锌中毒
- D: 丙咪嗪中毒

答案：C

43. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

- A: 受精后 1 周至 3 个月
- B: 受精后 2 周至 3 个月
- C: 受精后 3 周至 2 个月
- D: 受精后 3 周至 3 个月

答案：D

44. 应用华法林抗凝过程中，出现严重出血时，可应用急救的药物是

- A: 维生素 K3
- B: 维生素 K4
- C: 维生素 K1
- D: 维生素 B1

答案：C

45. 静注的缩写为

A: qid

B: iv

C: q4h

D: pc

答案：B

46. 绝经激素治疗的基本原则错误的是

A: 治疗窗口为绝经 5 年之内或 50 岁之前

B: 对有子宫的妇女，补充雌激素的同时必须加上孕激素

C: 药物选择个体化，剂量个体化

D: 选择能达到治疗目的的最低有效剂量

答案：A

47. 可引起嗜睡的是

A: 东莨菪碱

B: 抗过敏药

C: 阿米洛利

D: 右美沙芬

答案：B

48. 以下哪项不是药物流产的适应证（）

A: 本人自愿、年龄 >40 岁的健康女性

B: 多次人工流产术史

C: 妊娠 ≤49 日

D: B 超确诊为宫内妊娠

答案：A

49. 病毒性肝炎、肝硬化等可引起

- A: 尿胆红素检测阳性
- B: 尿酸碱度增高
- C: 尿酸碱度降低
- D: 尿蛋白检测阳性

答案：A

50. 用于铜中毒的解毒剂是

- A: 青霉胺
- B: 硫酸阿托品
- C: 乙酰胺
- D: 维生素 K1

答案：A

51. 从事药学服务的药师应具备较好的投诉应对能力。正确妥善地应对投诉的重要意义是

- A: 使患者获得有关用药的指导
- B: 提高用药顺应性
- C: 增进患者对药师工作的信任
- D: 警惕与防范用药错误

答案：C

52. 以维生素 C 注射液作溶剂溶解后注射的是

- A: 谷胱甘肽
- B: 盐酸烯丙吗啡
- C: 亚硝酸钠
- D: 双解磷

答案：A

53. 苯溴马隆为促进尿酸排泄的药物，在痛风急性期不宜服用，以防止发生转移性痛风。在治疗期间，不能与下列药物同时使用的是

- A: 别嘌醇
- B: 碳酸氢钠
- C: 阿司匹林
- D: 秋水仙碱

答案：C

54. 心律失常患者用药治疗期间应该禁用的是

- A: 浓茶
- B: 烟
- C: 咖啡
- D: 酒

答案：A

55. 过敏性鼻炎首选的药物是

- A: 麻黄碱
- B: 氯雷他定
- C: 阿托品
- D: 糖皮质激素

答案：B

56. 进行药学信息的收集、保管、整理、评价、传递、提供和利用，是归属于查看材料

- A: 处方审核工作
- B: 参与健康教育工作
- C: 药学信息服务工作

D: 处方点评工作

答案：C

57. (2019 年真题) 患者，男，64 岁，因右足肿痛就诊。查体：右脚第一趾关节红肿，触痛明显。化验结果：血尿酸 $588.1 \mu\text{mol/L}$ 。诊断为急性痛风性关节炎。患者合并高血压、高胆固醇血症、冠心病，目前正服用氢氯噻嗪片 25mgqd、美托洛尔缓释 47.5mgqd、赖诺普利片 20mgqd、辛伐他汀片 10mgqd、阿司匹林肠溶片 100mgqd。

A: 贝诺酯片

B: 阿司匹林片 (300mg)

C: 双氯芬酸钠片

D: 别嘌醇片

答案：C

58. (2018 年真题) 患者，女，68 岁，体重 45kg，因发热、咳嗽咳痰入院治疗，临床诊断为社区获得性肺炎。化验结果：白细胞计数 $11.76 \times 10^9/\text{L}$ ，肌酐清除率 18ml/min。该患者使用下列抗菌药物治疗时不需要减量的是 ()

A: 阿莫西林

B: 头孢噻肟钠

C: 左氧氟沙星

D: 莫西沙星

答案：D

59. 收缩血管平滑肌，引起高血压的药物是

A: 咖啡因

B: 重组人促红细胞生成素

C: 糖皮质激素

D: 伪麻黄碱

答案: D

60. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速做出准确判断，及时果断地采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

A: 10~20min

B: 5~10min

C: 20~30min

D: 15~30min

答案: D

61. 患者,男,36岁,因发热、咳嗽就诊,查血常规:白细胞计数

$6.28 \times 10^9/L$,中性粒细胞百分比 65.7%,淋巴细胞百分比 15.1%。诊断为感冒。医生处方:阿奇霉素片 0.5g qd po. 该处方属于()

A: 有配伍禁忌

B: 用法、用量不适宜

C: 无适应证用药

D: 有禁忌证用药

答案: C

62. (2017年真题)患者女,6岁,因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查:白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

A: 尼美舒利

B: 美洛昔康

C: 对乙酰氨基酚

D: 双氯芬酸钠

答案：C

63. 摄入过多可增加体内血容量，促发充血性心力衰竭或高血压的是

A: 酒

B: 食盐

C: 食醋

D: 脂肪

答案：B

64. 氟尿嘧啶、甲氨蝶呤等抗肿瘤治疗应该禁用的是

A: 食盐

B: 食醋

C: 酒

D: 脂肪

答案：C

65. 患者，男，70 岁，两周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院，目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是

A: 阿司匹林

B: 氯吡格雷

C: 肝素

D: 利伐沙班

答案：A

66. 处方前记项下包括的项目（）

A: 临床诊断、费别

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 医师签名、药品金额

C: 对药物治疗的建设性意见与结果评价

D: 主要实验室数据

答案：A

67. 降钙素属于

A: 骨形成刺激剂

B: 促进骨矿化剂

C: 骨吸收抑制剂

D: 激素替代剂

答案：C

68. 可引起局部组织萎缩

A: 地塞米松粘贴片

B: 氯己定

C: 硼酸甘油

D: 甲硝唑含漱制剂

答案：A

69. 患者，女，62 岁，医师处方如下：姓名：×××性别：女年龄：62 岁
临床诊断：2 型糖尿病、高血压 2 级、高脂血症、PCI 术后

A: 氨氯地平

B: 二甲双胍

C: 氯吡格雷

D: 阿卡波糖

答案：C

70. 患者，男，68 岁，肺癌晚期，平日清晨、晚间 8 点使用吗啡缓释片控制疼痛。目前出现暴发性疼痛，应采取的治疗措施是

- A: 即刻加用可待因片一次
- B: 即刻加用吗啡缓释片一次
- C: 即刻加用吗啡片一次
- D: 即刻加用芬太尼透皮贴剂

答案：C

71. 混合型高脂血症，首选的治疗药物是

- A: 贝特类
- B: 他汀类
- C: ω -3 脂肪酸制剂
- D: 烟酸类

答案：B

72. 患者，男，45 岁，临床诊断肝内胆管梗阻。下列指标最可能出现的是

- A: 肌酸激酶降低
- B: 白蛋白升高
- C: 血肌酐降低
- D: γ -谷氨酰转移酶升高

答案：D

73. 患者，男，60 岁，诊断为高血压伴蛋白尿，首选的药物是

- A: 氯沙坦
- B: 螺内酯
- C: 维拉帕米
- D: 美托洛尔

答案：A

74. 儿童 2 型糖尿病患者宜选用的药物是

- A: 格列喹酮
- B: 胰岛素
- C: 格列苯脲
- D: 二甲双胍

答案：D

75. 过敏性肠炎、慢性菌痢等可引起

- A: 稀糊状或水样粪便
- B: 冻状便
- C: 米泔水样便
- D: 黏液便

答案：B

76. 医学检查发现柏油样黑便并有光泽，通常见于

- A: 胃溃疡
- B: 痔疮
- C: 肛裂
- D: 直肠息肉

答案：A

77. 抽烟可降低呋塞米的利尿作用，其主要原因是烟草中含有

- A: 焦油
- B: 烟碱
- C: 醛类成分
- D: 咖啡因

答案：B

78. 患者，男，69 岁，BMI27.8kg/m²，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 颠茄片
- B: 加巴喷丁胶囊
- C: 吗啡控释片
- D: 双氯芬酸钠缓释片

答案：D

79. 能有效抑制肠道内胆固醇的吸收，禁用于妊娠期和哺乳期的是（）

- A: 他汀类
- B: 依折麦布
- C: 普罗布考
- D: 烟酸类

答案：B

80. 每日 4 次的缩写为

- A: q4h
- B: iv
- C: qid
- D: pc

答案：C

81. 患者，男，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

- A: 莫西沙星对非典型病原体无效
- B: 莫西沙星可覆盖社区获得性肺炎的常见病原体
- C: 莫西沙星属于氟喹诺酮类
- D: 莫西沙星对厌氧菌无效

答案：A

82. 对急性心肌梗死引起的室性心律失常首选

- A: 利多卡因
- B: 地高辛
- C: 普萘洛尔
- D: 硝酸酯类

答案：A

83. 患者，女，52 岁，患骨质疏松症伴静脉血栓，该患者避免使用的治疗药是

- A: 雷洛昔芬
- B: 特立帕肽
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 鲑鱼降钙素

答案：A

84. 患者，男，71 岁。患良性前列腺增生症。下列药物中不能用于治疗该病的是

- A: 抗胆碱药物

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 雄激素

C: 5 α 还原酶抑制剂

D: 选择性 α_1 受体阻断剂

答案：B

85. 患者，男，56 岁，以发热、左侧胸廓剧痛就诊。查体：体温 38.8℃，左侧沿第四肋走向有簇集性水疱。

A: 阿米替林

B: 卡马西平

C: 对乙酰氨基酚

D: 普瑞巴林

答案：B

86. 乙醇、对乙酰氨基酚等血浆药物浓度升高，地西泮、利多卡因分布容积增大、消除缓慢，是由于

A: 脂肪组织随年龄增长而增加，血浆白蛋白浓度降低

B: 胆汁分泌缺乏

C: 肾功能随年龄增长而减退

D: 肝药酶活性的个体化差异影响大于年龄的增长

答案：A

87. 临床上治疗焦虑症应用最广泛的药物为

A: 阿米替林

B: 帕罗西汀

C: 舍曲林

D: 氟伏沙明

答案：B

88. 静脉滴速过快，易致红人综合征的药物是（）

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 美罗培南

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/197106162140010024>