2024年广西壮族自治区田阳县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试大全（综合卷）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.女性，32岁，3年来月经量增多，乏力、心悸。体检面色较苍白。血红蛋白80g/L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞7×109/L，血小板120×109/L，血清铁300μg/L。

A: 维生素B12肌内注射

B: 硫酸亚铁口服

C: 右旋糖酐铁肌注

D: 输血

答案：B

2.以下所列处方书写的各项要求中，最正确的是

A: 处方中不得使用药品缩写名称

B: 每张处方不得合开中西药品

C: 每张处方不得超过5种药品

D: 每张处方不得超过3日用量

答案：C

3.新生儿应用氯霉素可引起

A: 新生儿溶血

B: 核黄疸

C: 灰婴综合征

D: 高胆红素血症

答案：C

4.患者男,70岁高血压病史14年,服用依那普利20mg/日,平时血压控制不佳今晨大便时突然出现头疼、头晕,随即出现右侧肢体活动不利。血压为190/100mHg，头颅CT检查结果为左侧脑出血,出血量约10ml，拟采用内科治疗,该患者首先应采取的治疗措施是（）

A: 口服氨氯地平片

B: 肌内注射利血平注射液

C: 静脉滴注甘露醇注射液

D: 静脉滴注硝酸甘油注射液

答案：C

5.某女孩，6岁，2个月来反复突发突止的意识障碍，表现为突然动作中断，呆立凝视，呼之不应，手中物体掉落，但从不跌倒，持续数秒钟缓解。

A: 简单部分性发作

B: 复杂部分性发作

C: 肌阵挛发作

D: 失神发作

答案：D

6.主要用于吗啡、哌替啶急性中毒解救的是

A: 谷胱甘肽

B: 盐酸烯丙吗啡

C: 亚硝酸钠

D: 双解磷

答案：B

7.某患者，女，14岁，尿频、尿急、尿痛3天，伴腰痛。肾区叩击痛，血分析见白细胞及中性粒细胞百分比升高，尿分析见尿液浑浊，尿白细胞+++，临床诊断为急性肾盂肾炎。

A: 呋喃妥因

B: 磺胺甲噁唑

C: 环丙沙星

D: 头孢曲松

答案：C

8.在体外无抗凝作用，在体内有凝血作用的是

A: 噻氯匹定

B: 华法林

C: 尿激酶

D: 肝素

答案：B

9.患者，男，70岁，2周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院，目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是（）

A: 肝素

B: 利伐沙班

C: 巴曲酶

D: 阿司匹林

答案：D

10.患者，女，48岁，身高158cm，体重72kg。最近因感觉易疲劳、怕冷、嗜睡、记忆力逐渐减退等情况前来就医。医生检查发现，患者眼睑和手部皮肤水肿，声音嘶哑、毛发稀落。实验室检查示：血清TSH水平升高。确诊为甲状腺功能减退症。

A: 3-4周

B: 6-12周

C: 4-6周

D: 2-3周

答案：C

11.应用患儿年龄、体重或体表面积等计算用药剂量，显示儿童用药应该

A: 密切监护

B: 严格掌握用药剂量

C: 避免食物的影响

D: 根据儿童特点选择适宜的给药方案

答案：B

12.下述“质子泵抑制剂的合理应用与治疗监护点”中，不正确的是（）

A: 多数为肠溶制剂，服药时不宜嚼碎

B: 肝功能障碍患者慎用

C: 高龄患者慎用

D: 妊娠及哺乳期妇女、儿童禁用

答案：D

13.属于HIV蛋白酶抑制剂的是

A: 恩夫韦替

B：沙奎那韦

C：扎西他滨

D: 奈韦拉平

答案：B

14.属于HIV蛋白酶抑制剂的是（）

A: 奈韦拉平

B: 阿巴卡韦

C: 洛匹那韦

D: 多替拉韦

答案：C

15.氨基糖苷类抗生素肾毒性大小的次序为.()。

A: 庆大霉素＞新霉素＞妥布霉素＞链霉素

B: 新霉素＞阿米卡星＞链霉素＞妥布霉素

C: 阿米卡星＞新霉素＞妥布霉素＞链霉素

D: 新霉素＞阿米卡星＞妥布霉素＞链霉素

答案：D

16.应急能力较差，较敏感，极易产生药品不良反应，是指

A: 严格掌握适应证

B: 明确诊断

C: 严格掌握用药剂量

D: 密切监护

答案：D

17.关于皮肤病外用剂型的选择，错误的说法

A: 慢性期皮损增厚，呈苔藓样变时，多用软膏剂和乳膏剂

B: 皮损处于亚急性期时，可酌情选用糊剂、粉剂和洗剂

C: 有渗液者，先用溶液剂湿敷，后用油剂

D: 急性期局部有红肿、水疱、糜烂时，多选用糊剂和乳膏剂

答案：D

18.（2017 年真题）慢性阻塞性肺病稳定期患者（FEV1＜50%）宜选用的治疗方案是（）

A: 长效 β2 受体激动剂+吸入型糖皮质激素

B: 吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药

C: 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂

D: 抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素

答案：A

19.患者，男，67 岁，主诉腰背疼痛、乏力，负荷增加时疼痛加重，严重时翻身、起坐及行走困难，疑似老年性骨质疏松症。经双能 X 线吸收测定，T 值≤一 2.5，确诊。药师应告知患者在服用维生素 D 软胶囊、碳酸钙片基础上，可加服

A: 艾司奥美拉唑

B: 苯妥英钠

C: 依替膦酸二钠

D: 泼尼松龙

答案：C

20.痛风慢性发作期间为促进尿酸排泄可选用

A: 苯溴马隆

B: 秋水仙碱

C: 泼尼松龙

D: 别嘌醇

答案：A

21.患者男性，30岁，确诊哮喘入院治疗3周，经正规治疗病情缓解，仅偶有胸闷，出院时医生进行用药注意事项嘱咐和患者教育。

A: β 受体阻断剂

B: H1受体阻断剂

C: β2受体激动剂

D: 抗胆碱药物

答案：A

22.(抗高血压药物的不良反应)，服用哌唑嗪可能引起

A: 多毛症

B: 免疫失调

C: 房室传导阻滞

D: 直立性低血压

答案：D

23.成人空腹血糖正常参考区间是

A: 3.5～6.1mmol/L

B: 3.9～6.1mmol/L

C: 3.3～5.5mmol/L

D: 3.7～6.1mmol/L

答案：B

24.患者，男，46岁。胃癌根治术后，病理为胃窦低分化腺癌，肝、肾功能正常，化疗方案为奥沙利铂+氟尿嘧啶+亚叶酸钙。

A: 其神经毒性与剂量大小无关

B: 与氯化钠存在配伍禁忌

C: 在葡萄糖溶液中稳定

D: 遇冷可加重其神经毒性

答案：A

25.肌内注射给药的外文缩写是

A: ivgtt

B: im

C: i.h

D: iv

答案：B

26.下列药物中，能解救含亚硝酸盐的食物中毒的是

A: 亚甲蓝

B: 维生素B6

C: 普萘洛尔

D: 维生素K1

答案：A

27.提示"胰酶肠溶胶囊不宜嚼碎服用，以免药粉残留口腔内、发生溃疡"，是针对

A: 交代用药途径及用药方法

B: 交代药物的用量

C: 交代用药注意事项

D: 交代药品贮存条件与方法

答案：A

28.患者，女，55岁，因"反复发作胸骨后疼痛2年，伴反酸，胃灼热，间断积食"而就诊。食管测压提示食管下括约肌(LES)压力<6mmHg，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病，医师处方：奥美拉唑肠溶片20mgbid强化抑酸治疗。

A: 适宜餐前30分钟服用

B: 长期用药后可能会出现维生素K缺乏

C: 应正片吞服

D: 用药后可能出现口干，便秘等不良反应

答案：B

29.皮下脂肪薄，局部循环差，致使皮下和肌内注射给药的吸收不规则，即

A: 药物排泄

B: 药物吸收

C: 药物分布

D: 药物代谢

答案：B

30.患者，男，60岁，因“坏死性胰腺炎”行剖腹探查术后2年，进食油炸食品后出现轻度腹泻。宜选用的药物是

A: 复方阿嗪米特肠溶片

B: 奥美拉唑肠溶胶囊

C: 蒙脱石散

D: 干酵母片

答案：A

31.根据药物对胎儿的危害,美国FDA将妊娠用药毒性分为A、B、C、D、X五个级别,正常剂量维生素D的妊娠毒性分级是()

A: A级

B: C级

C: X级

D: D级

答案：A

32.口服避孕药可能导致

A：血清碱性磷酸酶升高

B：血清血红蛋白升高

C：血清总胆固醇升高

D：血白细胞减少

答案：C

33.药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A：药物的使用

B：药物制剂因素

C：药理作用

D：药动学相互作用

答案：A

34.根据时辰药理学，选择最适宜的给药时间，可增强药物疗效、避免不良反应、提高用药依从性减轻疾病症状(一般抑郁症状表现为晨重晚轻)的是

A：清晨服抗抑郁药

B：清晨服利尿药

C：清晨服糖皮质激素

D：清晨服氨基糖苷类

答案：A

35.归属于上市前药品临床评价阶段的临床试验分为

A: 2期

B: 4期

C: 3期

D: 1期

答案：C

36.患者，男，26岁，因“咳嗽伴间断发热1周”入院，查体：T38.9℃，P90次/分，R21次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞16.9×109/L，中性粒细胞百分比84.6%；胸部CT示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A: 莫西沙星属于氟喹诺酮类

B: 莫西沙星对厌氧菌无效

C: 莫西沙星对非典型病原体无效

D: 莫西沙星可覆盖社区获得性肺炎的常见病原体

答案：C

37.6个月～2岁婴幼儿白细胞计数正常参考区间是

A: (11.0～12.0)×109/L

B: (200～300)×10^9/L

C: (4.0～10.0)×10^9/L

D: (100～300)×10^9/L

答案：A

38.患者，男性，36岁，主因“反复上腹部疼痛3年，加重伴黑便2天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院3年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前2天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及暖气，并伴有黑便，呈糊状，共排3次，每次约2509左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36．2℃、P84次／分、R20次／分、BP110／70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音3～5次／分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有-1．5cm×2cm椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

A: 优先选择法莫替丁20mgqn，疗程8周

B: 优先选择艾司奥美拉唑20mgqd，疗程6周

C: 优先选择法莫替丁20mgbid，疗程8周

D: 优先选择艾司奥美拉唑20mgqd，疗程4周

答案：D

39.对伴有血管性水肿的荨麻疹可选用的药物是

A: 氯雷他定

B: 赛庚啶

C: 泮托拉唑

D: 氯苯那敏

答案：B

40.哺乳期妇女应用下列药物会对乳婴产生何种不良影响,妊娠早期服用甲氨蝶呤

A：可能致胎儿畸形

B：可能引起乳婴视神经损害、智力障碍

C：可引起过期妊娠、产程过长和产后出血

D: 导致新生儿血钙过高

答案：A

41.某患者，男，78岁既往有动脉粥样硬化史，因尿频，尿急就诊，体征和实验室检查结果为：血压166/98mmHg，前列腺增生>60g，前列腺特异性抗原（PAS）正常，在控制患者血压的同时，应联合选用（）

A: 非那雄胺

B: 丙酸睾酮

C: 泼尼松龙

D: 吲达帕胺

答案：A

42.用于铜中毒的解毒剂是

A: 维生素K1

B: 硫酸阿托品

C: 乙酰胺

D: 青霉胺

答案：D

43.患者，男，50岁。临床诊断慢性肾衰竭（尿毒症期），进行肾移植治疗，配合应用免疫抑制剂他克莫司，其初始剂量为

A: 0.02～0.03mg/（kg·d）

B: 0.75～1mg/（kg·d）

C: 2～5mg/（kg·d）

D: 0.05～0.15mg/（kg·d）

答案：D

44.主要检查性状一致、色泽均匀、片面光滑、无毛糙起孔现象的是

A：软膏剂

B：糖浆剂

C：胶囊剂

D：片剂

答案：D

45.选择性地作用于骨性关节、有直接抗炎作用的处方药是

A：阿司匹林

B：塞来昔布

C：可待因

D：硫酸氨基葡萄糖

答案：D

46.患者，男，50岁，临床诊断为“焦虑障碍”，给予氟西汀20mgqd治疗。对该患者的用药指导，错误的是

A：氟西汀应于睡前服用

B：服用氟西汀期间不能饮酒

C：不能突然停止服用氟西汀

D：不得随意自行调整氟西汀剂量

答案：A

47.患者，男性，36岁，主因“反复上腹部疼痛3年，加重伴黑便2天”以“胃溃疡”收住入院。患者于入院3年前，餐后偶感上腹部隐痛不适，曾在当地医院做胃镜检查示“胃溃疡”。经住院给予对症治疗（具体药物及剂量不详）后症状有所好转。入院前2天开始，上述症状发作较为频繁，以胃灼痛为主，多以辛辣刺激及不良饮食为诱因，伴反酸及暖气，并伴有黑便，呈糊状，共排3次，每次约2509左右，同时伴有恶心。患者自发病以来，无头晕及头痛，有恶心但无呕吐，无胸闷及心慌，无咳嗽及咳痰，无腹泻，体重未见明显增减。查体：T36．2℃、P84次／分、R20次／分、BP110／70mmHg，腹平软，未见腹壁静脉显露及胃肠型和蠕动波，中上腹压痛但无反跳痛，肝、脾未扪及，肝、肾区无叩痛，移动性浊音阴性，肠鸣音3～5次／分。辅助检查：①便常规：红细胞满视野，隐血阳性；②胃镜检查：胃壁左侧有-1．5cm×2cm椭圆形溃疡；③尿素酶试验（+）。诊断结论：胃溃疡合并上消化道出血，幽门螺杆菌感染。

A: 阿莫西林1000mgbid+克拉霉素500mgbid+艾司奥美拉唑20mgbid+枸橼酸铋钾220mgbid；疗程2周

B: 克拉霉素500ragbid+左氧氟沙星200mgbid+甲硝唑400mgqid+艾司奥美拉唑20mgbid，疗程2周

C: 左氧氟沙星500mgqd+呋喃唑酮100mgbid+四环素500mgqid+枸橼酸铋钾220mgbid，疗程2周

D: 四环素500mgtid+甲硝唑400mgtid+艾司奥美拉唑20mgbid+枸橼酸铋钾220mgbid。疗程2周

答案：D

48.苯溴马隆为促进尿酸排泄的药物，在痛风急性期不宜服用，以防止发生转移性痛风。在治疗期间，不能与下列药物同时使用的是

A: 秋水仙碱

B: 别嘌醇

C：阿司匹林

D：碳酸氢钠

答案：C

49.属于雄激素受体拮抗剂，使增生的前列腺体积缩小的药品

A：非那雄胺

B：氟他胺

C: 阿夫唑嗪

D: 黄酮哌酯

答案：B

50.能使人长时间忍受肌肉疼痛的是

A: 利尿剂

B: 蛋白同化激素

C: 麻醉药品

D: 肽类激素

答案：C

51.根据时辰药理学，选择最适宜的给药时间，可增强药物疗效、避免不良反应、提高用药依从性以保证正常起居(避免夜尿过多)的是

A: 清晨服利尿药

B: 清晨服抗抑郁药

C: 清晨服糖皮质激素

D: 清晨服氨基糖苷类

答案：A

52.（2021年真题）影响药物治疗有效性的因素不包括（）

A: 给药途径

B: 药品价格

C: 药物相互作用

D: 患者的病生理状态

答案：B

53.患尿路感染，在无病原学结果前，一般首选（）

A: 针对革兰阴性球菌有效的抗菌药物

B：针对革兰阴性杆菌有效的抗菌药物

C：针对革兰阳性杆菌有效的抗菌药物

D：针对革兰阳性球菌有效的抗菌药物

答案：B

54.为比较不同质子泵抑制剂治疗十二指肠溃疡的经济性,将药物治疗的成本与产生的效用指标以货币进行评估,此药物经济学评价方法是()

A：成本-效益分析

B：成本-效用分析

C：成本-效果分析

D：最小成本分析

答案：A

55.苯二氮

A：舍曲林

B：艾司唑仑

C：丁螺环酮

D：阿米替林

答案：B

56.脑出血的内科治疗最重要的是

A：控制脑水肿

B：给予止血剂

C：降低血压

D：抗生素治疗

答案：A

57.糖尿病患者一旦出现尿酮体阳性，可以提示患者

A: 生长激素分泌过度

B: 胰岛素分泌过度

C: 伴甲状腺功能亢进

D: 病情尚未控制

答案：D

58.病例对照研究试验结果属于循证医学证据级别的

A: 4级证据

B: 2级证据

C: 1级证据

D: 3级证据

答案：D

59.妊娠期妇女治疗眼疾不宜应用的药品是

A: 醋酸可的松滴眼剂

B: 硫酸锌滴眼剂

C: 酞丁安滴眼剂

D: 利福平滴眼剂

答案：C

60.治疗严重先兆子痫的首选药物为

A: 美托洛尔

B: 氢氯噻嗪

C: 依那普利

D: 硫酸镁

答案：A

61.患者，男，80岁，患有高血压、2型糖尿病和前列腺增生症，近日出现暂时性尿失禁症状，怀疑与其服用的药物有关，复核其使用的药物，可能造成其尿失禁的是

A：珍菊降压片（含氢氯噻嗪）

B：非那雄胺

C：二甲双胍

D：依那普利

答案：A

62.美金刚的作用机制为

A：抑制N-甲基天冬氨酸受体

B：抑制胆碱酯酶

C：脑循环改善剂

D：钙离子拮抗剂

答案：C

63.胃食管反流的患者应避免使用的药物是：

A：阿司匹林

B：阿仑膦酸钠

C：他拉唑嗪

D：美托洛尔

答案：B

64.适用于绝经过渡期()

A：雌孕激素序贯用药

B：雌孕激素连续联合用药

C：单纯孕激素补充治疗

D：单纯雌激素补充治疗

答案：C

65.具有末梢神经炎毒性，必要时需补充B族维生素和神经营养剂的药物是

A：甲氨蝶呤

B：长春新碱

C：阿糖胞苷

D：环磷酰胺

答案：B

66.妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受到外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期为胎儿发育的最后阶段，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

A：妊娠3～5周

B：妊娠1～2周

C：妊娠1～3周

D：妊娠3～4周

答案：A

67.能降LDL也降HDL的药物是

A：烟酸

B：塞伐他汀

C：非诺贝特

D：普罗布考

答案：D

68.患者,女,50岁,近期出现失眠、潮热、出汗、烦躁等不适症状,临床诊断为围绝经期综合征,在使用激素替代治疗之前应先排除禁忌证。下列情况不属于禁忌证但属于慎用的是()

A：乳腺增生

B：耳硬化症

C：近6月内患活动性静脉栓塞性疾病

D：严重肝功能障碍

答案：A

69.与成人相比，2岁以下小儿对酸不稳定、弱碱性药物的吸收增加，其机制是

A：胃酸分泌少

B：肝脏的相对重量约为成人的2倍

C：体液及细胞外液容量大

D：胃排空快

答案：A

70.应用华法林抗凝治疗时，INR的安全有效范围在我国通常为

A：<2.0

B：2.0～3.0

C：2.0～2.5

D：>3.0

答案：B

71.服用时不宜立刻饮水，以免冲淡药物而降低药效的是

A：聚乙二醇粉剂

B：磷酸可待因糖浆

C：非洛地平缓释片

D: 吲哚美辛胶囊

答案：B

72.应用高剂量时可导致脑病的抗菌药物是

A: 头孢哌酮

B: 头孢唑林

C: 青霉素

D: 美罗培南

答案：B

73.属于选择性5-羟色胺再摄取抑制剂的是

A: 吗氯贝胺

B: 氟西汀

C: 阿米替林

D: 文拉法辛

答案：B

74.患者男性，35岁，髋关节置换术后7天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

A: 布洛芬

B: 阿司匹林

C: 糖皮质激素

D: 抗菌药物

答案：C

75.水溶性基制软膏应存放于()。

A: 专用仓库

B: 低温库

C：凉暗库

D：常温库

答案：D

76.下列哪种药品的别名是“心得安”

A：硝酸异山梨酯

B：甲氧氯普胺

C：普萘洛尔

D：阿替洛尔

答案：C

77.隔日一次用药的外文规范缩写的是

A：q.h

B：q.d

C：q.n

D：q.o.d

答案：D

78.高热不退、头痛、谵妄以致昏迷

A：病毒型

B：肺炎型

C：神经型

D：胃肠型

答案：C

79.特异体质的患者及其家族成员可能发生过同样反应（如过敏）提示必须

A：排除药物以外的因素；必要的实验室检查

B：追溯用药史；询问用药过敏史和家族史

C：流行病学的调查

D：确定致病药物

答案：B

80.属于中枢和外周多巴胺D2受体阻断剂，具有镇吐、刺激泌乳素释放的促胃肠动力药是

A：昂丹司琼

B：甲氧氯普胺

C：莫沙必利

D：多潘立酮

答案：B

81.属于非麻醉性强效镇咳药，起效迅速，抑制外周传入神经，也可部分抑制咳嗽中枢的药物的是

A：右美沙芬

B：苯丙哌林

C：可待因

D：羧甲司坦

答案：B

82.治疗乙型病毒性肝炎的核苷酸类药物在用法上正确的是

A：每天两次口服

B：每天一次口服

C：每天四次口服

D：每天三次口服

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/197116044052010024