

2024 年广东省阳东区《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库附参考答案（综合卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患儿，5 岁。有咽痛、肌肉酸痛、咳嗽，实验室检查为支原体感染；医师处方红霉素治疗。

- A: 静脉滴注速度过快可发生心脏毒性
- B: 易被胃酸破坏，临床常用其肠衣片或酯化物
- C: 常见用药后 10 日出现转氨酶升高
- D: 红霉素广泛分布于各种组织和体液中

答案：D

2. 属于钠通道阻滞剂的抗心律失常药是

- A: 硝酸甘油
- B: 利多卡因
- C: 美托洛尔
- D: 索他洛尔

答案：B

3. 用于青霉素敏感金黄色葡萄球菌引起的轻、中度感染且青霉素过敏者的药物是

- A: 克拉霉素
- B: 克林霉素
- C: 红霉素
- D: 万古霉素

答案：C

4. 适用于各型疟疾，但主要用于抗氯喹恶性疟治疗和凶险型恶性疟的急救的药物是

- A: 蒿甲醚
- B: 奎宁
- C: 双氢青蒿素
- D: 乙胺嘧啶

答案：A

5. 具有负性肌力、负性频率、负性传导作用的药物是

- A: 硝酸甘油
- B: 维拉帕米
- C: 卡托普利
- D: 哌唑嗪

答案：B

6. 用于甲型和乙型流感的治疗，应及早在流感开始的第 1 或第 2 天开始治疗的药物是

- A: 膦甲酸钠
- B: 奥司他韦
- C: 制霉菌素
- D: 两性霉素 B

答案：B

7. （2019 年真题）有些药品的不良反应源于药物制剂的辅料，紫杉醇注射液中可能引起过敏反应的辅料是（）

- A: 邻苯二甲酸二辛酯

B: 乙醇

C: 聚乙烯醇蓖麻油

D: 聚氯乙烯

答案: C

8. 氨基苷类通过下列哪种屏障比较容易

A: 血脑屏障

B: 胎盘屏障

C: 血脑屏障

D: 黏液屏障

答案: B

9. 具有缩小皮脂腺，抑制皮脂腺活性，减少皮脂分泌的药物()

A: 阿达帕林

B: 维 A 酸

C: 异维 A 酸

D: 壬二酸

答案: C

10. 与避孕药合用，可能导致避孕失败的药物不包括

A: 苯巴比妥

B: 利福平

C: 环孢素

D: 四环素

答案: C

11. 甲氨蝶呤主要用于()

A: 髓母细胞瘤

- B: 儿童急性白血病
- C: 室管膜瘤
- D: 慢性粒细胞性白血病

答案：B

12. 硫酸亚铁临床应用

- A: 缺铁性贫血
- B: 缺血性脑卒中
- C: 急性中性粒细胞减少症
- D: 失去药效

答案：A

13. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔后可使用()

- A: 3%过氧化氢溶液
- B: 3%酚甘油滴耳液
- C: 2%酚甘油滴耳液
- D: 2%过氧化氮溶液

答案：A

14. 患者，女，66岁，5天前无明显诱因出现发热，最高39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗4日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38.8℃，R21次，BP110/70mmHg，HR110次/分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞82.1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁0.59，每6小时一次。

- A: 氟康唑可减慢硝苯地平代谢引起下肢水肿
- B: 氟康唑抑制卡马西平代谢

C: 氟康唑可延长口服降糖药的半衰期导致低血糖

D: 氟康唑可使华法林代谢加快

答案: D

15. 不宜口服给药的药物是

A: 硝苯地平

B: 硝酸甘油

C: 普萘洛尔

D: 洛伐他汀

答案: B

16. 治疗银屑病药主要作用不包括

A: 改善表皮细胞增殖速率

B: 促进细胞有丝分裂

C: 恢复其正常分化状态

D: 作用于皮肤表皮细胞

答案: B

17. 克拉维酸与阿莫西林配伍使用是因前者可()

A: 抑制 β -内酰胺酶

B: 扩大阿莫西林的抗菌谱

C: 减少阿莫西林的不良反应

D: 延缓阿莫西林经肾小管的分泌

答案: A

18. 下列关于袢利尿药不良反应的描述，错误的是()

A: 常见水、电解质紊乱

B: 长期使用多数患者可出现高尿酸血症

C: 耳毒性与剂量无关

D: 当低血钾和低血镁同时存在时，如不纠正低血镁，即使补充钾也不易纠正低钾血症

答案：C

19. 患者女性，30 岁。以肺结核收治入院，给予抗结核治疗，链霉素肌肉注射后，10 分钟后患者出现头晕、耳鸣、乏力、呼吸困难等症状，继而出现意识模糊、晕倒、血压下降、心律失常等症状。

A: 利多卡因

B: 胺碘酮

C: 葡萄糖酸钙

D: 葡萄糖

答案：C

20. (2020 年真题) 属于一线抗结核分枝杆菌的药物是

A: 异烟肼、吡嗪酰胺、乙胺丁醇

B: 异烟肼、利福平、莫西沙星

C: 莫西沙星、卡那霉素、卷曲霉素

D: 异烟肼、阿米卡星、对氨基水杨酸

答案：A

21. 属于第二代喹诺酮类药物的是

A: 萘啶酸

B: 吡哌酸

C: 诺氟沙星

D: 莫西沙星

答案：B

22. (2020 年真题) 对某些癌症患者，在抗癌药物治疗后，还需使用重组人粒细胞刺激因子，其目的是

- A: 预防癌症复发
- B: 预防出血过多
- C: 预防粒细胞缺乏
- D: 预防过敏反应

答案：C

23. 眼科术后引起的眼内炎应向眼内注射

- A: 利福平
- B: 头孢他啶
- C: 阿昔洛韦
- D: 夫西地酸

答案：B

24. 磺酰脲类药物的不良反应不包括

- A: 肝炎
- B: 粒细胞减少
- C: 诱发甲亢
- D: 口中金属味

答案：C

25. 特比萘芬属于()

- A: 丙烯胺类抗真菌药
- B: 唑类抗真菌药
- C: 多烯类抗真菌药
- D: 棘白菌素类抗真菌药

答案：A

26. 中毒后可用等剂量维生素 B

A: 异烟肼

B: 乙胺丁醇

C: 对氨基水杨酸

D: 利福平

答案: A

27. 须用专属性极强的解毒剂右雷佐生保护心肌的药物是

A: 环磷酰胺

B: 多柔比星

C: 曲妥珠单抗

D: 吉非替尼

答案: B

28. (2018 年真题) 可导致视神经炎和血尿酸升高的药物是 ()

A: 对氨基水杨酸

B: 乙胺丁醇

C: 吡嗪酰胺

D: 利福平

答案: B

29. 属于广谱Ⅲ类抗心律失常药的是

A: 苯妥英钠

B: 胺碘酮

C: 维拉帕米

D: 利多卡因

答案: B

30. 骨髓抑制较严重的是

- A: 顺铂
- B: 奥沙利铂
- C: 亚叶酸钙
- D: 卡铂

答案：D

31. 可阻断肺-胸膜的牵张感受器产生的肺迷走神经反射，适用于各种原因引起的刺激性干咳的药物是

- A: 喷托维林
- B: 苯丙哌林
- C: 右美沙芬
- D: 福尔可定

答案：B

32. 患者，女性，40 岁，甲状腺肿大，伴有心悸、多汗、烦躁、消瘦等症状。诊断：甲状腺功能亢进症。

- A: 格列齐特
- B: 大剂量碘剂
- C: 丙硫氧嘧啶
- D: 放射性碘

答案：C

33. 对小肠和结肠平滑肌无明显作用的促胃肠动力药是

- A: 西沙比利
- B: 多潘立酮
- C: 伊托必利

D: 甲氧氯普胺

答案: B

34. 属于磷酸二酯酶抑制剂的平喘药是

A: 多索茶碱

B: 沙美特罗

C: 布地奈德

D: 孟鲁司特

答案: A

35. 可用于慢性活动性肝炎的治疗()

A: 复方氨基酸注射液(3AA)

B: 复方氨基酸注射液(18AA)

C: 赖氨酸

D: 精氨酸

答案: A

36. 治疗单纯疱疹性角膜炎不宜选用的药品是

A: 利巴韦林滴眼液

B: 四环素可的松眼膏

C: 碘苷滴眼液

D: 更昔洛韦滴眼液

答案: B

37. 急性化脓性中耳炎早期最有效的治疗是()

A: 抗生素溶液滴耳

B: 抗生素加激素全身应用

C: 及早足量抗生素应用

D: 2%酚甘油滴耳

答案：C

38. 属于第四代头孢菌素的药物是()

A: 头孢噻肟

B: 头孢哌酮

C: 头孢吡肟

D: 头孢噻吩

答案：C

39. 下列哪种药物能抑制尿酸生成的是

A: 秋水仙碱

B: 呋塞米

C: 丙磺舒

D: 别嘌醇

答案：D

40. 氯沙坦的降压作用机制是

A: 阻断 β 受体

B: 阻断 AT1 受体

C: 阻断 α 受体

D: 阻断 AT2 受体

答案：B

41. 可用于鼻部血管收缩的肾上腺素 α 受体激动药是

A: 桃金娘油

B: 羟甲唑啉

C: 复方薄荷油

D: 西地碘

答案: B

42. 作用于远曲小管近端的中效利尿药是

A: 氢氯噻嗪

B: 呋塞米

C: 乙酰唑胺

D: 氨苯蝶啶

答案: A

43. 可能引起高铁血红蛋白血症的抗高血压药是

A: 阿利克仑（阿利吉仑）

B: 阿托普利

C: 氨氯地平

D: 硝普钠

答案: D

44. 右旋体是产生神经毒性的主要根源，故开发其左旋体，用于治疗敏感厌氧菌引起的多种感染性疾病的药物是

A: 替硝唑

B: 多黏菌素

C: 甲硝唑

D: 奥硝唑

答案: D

45. 只对癌细胞起作用而对正常体细胞几乎没有伤害的是

A: 氟他胺

B: 曲妥珠单抗

C: 阿那曲唑

D: 他莫昔芬

答案: B

46. 刺激胰岛 B 细胞释放胰岛素的是

A: 磺酰脲类

B: 胰岛素

C: 二甲双胍

D: A 和 B 均无效

答案: A

47. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A: 肾功能不全者

B: 老年人

C: 肝功能不全者

D: 推荐应用大剂量万古霉素来维持其血药浓度在 15~20mg/L 并且长疗程的患者

答案: C

48. 可用于治疗乙型肝炎病毒感染的药物是

A: 更昔洛韦

B: 恩替卡韦

C: 金刚烷胺

D: 阿昔洛韦

答案: B

49. 对受体亲和力最大的糖皮质激素是

- A: 地塞米松
- B: 氟氢可的松
- C: 氢化可的松
- D: 甲泼尼龙

答案：D

50. 对铜绿假单胞菌作用强()

- A: 羧苄西林
- B: 青霉素 G
- C: 青霉素 V
- D: 氟氯西林

答案：A

51. (2016 年真题) 属于 β 受体阻断剂的降低眼压药是

- A: 噻吗洛尔
- B: 乙酰唑胺
- C: 毛果芸香碱
- D: 甘露醇

答案：A

52. 患者，女，41 岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日 6~8 次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞 8~10 / HP，红细胞 3~5 / HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2 片，口服，3 次 / 日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2 次 / 日。

A: 尿量

- B: 电解质
- C: 肾功能
- D: 肝功能

答案：B

53. 复方左炔诺孕酮片、复方孕二烯酮片均含有的成份是

- A: 维生素 B6
- B: 炔雌醇
- C: 雌二醇
- D: 去氧孕烯

答案：B

54. (2018 年真题) 不属于血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI) 类药物作用特点是 ()

- A: ACEI 可防治高血压患者心肌细胞肥大
- B: ACEI 可引起反射性心率加快
- C: ACEI 对肾脏有保护作用
- D: ACEI 禁用于双侧肾动脉狭窄者

答案：B

55. 下述关于甘油的描述，错误的是 ()

- A: 属于渗透性泻药
- B: 孕妇慎用
- C: 属于润滑性泻药
- D: 用于便秘的治疗

答案：A

56. 维 A 酸软膏治疗痤疮时，合理的用法是

- A: 一日二次，早、晚使用
- B: 一日一次，晨起使用
- C: 一日一次，睡前使用
- D: 一日一次，固定时间使用

答案：C

57. 下列不属于硝基呋喃类抗菌药物的不良反应是()

- A: 腹泻
- B: 呕吐、食欲减退
- C: 发热
- D: 头痛

答案：C

58. (2018 年真题) 蒽醌类抗肿瘤药柔红霉素可引起心脏毒性, 临床应用的解毒方案是 ()

- A: 在用柔红霉素同时, 使用柔红霉素等量的右雷佐生
- B: 在用柔红霉素前 30min, 使用柔红霉素 2 倍量的氟马西尼
- C: 在用柔红霉素后 30min, 使用柔红霉素 2 倍量的右雷佐生
- D: 在用柔红霉素前 30min, 使用柔红霉素 10 倍量的右雷佐生

答案：D

59. (2018 年真题) 镇痛药的合理用药原则, 不包括 ()

- A: 用药剂量个体化, 根据患者需要由小剂量开始逐渐加大剂量
- B: “按时”给药, 而不是“按需”给药
- C: 尽可能选口服给药
- D: 按阶梯给药, 对于轻度疼痛者首选弱阿片类药物

答案：D

60. (2017 年真题) 属于抗雄性激素的肿瘤药是 ()

- A: 他莫昔芬
- B: 阿那曲唑
- C: 氟他胺
- D: 炔雌醇

答案: C

61. 关于地高辛的说法不正确的是

- A: 减慢传导
- B: 激动 Na
- C: 减慢心率
- D: 加强心肌收缩力

答案: B

62. 可为患者提供一定的能量，对于长期昏迷的患者尤为适用的药物是

- A: 甘油果糖
- B: 螺内酯
- C: 阿米洛利
- D: 甘露醇

答案: A

63. (2019 年真题) 患者，男，15 岁，因咳嗽、咳痰，发热 3 天入院，确诊为社区获得性肺炎，给予静滴青霉素钠 10 分钟后出现头昏，面色苍白，呼吸困难，血压下降等症状，对该患者首选的抢救药物是 ()

- A: 去甲肾上腺素
- B: 多巴胺
- C: 地塞米松

D: 肾上腺素

答案：D

64. 患哪种疾病禁用吡喹酮

A: 眼囊虫病

B: 绦虫病

C: 囊虫病

D: 血吸虫病

答案：A

65. 具有较强的 M 受体阻断作用，能直接解除膀胱逼尿肌痉挛，改善膀胱储尿功能的药物是

A: 奥昔布宁

B: 睾酮

C: 西地那非

D: A 型肉毒毒素

答案：A

66. 对凝血各环节均有作用，体内外均有抗凝作用，可防止急性血栓形成而成为对抗血栓的首选的抗凝血药是（）。

A: 水蛭素

B: 阿哌沙班

C: 依诺肝素

D: 磺达肝葵钠

答案：C

67. 可用于减轻季节性过敏性鼻炎相关症状的药物是

A: 白三烯受体阻断剂

B: β 受体激动剂

C: 磷酸二酯酶抑制剂

D: M 受体拮抗剂

答案: A

68. 改善心肌收缩功能，抑制血管肥厚，可以减低血管僵硬程度，改善动脉顺应性抗高血压药是

A: 利尿降压药

B: 血管紧张素转换酶抑制药

C: 钙离子通道阻滞药

D: α 受体激动药

答案: B

69. 对焦虑型、夜间醒来次数较多或早醒者可选用的苯二氮?类镇静催眠药是

A: 地西泮

B: 苯二氮?类药物

C: 非苯二氮?类药物

D: 氟西泮

答案: D

70. 可出现酮尿或乳酸性血症的药物是

A: 胰岛素皮下注射

B: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

C: 二甲双胍

D: 艾塞那肽

答案: C

71. 有些药品的不良反应源于药物制剂的辅料，紫杉醇注射液中可能引起过敏反应的辅料是()

- A: 邻苯二甲酸二辛酯
- B: 聚氯乙烯
- C: 聚乙烯醇蓖麻油
- D: 乙醇

答案：C

72. 渗透性泻药()

- A: 硫酸镁
- B: 甘油
- C: 地芬诺酯
- D: 乳果糖

答案：D

73. (2019 年真题) 体内代谢迅速，严重过量导致出血时，可用鱼精蛋白拮抗的药物是()

- A: 肝素
- B: 氯吡格雷
- C: 阿司匹林
- D: 依诺肝素

答案：A

74. 不会引起直立性低血压的药物是

- A: 阿替洛尔
- B: 硝普钠
- C: 氨氯地平
- D: 利血平

答案：C

75. 乙胺丁醇用于

- A: 6 岁以上儿童及成人
- B: 8 岁以上儿童及成人
- C: 10 岁以上儿童及成人
- D: 13 岁以上儿童及成人

答案：D

76. 可用于治疗甲癣、足癣、体癣和股癣等浅表性真菌感染的药品是()

。

- A: 两性霉素 B
- B: 特比萘芬
- C: 伏立康唑
- D: 氟胞嘧啶

答案：B

77. 能松弛前列腺和膀胱括约肌，很少发生低血压的抗前列腺增生症药为

- A: 特拉唑嗪
- B: 乙酰唑胺
- C: 坦洛新
- D: 酚苄明

答案：C

78. β 受体阻滞药降低眼压的作用机制是()

- A: 缩小瞳孔，开放前房角
- B: 增加房水经小梁网的外流，降低眼压

C: 减少房水生成，促进房水引流的排出

D: 增加房水的葡萄膜巩膜通路的外流和引流

答案：C

79. 可用于治疗伤寒的药物是

A: 青霉素类

B: 氨基糖苷类

C: 氟喹诺酮类

D: 四环素类

答案：C

80. 患者，女，55 岁，晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院。查体：138/90mmHg，心率 120 次/分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

A: 中度透过血-脑屏障

B: 胃肠道吸收不完全

C: 以原型药物经肾脏排泄

D: 较易进入中枢神经系统，可致神经系统不良反应

答案：D

81. 格列本脲的作用特点是

A: 抑制胰高血糖素的分泌

B: 增强胰岛素的作用

C: 直接抑制肝糖原分解和糖原异生

D: 提高靶细胞对胰岛素的敏感性

答案：C

82. 主要通过增强靶组织对胰岛素的敏感性，减轻胰岛素抵抗发挥疗效的药物是

- A: 氢氧化镁
- B: 二甲双胍
- C: 罗格列酮
- D: 胰岛素

答案：C

83. 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是

- A: 阿卡波糖
- B: 瑞格列奈
- C: 艾塞那肽
- D: 罗格列酮

答案：A

84. 药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄色葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹理加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。患者可能发生与静脉滴注速度有关的不良反应是（）

- A: 急性肝衰竭
- B: 红人综合征
- C: 高血压危象
- D: 血糖异常

答案：B

85. 氨基糖苷类抗菌药无效的是（）

- A: 铜绿假单胞菌

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 需氧革兰阴性菌

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/197133042052010024>