

## 临床执业医师考试考试真题及答案

### 一、A1 题型

1. 急性肾功能不全透析指标不正确的是

- A. 血钾  $\geq 6.0\text{mmol/L}$
- B. 血尿素氮  $\geq 21.4\text{mmol/L}$
- C. 酸中毒  $\text{pH} < 7.25$
- D. 血肌酐每日升高  $\geq 176.8\ \mu\text{mol/L}$
- E. 无尿 2 天

【正确答案】A

【答案解析】透析疗法：出现下列情况者应透析治疗：①急性肺水肿。②血钾  $\geq 6.5\text{mmol/L}$ 。③血尿素氮  $\geq 21.4\text{mmol/L}$  或血肌酐  $\geq 442\ \mu\text{mol/L}$ 。④高分解状态，血肌酐每日升高  $\geq 176.8\ \mu\text{mol/L}$  或血尿素氮每日升高  $\geq 8.9\text{mmol/L}$ ，血钾每日上升  $1\text{mmol/L}$ 。⑤无尿 2 天或少尿 4 天。⑥酸中毒， $\text{pH} < 7.25$  或二氧化碳结合力  $< 13\text{mmol/L}$ 。

2. 下列关于胎盘分泌激素的叙述，错误的是

- A. 在妊娠 8~10 周绒毛膜促性腺激素分泌达高峰
- B. 绒毛膜促性腺激素是一种糖蛋白激素
- C. 胎盘可分泌绒毛膜促性腺激素
- D. 胎盘分泌的雌激素主要为雌二醇
- E. 胎盘分泌的人绒毛膜生长素可促进胎儿生长

【正确答案】D

**【答案解析】**胎盘是妊娠期间重要的内分泌器官，可分泌多种激素。其中，人绒毛膜促性腺激素是一种糖蛋白，在妊娠8~10周分泌达高峰。人绒毛膜生长素可促进胎儿生长。雌激素中90%是雌三醇，雌酮和雌二醇很少。

3. 在心脏听诊方面，对分析诊断心律失常最有价值的心音是

- A. 第一心音和第二心音
- B. 第一心音和第三心音
- C. 第一心音和第四心音
- D. 第二心音和第三心音
- E. 第三心音和第四心音

**【正确答案】** A

**【答案解析】**在诊断心律失常时，心音检查亦有意义，尤其以第一心音及第二心音最有价值，因第一心音及第二心音是正常心律的标志。当发生房室传导阻滞或房室分离时，由于PR间期的变化可导致第一心音强度的改变；当存在完全左束支传导阻滞时可听到第二心音的反常分裂。

4. 下述关于三叉神经痛的特点与之不符的是

- A. 半月神经节退行性变
- B. 多发于40岁以上女性
- C. 疼痛以上颌、鼻唇沟处疼痛明显
- D. 可引起引起面肌抽搐
- E. 间歇期完全正常

**【正确答案】** C

**【答案解析】**三叉神经痛主要疼痛以下颌、面颊或舌最明显。

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

5. 下述维生素 B6 生化特性有误的是
- A. 主要包括吡哆醇和吡哆醛两种成分
  - B. 维生素 B6 在体内以磷酸酯的形式存在
  - C. 磷酸吡哆醛是其活性形式之一
  - D. 主要参与传递氨基和脱羧基
  - E. 还参与血红素的合成

正确答案：A

答案解析：维生素 B6 主要包括吡哆醇、吡哆醛和吡哆胺三种。

6. 慢性炎症组织中最多的哪种细胞浸润
- A. 浆细胞
  - B. 淋巴细胞
  - C. 嗜酸性白细胞
  - D. 中性白细胞
  - E. 巨噬细胞

【正确答案】B

【答案解析】急性炎症以中性粒细胞浸润为主，慢性炎症以淋巴细胞中性粒细胞为主。

7. 男。60 岁。人工膝关节置换术后膝关节周围加压包扎。1 天后发现右足不能背屈。跖屈正常，足背动脉搏动正常。最可能的原因是
- A. 腓总神经损伤
  - B. 坐骨神经损伤
  - C. 深静脉血栓

D. 胫神经损伤

E. 骨筋膜室综合征

**【正确答案】** A

**【答案解析】** 膝关节周围加压包扎出现了一系列临床表现，考虑压迫了腓总神经。腓总神经受损导致出现足不能背屈，出现足下垂及跨阈步态。

8. 初产妇，28岁，因“停经40周，腹痛1天”入院。入院查体：可触及宫缩，持续40秒，间歇3~4分钟，肛诊：宫口开大4cm，先露平棘，胎心胎动好。1) 对该产妇的判断，错误的是

A. 已临产

B. 已规律宫缩

C. 已进入潜伏期

D. 已进入活跃期

E. 已进入第一产程

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 潜伏期是指从临产出现规律宫缩至宫口扩张3cm。此期间扩张速度较慢，平均2~3小时扩张1cm，需8小时，最大时限16小时。

9. 最常见的子宫肌瘤类型是

A. 肌壁间肌瘤

B. 浆膜下肌瘤

C. 宫颈肌瘤

D. 黏膜下肌瘤

E. 阔韧带肌瘤

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

【正确答案】A

【答案解析】肌壁间肌瘤最常见，占60%~70%，浆膜下肌瘤约占20%，黏膜下肌瘤约占10%~15%。

10. 男孩，4个月，高热、频繁呕吐3天，查体：面色青灰、两眼凝视。前囟隆起，心肺无异常，无脑膜刺激征。血象：WBC $16 \times 10^9/L$ 。N0.90，L0.10，患儿最可能的诊断是

- A. 上呼吸道感染
- B. 急性胃炎
- C. 化脓性脑膜炎
- D. 结核性脑膜炎
- E. 病毒性脑膜炎

【正确答案】C

【答案解析】婴儿，高热，有颅高压症状（呕吐、两眼凝视、前囟隆起），面色青灰提示感染重，血象提示细菌感染，故诊断为化脑。

11. 预防医学道德价值的社会性，常与下列因素相联系不包括

- A. 需要国家资金的投入
- B. 需要社会的支持
- C. 工作对象是健康的社会人群
- D. 预防医学工作者工作的特殊性
- E. 工作内容与人们的生活环境相关

正确答案：D

答案解析：由于预防医学的群体性，因而预防医学工作的好坏会影响到整个社会，同时预防医学只依靠预防保健人员是不够的，它需要社会的重视、支持和参与。不仅如此，随着世界经济的发展、交通发达，国家交往日益频繁，以至任何一个国家单独采取疾病（特别是传染病）的防治措施都不可能有效地控制疾病的发生、传播和保证人群的安全。所以，需要全人类社会的共同协作而进入人类预防的时代。因此，社会性也是预防医学的突出特点。

12. 癌细胞来自小叶的终末导管及腺泡，未穿破基底膜，累及小叶

- A. 乳腺小叶原位癌
- B. 乳腺导管内原位癌
- C. paget 病
- D. 乳腺浸润性癌
- E. 乳腺炎样癌

正确答案：A

答案解析：小叶原位癌：扩张的乳腺小叶末梢导管和腺泡内充满呈实体排列的癌细胞，增生的细胞未突破基底膜。

13. 某患者结节穿刺和活检结果为乳头状癌。骨扫描诊断右肱骨转移，此患者的临床分期是

- A. III期
- B. I 期
- C. IV期
- D. II 期
- E. 无法分期

【正确答案】C

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

【答案解析】乳头状癌有转移，考虑是IV期。

14. 患者男，29岁。由于注射青霉素过敏而引起气急、喘鸣、憋气、发绀。这属于药物的

- A. 毒性反应
- B. 后遗效应
- C. 应激效应
- D. 副作用
- E. 变态反应

【正确答案】E

【答案解析】变态反应亦称超敏反应，常见于过敏体质的病人。其反应性质与药物原有效应有关，与所用药物的剂量大小无关，而且不能用药理活性的拮抗药解救。临床表现可因人、因药物而异，从轻微的皮疹、发热至造血系统抑制、肝肾功能损害、休克等。

15. 男孩，4个月，高热、频繁呕吐3天，查体：面色青灰、两眼凝视。前囟隆起，心肺无异常，无脑膜刺激征。血象：WBC $16 \times 10^9/L$ 。N0.90，L0.10，患儿最可能的诊断是

- A. 上呼吸道感染
- B. 急性胃炎
- C. 化脓性脑膜炎
- D. 结核性脑膜炎
- E. 病毒性脑膜炎

【正确答案】C

【答案解析】 婴儿，高热，有颅高压症状（呕吐、两眼凝视、前囟隆起），面色青灰提示感染重，血象提示细菌感染，故诊断为化脑。

16. 普萘洛尔没有下列哪个作用

- A. 减弱心肌收缩力
- B. 松弛支气管平滑肌
- C. 收缩血管
- D. 降低心肌耗氧量
- E. 减少肾素释放

【正确答案】 B

【答案解析】 普萘洛尔可以阻断  $\beta_2$  受体，可使支气管平滑肌收缩，对支气管哮喘患者可诱发或加重急性发作。

17. 老年患者，50 岁，开始夜尿增多，随着腺体增大，机械性梗阻加重，排尿困难加，B 超显示残余尿较多，诊断为前列腺增生。该患者良性前列腺增生的起始部位是

- A. 移行带
- B. 外周带
- C. 中央带
- D. 全部前列腺组织
- E. 前列腺外壳包膜

【正确答案】 A

【答案解析】 前列腺病变的常见部位：前列腺增生起始于移行带；前列腺癌多起发于外周带。

18. 男，60岁。乏力、纳差、眼黄、皮肤瘙痒3周，大便色白，体重下降3kg。既往体健，偶有饮酒。查体：T36.5℃，P80次/分，R18次/分，血压120/80mmHg。皮肤巩膜明显黄染，未见肝掌及蜘蛛痣。双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心律齐。腹软，上腹可触及边界不清包块，不随呼吸移动，无压痛。应首先考虑的诊断是

- A. 胆囊结石
- B. 急性化脓性胆管炎
- C. 胰腺癌
- D. 胆总管结石
- E. 急性肝炎

**【正确答案】** C

**【答案解析】** 患者，年龄较大，乏力、纳差、眼黄、皮肤瘙痒3周，大便色白，体重下降

19. 对于早期肺癌，首选的治疗方法是

- A. 药物治疗
- B. 放射治疗
- C. 放疗+化疗
- D. 手术治疗
- E. 免疫疗法

**【正确答案】** D

**【答案解析】** 尽管80%患者在明确诊断时已失去手术机会，但手术治疗是肺癌最重要的最有效的治疗手段，尤其是对于早期肺癌，首选的治疗方法是手术治疗。

20. 小儿生理性贫血发生的时期是出生后

- A. 6 月内
- B. 2~3 月
- C. 4~5 月
- D. 7~8 月
- E. 1 个月内

【正确答案】 B

【答案解析】 胎儿红细胞寿限较短，红细胞破坏较多（生理性溶血）；加之婴儿生长发育迅速，血循环量迅速增加等因素，红细胞数和血红蛋白量逐渐减低，至生后 2~3 个月时红细胞数降至  $3.0 \times 10^{12}/L$  左右，血红蛋白量降至  $100g/L$  左右，出现轻度贫血，称为“生理性贫血”。

21. 不属于骨折特有体征的是

- A. 畸形
- B. 骨擦音
- C. 局部异常活动
- D. 局部肿胀
- E. 骨擦感

【正确答案】 D

【答案解析】 局部肿胀属于一般性症状，不是特有体征。

22. 多根多处肋骨骨折导致呼吸衰竭的主要原因是

- A. 继发肺部感染
- B. 反常呼吸运动

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/197160106101010041>