

2024 贵州省普安县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库大全有完整答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 脓疱型痤疮可选用()

- A: 维 A 酸
- B: 酮康唑
- C: 阿达帕林
- D: 林旦霜

答案: C

2. 主要作用是抗革兰阴性杆菌的半合成青霉素是

- A: 替卡西林
- B: 阿莫西林
- C: 哌拉西林
- D: 替莫西林

答案: D

3. 直接氧化和卤化菌体蛋白的是

- A: 羟甲唑啉
- B: 复方薄荷油
- C: 桃金娘油
- D: 西地碘

答案: D

4. 通过抑制 A 型单胺氧化酶，减少去甲肾上腺素、5-HT 及多巴胺的降解，增强去甲肾上腺素、5-HT 和多巴胺能神经功能，发挥抗抑郁作用的药物是

- A: 度洛西汀
- B: 吗氯贝胺
- C: 舍曲林
- D: 阿米替林

答案：B

5. 可引起肌痛、骨关节病损、跟腱炎症和跟腱断裂的药物是()

- A: 克霉唑
- B: 环丙沙星
- C: 灰黄霉素
- D: 咪康唑

答案：B

6. 对革兰阳性菌作用弱，而对革兰阴性菌作用强的药物是

- A: 第四代头孢菌素
- B: 第三代头孢菌素
- C: 第二代头孢菌素
- D: 第一代头孢菌素

答案：B

7. 雌激素的适应证是

- A: 功能性子宫出血
- B: 痛经
- C: 先兆性流产
- D: 消耗性疾病

答案：A

8. 下列哪种药物可使关闭的房角重新开放，从而降低眼内压

- A: 左氧氟沙星
- B: 丙美卡因
- C: 噻吗洛尔
- D: 毛果芸香碱

答案：D

9. （2015 年真题）服用时必须保持坐位或立位、空腹、服后 30 分钟内不宜进食和卧床的药品是（ ）。

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 依普黄酮
- C: 依降钙素
- D: 雷洛昔芬

答案：A

10. 谷维素适用于

- A: 内分泌失调引起的失眠
- B: 神经源性尿崩症
- C: 原发性失眠
- D: 急慢性脑功能不全

答案：A

11. 不宜用于单纯性尿路感染初治病例的氨基糖苷类抗菌药物是

- A: 盐酸克林霉素
- B: 万古霉素
- C: 利福平

D: 阿米卡星

答案: D

12. (2017 年真题) 不属于糖皮质激素的适应症是 ()

A: 再障

B: 系统性红斑狼疮

C: 活动性肺结核

D: 风湿

答案: C

13. 唑来膦酸静脉给药输注的时间应在

A: 30 分钟以上

B: 15 分钟以上

C: 5 分钟以上

D: 60 分钟以上

答案: B

14. 使用奥沙利铂后最需要关注的典型不良反应是

A: 神经毒性

B: 消化道反应

C: 肾毒性

D: 肝毒性

答案: A

15. 氨基糖苷类的主要排泄途径是

A: 主要经呼吸道排泄

B: 经肝、肾双途径清除

C: 主要经肝脏清除

D: 主要经肾脏排泄

答案: D

16. 治疗可能引起结晶尿的药物是()

A: 左氧氟沙星

B: 呋喃妥因

C: 氯霉素

D: 磺胺嘧啶

答案: D

17. 双香豆素与苯巴比妥合用可

A: 竞争性对抗

B: 产生协同作用

C: 与其竞争结合血浆蛋白

D: 诱导肝药酶加速灭活，作用减弱

答案: D

18. 应用华法林抗凝的过程中出现严重出血时，可应用的急救药物是()

A: 维生素 B

B: 维生素 K

C: 维生素 K

D: 维生素 K

答案: D

19. 柔红霉素可引起心脏毒性，临床应用的解毒方案是

A: 在用柔红霉素前 30 分钟，使用柔红霉素两倍量的氟马西尼

B: 在用柔红霉素的同时，使用柔红霉素等量的右雷佐生

C: 在用柔红霉素前 30 分钟，使用柔红霉素 10 倍量的右雷佐生

D: 在用柔红霉素后 30 分钟，使用柔红霉素两倍量的右雷佐生

答案：C

20. 糖肽类药的主要作用靶点是

A: 细胞壁丙氨酰丙氨酸

B: 核糖体的 30S 亚基

C: 细胞内膜 PBP

D: 核糖体的 50S 亚基

答案：A

21. 可使呋达帕胺利尿作用增强的是

A: 胺碘酮

B: 多巴胺

C: 考来烯胺

D: 拟交感药

答案：B

22. (2021 年真题) 患者，男，48 岁，入院接受结肠癌手术，术后因合并肺部感染，静脉给予头孢哌酮舒巴坦钠治疗 6 天，观察到手术切口和静脉输液穿刺部位有少量渗血，实验室检验结果显示凝血功能异常。针对此症状，宜选用的治疗药物是 ()

A: 维生素 K1

B: 重组人促红素

C: 重组链激酶

D: 维生素 B12

答案：A

23. 钾离子竞争性酸抑制剂的作用机制是

- A: 通过竞争胃壁细胞膜腔面的钾离子来发挥作用
- B: 竞争性拮抗组胺与胃壁细胞上的 H₂受体结合
- C: 通过二硫键与质子泵的巯基呈不可逆性的结合
- D: 抑制乙酰胆碱 M 受体

答案：A

24. (2019 年真题) 能进入含有结核杆菌的巨噬细胞中，渗入结核菌体，在菌体内特定酶的作用下转化，且在酸性环境中作用更强的抗结核药物是 ()

- A: 链霉素
- B: 吡嗪酰胺
- C: 乙胺丁醇
- D: 利福平

答案：B

25. 育龄女性在无防护的性生活或避孕失败 72 小时内，宜使用的口服紧急避孕药是 ()

- A: 左炔诺孕酮 (1
- B: 十一酸睾酮 (40mg)
- C: 复方醋酸环丙孕酮 (35 μg/2mg)
- D: 炔雌醇去氧孕烯 (30g/150g)

答案：A

26. 用于散瞳的眼用药物是

- A: 毛果芸香碱
- B: 溴莫尼定
- C: 噻吗洛尔
- D: 复方托吡卡胺

答案：D

27. 治疗滴虫性阴道炎适宜使用的药物是（）

- A: 苄星青霉素
- B: 甲硝唑
- C: 呋喃妥因
- D: 庆大霉素

答案：B

28. 下列哪种药物属于抑菌药

- A: 青霉素 G
- B: 四环素
- C: 庆大霉素
- D: 头孢氨苄

答案：B

29. 半合成青霉素类中，属于广谱青霉素类的是（）

- A: 替莫西林
- B: 氨苄西林
- C: 甲氧西林
- D: 羧苄西林

答案：B

30. （2015 年真题）阿片类镇痛药与硫酸镁合用，可增强中枢抑制，导致的不良反应是（）。

- A: 胆绞痛
- B: 便秘
- C: 躁狂

D: 低血压

答案：D

31. 糖尿病合并轻中度肾功能不全者可选用()

A: 格列吡嗪

B: 格列喹酮

C: 格列齐特

D: 胰岛素

答案：B

32. 维生素 C 可使其代谢降低，作用增加的是

A: 糖皮质激素

B: 雌激素

C: 异烟肼

D: 丙磺舒

答案：A

33. 不可用于治疗白细胞减少的药物是

A: 腺嘌呤

B: 利伐沙班

C: 利可君

D: 糖皮质激素

答案：B

34. 不易引起严重乳酸血症的双胍类药物是

A: 苯乙双胍

B: 甲苯磺丁脲

C: 阿卡波糖

D: 二甲双胍

答案: D

35. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

A: 红人综合征

B: 视神经损害

C: 听力损害

D: 血栓性静脉炎

答案: B

36. 急性心梗死引起的急性室性心动过速可选用

A: 硝苯地平

B: 美西律

C: 利多卡因

D: 阿托品

答案: C

37. 下列关于托吡卡胺的描述错误的是

A: 滴眼后不应压迫泪囊

B: 可给予拟胆碱类药物解毒

C: 哺乳期慎用

D: 可诱发闭角型青光眼

答案: A

38. 特布他林的平喘作用维持时间是

- A: 4~6 小时
- B: 3~5 分钟
- C: 10~20 分钟
- D: 10~12 小时

答案：A

39. 用于治疗妊娠期妇女子痫和先兆子痫的首选药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 硫酸镁
- C: 依那普利
- D: 丙戊酸钠

答案：B

40. 因抑制血管内皮的前列腺素的生成,使血管内的前列腺素和血小板中的血栓素动态平衡失调而致血栓形成风险增加的非甾体抗炎药是()

- A: 塞来昔布
- B: 吲哚美辛
- C: 阿司匹林
- D: 双氯芬酸

答案：A

41. 应用本品时可能发生耐药菌的过度繁殖的药物是()

- A: 四环素
- B: 多西环素
- C: 氯霉素
- D: 青霉素

答案：B

42. β -内酰胺酶抑制剂的抑酶活性由强到弱的顺序是（）

- A: 他唑巴坦>舒巴坦>克拉维酸
- B: 他唑巴坦>克拉维酸>舒巴坦
- C: 舒巴坦>克拉维酸>他唑巴坦
- D: 舒巴坦>他唑巴坦>克拉维酸

答案：B

43. 维 A 酸联合过氧苯甲酰治疗寻常痤疮的正确用法是

- A: 将两药的凝胶或乳膏充分混合后应用
- B: 晨起洗漱后应用维 A 酸凝胶或乳膏，睡前应用过氧苯甲酰凝胶
- C: 睡前应用维 A 酸凝胶或乳膏，晨起洗漱后应用过氧苯甲酰凝胶
- D: 两药的凝胶或乳膏间隔 2 小时交替使用

答案：C

44. 抗酸作用较强、较快，有导泻作用

- A: 三硅酸镁
- B: 碳酸钙
- C: 氢氧化镁
- D: 氢氧化铝

答案：C

45. 属于维生素 K 拮抗剂的抗血栓药是

- A: 维生素 K
- B: 肝素
- C: 达比加群酯
- D: 华法林

答案：D

46. 适用于磺酰脲类降糖药治疗不理想的 2 型糖尿病患者的药物是

- A: 利拉鲁肽
- B: 瑞格列奈
- C: 骨化三醇
- D: 葡萄糖酸钙

答案：B

47. 下述药物中用于拮抗肝素过量的是()

- A: 维生素 K
- B: 维生素
- C: 氨甲苯酸
- D: 硫酸鱼精蛋白

答案：D

48. 可用于治疗重度痤疮，但妊娠期妇女避免使用的药物是

- A: 克拉霉素
- B: 异维 A 酸
- C: 特比萘芬
- D: 克罗米通

答案：B

49. 前列腺素类似物的降眼压机制是

- A: 增加巩膜葡萄膜通路房水外流
- B: 浓缩玻璃体
- C: 减少房水生成
- D: 开放小梁网

答案：A

50. 吗啉类抗真菌药 ()

- A: 阿莫罗芬
- B: 两性霉素
- C: 特比萘芬
- D: 氟康唑

答案: A

51. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38.8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 82.1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0.59，每 6 小时一次。

- A: 如发生转氨酶升高，应考虑氟康唑的肝毒性
- B: 定期复查血常规、肝肾功能
- C: 侵袭性真菌感染疗程较长，患者出院后仍需口服氟康唑
- D: 出院后如发生过敏症状，可使用抗过敏药特非那定

答案: D

52. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1 / 18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

- A: 严重心脏病
- B: 腰椎间盘突出
- C: 骨髓功能抑制
- D: 妊娠及哺乳期妇女

答案：B

53. (2017 年真题) 前庭功能失调 (眩晕) ()

- A: 哌拉西林
- B: 米诺环素
- C: 甲硝唑
- D: 左氧氟沙星

答案：B

54. 对环氧化酶 2 (COX-2) 具有高选择性的药物是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 塞来昔布
- C: 吲哚美辛
- D: 阿司匹林

答案：B

55. 诱导肝微粒体酶、是皮质激素和雌激素药效降低的是 ()

- A: 利福平
- B: 异烟肼
- C: 乙胺丁醇
- D: 链霉素

答案：A

56. 双香豆素应用过量可选用的拮抗药是 ()

- A: 葡萄糖酸钙
- B: 鱼精蛋白
- C: 维生素 K1
- D: 氨甲苯酸

答案：C

57. 属于金属配合物类的抗肿瘤药是

- A: 阿糖胞苷
- B: 氮芥
- C: 长春碱
- D: 顺铂

答案：D

58. 新生儿和早产儿使用可能会出现致命性的“喘息综合征”的药物是

- A: 双环醇
- B: 硫普罗宁注射剂
- C: 多烯磷脂酰胆碱注射剂
- D: 甘草酸二铵注射剂

答案：C

59. 可用于治疗非霍奇金淋巴瘤的单克隆抗体是

- A: 西妥昔单抗
- B: 贝伐单抗
- C: 利妥昔单抗
- D: 英夫利昔单抗

答案：C

60. 与受体结合及解离速度较快, 较少引起严重低血糖的磺酰脲类药物是()

- A: 格列美脲
- B: 格列喹酮
- C: 格列吡嗪

D: 格列齐特

答案：A

61. 以下为广谱抗病毒药的是

A: 更昔洛韦

B: 碘苷

C: 阿糖腺苷

D: 利巴韦林

答案：D

62. 通过选择性抑制 5-HT 再摄取，增加突触间隙 5-HT 浓度，从而增强 5-HT 能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

A: 舍曲林

B: 吗氯贝胺

C: 阿米替林

D: 度洛西汀

答案：A

63. 1~5 岁儿童甲状腺功能减退症，左甲状腺素每日完全替代剂量为

A: $4\mu\text{g}/\text{kg}$

B: $5\mu\text{g}/\text{kg}$

C: $25\mu\text{g}$

D: $6\mu\text{g}/\text{kg}$

答案：B

64. (2017 年真题) 药师在急诊药房值班时，接听病房咨询电话，得知一新入院耐甲氧西林金黄葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者，出现高热、肺纹加重，患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。

- A: 头孢哌酮
- B: 头孢曲松
- C: 阿米卡星
- D: 替考拉宁

答案：D

65. 复方氨基酸注射液（6AA）与等量 10% 葡萄糖注射液稀释后缓慢静脉滴注，滴速为

- A: 不超过 40 滴 / 分
- B: 滴速 80~100 滴 / 分
- C: 不超过 15 滴 / 分
- D: 滴速 20~30 滴 / 分

答案：A

66. 下列何药对心房颤动无治疗作用

- A: 奎尼丁
- B: 胺碘酮
- C: 利多卡因
- D: 普萘洛尔

答案：C

67. 下列氨基糖苷类抗菌药物中，引起耳蜗神经损伤发生率最高的是

- A: 核糖霉素
- B: 卡那霉素
- C: 妥布霉素
- D: 链霉素

答案：B

68. 下述不属于抗病毒药物禁忌证的是()

- A: 糖尿病、高血压患者禁用
- B: 严重中性粒细胞减少者禁用更昔洛韦
- C: 相应药物过敏者禁用
- D: 妊娠期妇女禁用利巴韦林

答案：A

69. 关于庆大霉素使用的叙述，错误的是

- A: 与第一代注射用头孢菌素类合用时可能加重肾毒性
- B: 可静脉快速推注或静脉滴注给药
- C: 避免该药耳部滴用
- D: 应定期检查尿常规、血尿素氮、血肌酐，注意患者听力变化或听力损害先兆

答案：B

70. 用于肾病的氨基酸制剂的是

- A: 赖氨酸注射液
- B: 复方氨基酸注射液（18AA）
- C: 复方氨基酸注射液（9AA）
- D: 复方氨基酸注射液（6AA）

答案：C

71. 不宜口服给药的药物是

- A: 普萘洛尔
- B: 硝苯地平
- C: 洛伐他汀
- D: 硝酸甘油

答案：D

72. (2017 年真题) 属于选择性 5-HT₄ 受体激动剂, 促进乙酰胆碱释放的促胃肠动药是 ()

- A: 多潘立酮
- B: 甲氧氯普胺
- C: 莫沙必利
- D: 昂丹司琼

答案: C

73. 下列头孢菌素药物中, 半衰期最长的药物是

- A: 头孢氨苄
- B: 头孢孟多
- C: 头孢克洛
- D: 头孢曲松

答案: D

74. (2016 年真题) 可用于缓解绝经后更年期症状的药品是

- A: 戊酸雌二醇
- B: 地屈孕酮
- C: 他莫昔芬
- D: 依普黄酮

答案: A

75. 留钾利尿药若每日服用 1 次, 最宜的服用时间是

- A: 早餐前 1 小时
- B: 午餐时
- C: 早餐时
- D: 午餐前 1 小时

答案：C

76. 静脉滴注过量可消除噻嗪类利尿剂的利尿和降压作用的是

- A: 枸橼酸钾
- B: 氯化钠
- C: 氯化钾
- D: 氯化钙

答案：B

77. 作用于微管的抗肿瘤药物是

- A: 顺铂
- B: 紫杉醇
- C: 来曲唑
- D: 依托泊苷

答案：B

78. 患者，男，5 岁，体重 25kg，有癫痫病史、青霉素过敏史。因急性胆囊炎合并腹腔感染住院治疗，体征和实验室检查，白细胞计数 $15 \times 10^9 / L$ ，体温 $39.5^\circ C$ ，肝、肾功能正常，医师处方美罗培南静脉滴注(说明书规定儿童剂量为一次 $20mg / kg$)。

- A: 丙戊酸钠
- B: 左乙拉西坦
- C: 乙琥胺
- D: 地西泮

答案：A

79. 防止急性深静脉血栓形成的药物是

- A: 达肝素钠

- B: 香豆素类
- C: 维生素 K1
- D: 维生素 B12

答案：A

80. (2018 年真题) 关于钙通道阻滞剂 (CCB 类) 药物的说法, 错误的是 ()

- A: CCB 类主要扩张小动脉, 对小静脉和毛细血管作用较小, 可导致下肢或脚踝水肿
- B: 红霉素可显著增加硝苯地平或非洛地平的生物利用度
- C: CCB 类对冠状动脉痉挛所致的变异型心绞痛无效
- D: 对既往有脑卒中病史的老年高血压患者, 优先选择 CCB 类降压药

答案：C

81. 伴有前列腺增生的哮喘患者不宜选用的药物是

- A: 磷酸二酯酶抑制剂
- B: M 胆碱受体阻断剂
- C: 白三烯受体阻断剂
- D: 长效 B2 受体激动剂

答案：B

82. 属于长效糖皮质激素的药物是

- A: 氢化可的松
- B: 曲安西龙
- C: 醋酸可的松
- D: 地塞米松

答案：D

83. 糖皮质激素的抗中毒性休克作用是

- A: 提高中枢神经系统的兴奋性
- B: 抑制巨噬细胞中一氧化氮合成酶
- C: 提高机体对细菌内毒素的耐受力
- D: 抑制巨噬细胞对抗原的吞噬处理

答案：C

84. 对于急性白血病在一线耐药时使用，但作为二线用药的药物是

- A: 表柔比星
- B: 柔红霉素
- C: 吡柔比星
- D: 多柔比星

答案：D

85. 下述利尿药中，可增加卡那霉素耳毒性的是

- A: 呋塞米
- B: 氨苯蝶啶
- C: 螺内酯
- D: 氢氯噻嗪

答案：A

86. 可用于治疗绦虫感染的药物是

- A: 联苯
- B: 氯硝柳胺
- C: 林旦
- D: 甲硝唑

答案：B

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/198031056042007022>