

## 考研（护理综合）历年真题试卷汇编 15

(总分 138.3, 考试时间 150 分钟)

### 单项选择题

1. 1. 现代医学模式是指

- A. 生物医学模式
- B. 生物、心理、社会医学模式
- C. 生物、生理、社会医学模式
- D. 生物、生理、心理医学模式
- E. 生理、心理医学模式

2. 2. 作为护理程序结构框架的理论是

- A. 信息论
- B. 系统论
- C. 奥瑞姆自护理论
- D. 控制论
- E. 人类基本需要层次论

3. 3. 2008 年 5 月 12 日起施行的我国第一部有关护理的卫生行政法规是

- A. 《护士法》
- B. 《护士条例》
- C. 《护士管理条例》
- D. 《中华人民共和国护理管理办法》
- E. 《护士管理法》

4. 4. 患者，女，32 岁，因高热、呼吸困难 2d 入院，诊断为“肺炎”。护理体检：精神萎靡，体温为 39℃，呼吸困难，铁锈色痰。下列对该患者护理诊断的描述，正确的是

- A. 肺炎球菌肺炎
- B. 高热
- C. 食欲下降与高热有关
- D. 体温过高与致病菌引起的肺部感染有关
- E. 支气管肺炎

5. 5. 早期诊断、及时治疗应属于纽曼健康系统模式的哪一级预防

- A. 初级预防
- B. 一级预防
- C. 二级预防
- D. 自我保护
- E. 心理与生理防卫

6. 6. 用奥瑞姆自理模式护理患者时，护理系统的选择取决于

- A. 医生医嘱

- B. 患者自理能力
  - C. 病房护士编制
  - D. 患者的病情
  - E. 患者的自理需求
7. 7.在护患关系建立初期，护患关系发展的主要任务是
- A. 对患者收集资料
  - B. 确定患者的健康问题
  - C. 为患者制定护理计划
  - D. 与患者建立信任关系
  - E. 为患者解决健康问题
8. 8.下列哪项不符合医院健康教育的原则
- A. 要保证教育内容科学、准确、详实
  - B. 应在全面评估教育对象的基础上，制定有针对性的健康教育计划
  - C. 要由浅入深、由简到繁，从具体到抽象，循序渐进地开展健康教育
  - D. 为了将健康教育计划落实，必要时可采取强制手段
  - E. 可以运用现代技术手段，如照片、影像等，生动地表现教学内容
9. 9.以下哪项不属于个体发展性的自护需要
- A. 怀孕期的自护需要
  - B. 儿童期的自护需要
  - C. 青春期的自护需要
  - D. 失去至亲时的调整
  - E. 生病时的诊疗需要
10. 10.肿瘤患者常在刚得知自己被诊断为肿瘤时，第一反应是“那不是真的，定是搞错了”，他采用的心理防御机制是
- A. 否认
  - B. 合理化
  - C. 转移
  - D. 投射
  - E. 认同
11. 11.护理诊断 PES 公式中的“S”代表
- A. 患者的健康问题
  - B. 症状或体征
  - C. 原因
  - D. 患者的现病史
  - E. 健康问题相关因素
12. 12.护士在实施护理操作前，因未清晰向患者解释而导致患者紧张的压力源属于
- A. 疾病严重程度
  - B. 住院环境陌生
  - C. 缺乏相关信息
  - D. 失去部分自由
  - E. 与家人分离
13. 13.病室的相对湿度为 70%时，患者可出现
- A. 肌肉紧张
  - B. 咽干、口渴

- C. 闷热、不适
  - D. 头晕、倦怠
  - E. 发热、多汗
14. 14.一人协助患者移向床头的操作中，下述哪项不妥
- A. 视病情放平靠背架
  - B. 取下枕头置床尾
  - C. 患者仰卧屈膝
  - D. 请患者双手握住床头栏杆，双脚蹬床面
  - E. 护士、患者协作配合，同时上移
15. 15.关于卧位及翻身的叙述正确的是
- A. 颅脑手术后，头部可卧于健侧或头高足低位
  - B. 胃肠胀气所致腹痛不宜采用俯卧位
  - C. 头低足高位是指抬高床尾 10~50cm
  - D. 膝胸卧位适用于膀胱镜检查
  - E. 为患者翻身侧卧时，应使其下腿弯曲，上腿稍伸直
16. 16.使用燃烧法消毒灭菌时，不正确的操作是
- A. 锐利刀剪不能用燃烧法
  - B. 燃烧时需远离易燃易爆物品
  - C. 燃烧前容器应擦洗干净
  - D. 中途可加入 95%的乙醇提高灭菌效果
  - E. 应使容器内面全部被火焰烧到
17. 17.使用紫外线进行物品表面消毒，下列叙述正确的是
- A. 有效距离为 25~60cm，消毒时间为 20~30min
  - B. 有效距离不超过 2m，消毒时间为 30~60min
  - C. 消毒时间从灯亮后开始计时
  - D. 紫外线消毒的适宜温度为 18~20℃
  - E. 紫外线消毒的适宜湿度为 30%~40%
18. 18.下列哪项不符合隔离原则
- A. 隔离单位标记明显
  - B. 脚垫用消毒液浸泡
  - C. 门口设消毒盆、毛巾、手刷
  - D. 使用过的物品冲洗后立即消毒
  - E. 穿隔离衣后不得进入清洁区
19. 19.遇有真菌感染的患者，口腔护理应用的漱口液是
- A. 1%~4%碳酸氢钠
  - B. 2%~3%硼酸
  - C. 0.9%氯化钠
  - D. 0.1%醋酸
  - E. 1%醋酸
20. 20.哪项不符合褥疮炎症浸润期的临床表现
- A. 受压表面呈紫红色
  - B. 皮下产生硬结
  - C. 局部可出现小水疱
  - D. 局部表皮松解剥脱

- E. 浅层组织有脓液流出
21. 21.为昏迷患者做口腔护理时，以下操作正确的是
- A. 协助患者漱口
  - B. 由外向里擦净口腔及牙齿各面
  - C. 用开口器时，从门齿处放入
  - D. 活动假牙可放于温水中浸泡
  - E. 一般每日做 2—3 次口腔护理
22. 22.急性肺水肿患者吸氧，湿化瓶内用 20%~30%乙醇，目的是
- A. 刺激呼吸中枢
  - B. 吸收水分，减轻肺水肿
  - C. 刺激血管收缩，减少渗出
  - D. 消毒并湿润氧气
  - E. 降低肺泡内泡沫表面张力
23. 23.患者王某，男，肺炎患者，口温为 39.5℃，脉率为 120 次 / min，面色潮红，皮肤灼热，伴有尿量减少，该患者目前处于
- A. 体温上升期
  - B. 高热持续期
  - C. 恢复期
  - D. 退热期
  - E. 恶化期
24. 24.为患者测量血压时，由于血压计袖带缠得太紧，可使测得的
- A. 血压偏高
  - B. 血压偏低
  - C. 收缩压偏高，舒张压变化不大
  - D. 收缩压和舒张压均可正确
  - E. 舒张压偏高，收缩压变化不大
25. 25.患者陈某，男，60 岁，因尿失禁给予双腔气囊导尿管留置导尿，下列操作中错误的是
- A. 插入导尿管，见尿后再插入 1~2cm
  - B. 根据导尿管注明的气囊容量注入等量生理盐水
  - C. 集尿袋不得超过膀胱高度并避免挤压
  - D. 集尿袋每日定时更换
  - E. 固定时注意膨胀的气囊不能卡在尿道内口
26. 26.乙醇擦浴，禁擦的部位是
- A. 头部、四肢
  - B. 腋窝、腹股沟
  - C. 前胸、腹部
  - D. 两侧肾区
  - E. 手掌、胭窝
27. 27.为患者鼻饲灌食后，应再注入少量温开水，其目的是
- A. 使患者温暖、舒适
  - B. 便于测量、记录准确
  - C. 防止患者呕
  - D. 避免鼻饲液存积在管腔中变质
  - E. 防止液体反流

28. 28.患者因消化道疾病需做隐血试验，试验前 3d 内可进食
- A. 动物血
  - B. 豆制品
  - C. 绿色蔬菜
  - D. 肉类
  - E. 动物内脏
29. 29.阿米巴痢疾患者进行保留灌肠常采用
- A. 左侧卧位
  - B. 右侧卧位
  - C. 头高脚低位
  - D. 头低脚高位
  - E. 仰卧位
30. 30.长期留置导尿后，尿液出现浑浊、沉淀或结晶时应
- A. 观察尿量并记录
  - B. 多饮水并进行膀胱冲洗
  - C. 经常更换卧位
  - D. 经常清洗尿道口
  - E. 膀胱内滴药
31. 31.青霉素引起过敏性休克的特异性抗体是
- A. IgG
  - B. IgA
  - C. IgM
  - D. IgE
  - E. IgD
32. 32.患者刘某，慢性呼吸道炎症，护士为其进行超声波雾化吸入，下列操作错误的为
- A. 连接雾化器各部，水槽内加入 50℃的蒸馏水
  - B. 操作轻稳，以免损坏电晶片及透声膜
  - C. 药液稀释至 30~50ml
  - D. 每次治疗时间为 15~20min
  - E. 治疗毕消毒雾化罐，螺纹管，口含嘴等
33. 33.长期连续输液的患者，需多长时间更换输液器
- A. 48h
  - B. 24h
  - C. 12h
  - D. 36h
  - E. 16h
34. 34.溶血反应第二阶段的典型症状是
- A. 头胀，四肢麻木
  - B. 腰背部剧痛，血压下降
  - C. 黄疸，血红蛋白尿
  - D. 少尿或无尿
  - E. 寒战发热
35. 35.患者李某，与家人争吵后口服大量巴比妥钠，急送入院，立即给予洗胃，洗胃灌洗液宜用

- A. 4%碳酸氢钠
  - B. 0.9%氯化钠
  - C. 0.1%硫酸铜
  - D. 温开水、硫酸镁
  - E. 1:15 000 高锰酸钾
36. 36.实施口头医嘱时做法不妥的是
- A. 一般情况下不执行
  - B. 抢救患者时可执行
  - C. 执行后需补写医嘱
  - D. 手术中可执行
  - E. 护士听清后立即执行
37. 37.甲状腺功能亢进危象先兆的表现是
- A. T3、T4 升高
  - B. 体温为 37.5℃
  - C. 呕吐、腹泻
  - D. 脉率为 110 次 / 分
  - E. 焦虑、烦躁
38. 38.患者，男，64 岁。测血压：153 / 105mmHg。该患者的血压分级是
- A. 正常血压
  - B. 正常高值
  - C. 1 级高血压
  - D. 2 级高血压
  - E. 3 级高血压
39. 39.对行纤维支气管镜检查的患者，术前半小时应皮下注射
- A. 麻黄碱
  - B. 利多卡因
  - C. 肾上腺素
  - D. 阿托品
  - E. 异丙肾上腺素
40. 40.患者，女，48 岁。多饮、多尿伴体重下降 3 个月就诊。身高为 158cm，体重为 51kg，尿糖(++++)，尿酮(-)，空腹血糖为 19.5mmol / L，HbA1c 为 9.5%。应选择下列哪项治疗方案
- A. 纯饮食控制
  - B. 饮食控制加双胍类药物
  - C. 饮食控制加胰岛素治疗
  - D. 饮食控制加  $\alpha$ -糖苷酶抑制剂
  - E. 脲类降糖药加胰岛素治疗
41. 41.缺铁性贫血补充铁剂的首选方法是
- A. 口服给药
  - B. 静脉给药
  - C. 肌肉注射
  - D. 皮下注射
  - E. 皮内注射
42. 42.评估急性胰腺炎患者的病情，哪项最能说明预后不佳

- A. 体温为 39℃
  - B. 黄疸
  - C. 合并代谢性中毒
  - D. 全腹压痛、腹肌紧张
  - E. 手足抽搐
43. 43. 需绝对禁食的情况是
- A. 十二指肠溃疡合并黑便
  - B. 肝性脑病前驱期
  - C. 胃溃疡大便隐血试验持续阳性
  - D. 消化性溃疡合并幽门梗阻
  - E. 急性水肿型胰腺炎
44. 44. 肝硬化并发上消化道出血的处理中不正确的措施是
- A. 绝对静卧，可给予适量地西洋
  - B. 缓慢静脉注射垂体后叶素
  - C. 肥皂水清洁灌肠
  - D. 应用双气囊三腔管压迫止血
  - E. 应用胃黏膜保护剂
45. 45. 患者，女，35 岁，昨日因头痛、发热、鼻塞、流涕、服用感冒药物，今晨突然呕吐咖啡样液体及黑便，总量约为 500ml，来急诊。体检：血压为 90 / 60mmHg，脉搏为 100 次 / min，肝脾无肿大。应首选下列哪项检查
- A. 血常规
  - B. 肝功能检查
  - C. 大便隐血检查
  - D. B 超检查
  - E. 急诊胃镜检查
46. 46. 下列腹水检查结果哪项对诊断结核性腹膜炎有重要意义
- A. 腹水比重为 1.016
  - B. 腹水葡萄糖 < 3.4mmol / L
  - C. 腹水腺苷脱氨酶活性增高
  - D. 腹水蛋白含量为 30g / L
  - E. 腹水 < 7.35
47. 47. 患者，女，20 岁，因腹泻、血便、高热和全腹触痛伴反跳痛入院。结肠镜检查证实直肠黏膜弥漫性充血、质脆、易出血，伴有小的出血性溃疡。腹部平片显示横结肠段扩张。目前首先应作的处理是
- A. 紧急外科手术
  - B. 等待粪便培养的结果
  - C. 口服 5-ASA
  - D. 静脉滴注糖皮质激素
  - E. 在 24h 内做肠系膜动脉造影
48. 48. 患者，女，28 岁。诉心慌不适来诊，医嘱行心电图检查。护士在给该患者做心电图检查时单极胸导联 V1 电极应放在
- A. 胸骨右缘第四肋间
  - B. 胸骨左缘第四肋间
  - C. 左腋前线第四肋间

- D. 左腋中线第五肋间
  - E. 左锁骨中线与第五肋间相交点
49. 49.患者，男，46岁，诊断酒精性肝硬化18年，近2年频繁出现神志恍惚、定向障碍甚至昏迷。患者服用乳果糖调整大便pH多少为宜
- A. 2~3
  - B. 3~4
  - C. 4~5
  - D. 5~6
  - E. 6~7
50. 50.护士帮助支气管扩张患者进行体位引流时，不正确的护理措施是
- A. 引流前向患者讲解配合方法
  - B. 根据病变部位选择合适的体位
  - C. 引流宜在饭后进行
  - D. 每次引流的时间15~20min
  - E. 若患者合并严重心血管疾病，则不宜采用头低位进行体位引流
51. 51.风湿性疾病多系统损害中发生率最高的是
- A. 心脏
  - B. 关节
  - C. 脑血管
  - D. 肺和胸膜
  - E. 皮肤
52. 52.对于乙脑患者，护士应配合医生进行抢救的是针对下列哪组症状
- A. 高热、头痛、呼吸衰竭
  - B. 高热、恶心、呼吸衰竭
  - C. 高热、嗜睡、呼吸衰竭
  - D. 高热、惊厥、呼吸衰竭
  - E. 以上都是
53. 53.艾滋病毒主要侵犯下列哪种免疫细胞而引起免疫功能缺陷
- A. 抑制性T淋巴细胞
  - B. 辅助性T淋巴细胞
  - C. 单核细胞
  - D. 巨嗜细胞
  - E. B淋巴细胞
54. 54.患者，男，55岁，患急性淋巴细胞白血病。医嘱静脉推注长春新碱。护理措施错误的是
- A. 静注时边抽回血边注药
  - B. 外周静脉应选择粗直的
  - C. 首选中心静脉
  - D. 推注药物前，先用生理盐水冲管，确定针头在静脉内方能注入
  - E. 输注时若发现外渗，立即拔针
55. 55.某尿毒症患者，每天晨间出现恶心呕吐，对症护理措施为
- A. 睡前勿进食、勿进水
  - B. 睡前吃少量点心
  - C. 睡前饮水1~2次



- D. 夜间饮水 1~2 次
  - E. 起床前先服止呕剂
56. 56.夜尿增多为
- A. 夜间尿量持续超过 750ml / d
  - B. 夜间尿量持续超过 650mL / d
  - C. 夜间尿量持续超过 550ml / d
  - D. 夜间尿量持续超过 450ml / d
  - E. 表现夜尿次数增多
57. 57.慢性肾衰竭后期的患者，一旦出现下列哪种情况提示病情严重
- A. 少尿、高血钾
  - B. 重度贫血
  - C. 乏力、食欲减退
  - D. 血结合钙降低
  - E. 呼吸有尿臭味
58. 58.患者，男，65 岁。3 年前被诊断为“肺心病”，近日因感冒后呼吸困难加重入院。护士对该患者所采取的氧疗方式正确的是
- A. 间歇高流量给氧
  - B. 间歇低流量给氧
  - C. 持续高流量给氧
  - D. 持续低流量给氧
  - E. 高压给氧
59. 59.观察心律失常时，最危险的情况是
- A. 频发室性期前收缩
  - B. II、III度房室传导阻滞
  - C. 心房颤动
  - D. 阵发性室上性心动过速
  - E. 多源性期前收缩
60. 60.慢性呼吸衰竭诱发急性呼吸困难的重要因素为
- A. 精神紧张
  - B. 过度劳累
  - C. 呼吸道感染
  - D. 长期吸烟
  - E. 体质虚弱
61. 61.心绞痛发作的首要护理措施是
- A. 立即描记心电图
  - B. 观察疼痛性质
  - C. 给予吸氧
  - D. 让患者安静坐下或半卧
  - E. 建立静脉通路
62. 62.原发性高血压最常见的死亡原因是
- A. 尿毒症
  - B. 心律失常
  - C. 心力衰竭
  - D. 高血压危象

- E. 脑血管意外
63. 63.洋地黄中毒所致完全性房室传导阻滞，禁用
- A. 麻黄素
  - B. 糖皮质激素
  - C. 氯化钾
  - D. 异丙基肾上腺素
  - E. 普鲁苯辛
64. 64.患者，女，47岁，患风湿性心脏病二尖瓣狭窄6年余，近日上呼吸道感染后出现心力衰竭表现，乏力、稍事活动就心慌、憋气，伴有食欲不振，肝区胀痛，双下肢轻度水肿，双肺底湿啰音，心率为128次/min，护士应如何指导患者休息
- A. 活动不受限制
  - B. 从事轻体力活动
  - C. 增加睡眠时间，可起床做轻微活动
  - D. 卧床休息，限制活动量
  - E. 严格卧床休息，采取半卧位
65. 65.患者，男，28岁，自觉突然心慌、胸闷，听诊心率为160次/min，心律齐，心音均等，血压正常。若心电图出现完全不规则的大波浪状曲线，且QRS波与T波消失。你考虑下列哪项处理不妥
- A. 准备抢救用品
  - B. 可于心内注射利多卡因
  - C. 可施行同步电除颤复律
  - D. 立即做胸外按压和口对口人工呼吸
  - E. 立即通知医生进行抢救
66. 66.某胃溃疡患者，近月来腹痛节律性消失，消瘦，大便隐血试验持续阳性，应考虑为
- A. 溃疡活动
  - B. 幽门梗阻
  - C. 慢性穿孔
  - D. 溃疡癌变
  - E. 上消化道出血
67. 67.病毒性心肌炎护理重点在于
- A. 加强锻炼，增强机体抵抗力
  - B. 接种流感疫苗，预防感冒
  - C. 充分休息，保证丰富的营养
  - D. 绝对卧床3个月，低盐饮食
  - E. 小量应用糖皮质激素，并注意不良反应
68. 68.患者，女，20岁。四肢关节疼痛7个月，近2个月出现面颊部对称性红斑，反复发作口腔溃疡，诊断为“系统性红斑狼疮”。以下护理措施不恰当的是
- A. 避免辛辣等刺激性食物
  - B. 坚持饭后漱口
  - C. 少食多餐
  - D. 优质低蛋白饮食
  - E. 可以进食蘑菇、芹菜等食物
69. 69.治疗肝性脑病时，减少肠道有毒物质生成和吸收的措施为
- A. 禁食蛋白质

- B. 应用降氨药物
  - C. 吸附性血液灌注
  - D. 静脉输注氨基酸
  - E. 纠正低钾和碱中毒
70. 70.口服硫酸亚铁必有副作用是
- A. 黑便      B. 便秘
  - C. 腹泻      D. 恶心
  - E. 腹痛
71. 71.患者，女，68岁。身体虚弱，中暑后入院治疗，以下何种措施对患者预后决定作用
- A. 脱离高温环境
  - B. 补充体液
  - C. 快速降温
  - D. 平卧
  - E. 保持呼吸道通畅
72. 72.胃镜检查术后护理措施不妥的是
- A. 术后禁食1d，防止胃扩张
  - B. 嘱患者不要用力咳嗽
  - C. 术后可按摩腹部，减轻腹胀
  - D. 不要吞咽唾液，以免呛咳
  - E. 检查后数天内应密切观察患者有无并发症
73. 73.关于瘫痪，下列哪种说法是错误的
- A. 四肢瘫是指双侧上下肢均瘫
  - B. 单瘫是指一个肢体瘫痪
  - C. 交叉瘫是指一侧上肢和另一侧下肢瘫
  - D. 截瘫是指双下肢瘫
  - E. 偏瘫是指一侧面部与肢体瘫痪
74. 74.下列哪项护理措施不可用于缺血性脑血管意外
- A. 保持环境安静
  - B. 避免不必要的搬动
  - C. 头部置冰袋或冰帽
  - D. 血压监护，避免降压过快
  - E. 注意观察意识状态改变
75. 75.特发性面神经麻痹在护理上应防止发生
- A. 角膜溃疡
  - B. 面肌萎缩
  - C. 下颌窦感染
  - D. 面肌痉挛
  - E. 下颌关节脱位
76. 76.重症肌无力患者出现呼吸困难紧急处理不正确的是
- A. 改善通气，纠正缺氧
  - B. 保持呼吸道通畅
  - C. 及时正确使用人工呼吸器
  - D. 严密观察呼吸困难的程度
  - E. 立即高流量、高浓度给氧

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/198044102016006032>